


آزمائشی چارو



درسي ڪتاب

رياضي

10 ڪلاس لاءِ



سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، چام شورو

سڀ حق ۽ واسطا سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ڄامشورو وٽ محفوظ آهن.

پاران سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ڄامشورو

ڊائريڪٽوريٽ آف ڪريڪيولم ۽ ريسرچ سنڌ ڄامشورو جي صوبائي ريويو ڪميٽي پاران نظرثاني ڪيل. بورڊ آف انٽرميڊيئيٽ اينڊ سيڪنڊري ايجوڪيشن، حيدرآباد، ڪراچي، سکر، لاڙڪاڻو، ميرپورخاص ۽ شهيد بينظيرآباد پاران سيڪنڊري ڪلاس لاءِ

درسي ڪتاب طور منظور ٿيل.

اسڪول ايجوڪيشن اينڊ ٽريسي ڊپارٽمينٽ حڪومت سنڌ کان

نوٽيفڪيشن نمبر No. SELD/CA/CW/396/2021 موجب منظور ڪيل.

نگران اعليٰ

پرويز احمد بلوچ

چيئرمين سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ

يوسف احمد شيخ

چيف سپروائيزر

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ

داريوش ڪافي

سپروائيزر

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ

نظرثاني:

- ☆ پروفيسر ڊاڪٽر زين العابدين ڪهرو
- ☆ پروفيسر محمد فاروق خان
- ☆ مسٽر محمد صغير شيخ
- ☆ مسٽر اعجاز علي سبھپوٽو
- ☆ مسٽر محمد وسيم
- ☆ مسٽر زوهيب حسيب
- ☆ مسٽر رياض حسين
- ☆ مسٽر آفتاب علي
- ☆ مسٽر مير سرفراز خليل ساند

ليکڪ:

- ☆ مسٽر عبدال سليم ميمڻ
- ☆ مسٽر اعجاز علي سبھپوٽو
- ☆ ڊاڪٽر ڪاشف علي ابڙو
- ☆ ڊاڪٽر محمد مجتبيٰ شيخ
- ☆ پروفيسر محمد فاروق خان
- ☆ ڊاڪٽر حفيظ الله مهر

سنڌيڪار

- ☆ مسٽر اعجاز علي سبھپوٽو

ايڊيٽر

- ☆ ڊاڪٽر زبير احمد ڪلهوڙو
- ☆ مسٽر مير سرفراز خليل ساند

ڊيزائننگ ۽ لي آؤٽ

- ☆ مسٽر محمد ارسلان شفاعت گدي

ڇپيندڙ:

مهاڳ

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ هڪ اهڙو تعليمي ادارو آهي، جنهن جو ڪم درسي ڪتابن جي تياري ۽ اشاعت ڪرڻ آهي. هن جو اهم مقصد اهڙن درسي ڪتابن جي تياري ۽ فراهمي آهي، جيڪي نئين نسل کي ڄاڻ، هنر سان گڏوگڏ منجهن اهڙي صلاحيت پيدا ڪن، جنهن جي ذريعي اهي آفاقي نظرين، پائيداري، بزرگن جي ڪارنامن، پنهنجي ثقافتي ورثي، روايت جي حفاظت ڪندي، نئين دور جي سائنسي، ٽيڪنيڪي ۽ سماجي تقاضائن کي پورو ڪري ڪامياب زندگي گذاري سگهن.

درسي ڪتاب رياضي ڪلاس X جو توهان جي هٿ ۾ آهي، جيڪو صوبائي نصاب 2017 مطابق رياضي جي تسلسل ۾ تيار ڪيو ويو آهي. نصاب 30 يونٽن تي مشتمل آهي، انهن مان پهرين 16 يونٽن کي رياضي ڪلاس IX ۾ شامل ڪيو ويو. تنهن ڪري، باقي 14 يونٽ (17 کان 30 تائين) رياضي جي هن درسي ڪتاب ۾ شامل آهن.

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ هن ڪتاب جي اشاعت لاءِ تمام تر تڪليفن محدود وسائل جي باوجود ڪتاب تي خاصو خرچ ڪيو آهي.

ڪوبه ڪتاب يقيناً حرف آخر نه هوندو آهي، ۽ ان ۾ هر وقت بهتري جي گنجائش هوندي آهي، جڏهن ته ليڪٽر، پنهنجي پوري صلاحيتن کي استعمال ڪندي مڪمل تصـوـر ۽ وضاحتن کي چٽي نموني پيش ڪيو آهي. هن ۾ اجابه ڪيتريون ئي خاميون ٿي سگهن ٿيون تنهن لاءِ ماهر استادن ۽ شاگردن کي عرض رکجي ٿو ته اڻپوري لکائي، يا اڻپورين شڪلين بابت نشاندهي ڪن ۽ پنهنجيون تجويزون ۽ رايا ڏين ته جيئن ڪتابن کي ايندڙ چاپي ۾ سڌاريو وڃي. آخر ۾ آئون ائسوسيئيشن فار اڪيڊمڪ ڪوالٽي (آفاق)، اسان جي ماهر ليڪٽر، ايڊيٽرن ۽ بورڊ جي ماهر عملي جو سندن تعليم جي لاءِ اڻ ٿڪ محنت ۽ ڪوششن لاءِ شڪر گذار آهيان.

چيئرمين

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ، ڄامشورو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست


صفحو	عنوان	يونت نمبر
01 - 35	سيت ۽ عمل	يونت 17
36 - 56	ڦيرقار يا متجڙ	يونت 18
57 - 82	قالب ۽ قطعي مله	يونت 19
83 - 113	به درجي مساواتن جو نظريو	يونت 20
114 - 126	جزوي پاڻا	يونت 21
127 - 174	بنيادي شماريات	يونت 22
175 - 181	فيثا غورث سڌيان	يونت 23
182 - 193	نسبت ۽ تناسب	يونت 24
194 - 207	گول جا زه	يونت 25
208 - 222	گول جون چهڻي ليڪون	يونت 26
223 - 231	زه ۽ قوس	يونت 27
232 - 241	گول جي سيگمينٽ ۾ ڪنڊون	يونت 28
242 - 264	عملي جاميٽري گول	يونت 29
265 - 294	ترگنا ميٽري جو تعارف	يونت 30
295 - 312	جواب	



شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هن يونٽ جي پڙهڻ کانپوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته

- سيٽن کي $\mathbb{R}$ ۽ $\mathbb{Q}$, $\mathbb{P}$, $\mathbb{O}$, $\mathbb{E}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{W}$, $\mathbb{N}$ سان ظاهر ڪرڻ جو دؤر ڪن
- سيٽن جا قسم ۽ ظاهر ڪرڻ جا نمونا
- سيٽن تي عمل
- ٻن سيٽن جو همشڪلي فرق
- ٻن يا ٽن سيٽن جي ميلاپ ۽ ڪاٽ وارين هيٺين بنيادي خاصيتن جون رسمي ثابتيون ڏيڻ
- ميلاپ جي مٿا واري خاصيت
- ڪاٽ جي مٿا واري خاصيت
- ميلاپ جي سنگت واري خاصيت
- ڪاٽا جي سنگت واري خاصيت
- ميلاپ جي ڪاٽ جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت
- ڪاٽا جي ميلاپ جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت
- ٻي مارگن جا قانون
- ڏنل سيٽن جي بنيادي خاصيتن جي چڪاس ڪن
- وين شڪلين وسيلي هيٺيان ڏيکارڻ
- سيٽن جو ميلاپ ۽ ڪاٽا
- ٻن سيٽن جو همشڪلي فرق
- وين شڪل وسيلي هيٺين جي چڪاس ڪريو
- ميلاپ ۽ ڪاٽا جي مٿا واري خاصيت
- ورهاست وارا قانون
- ترتيب ڏنل جوڙن جي سڃاڻپ ڪن
- ڪارٽيسي ضرب اپٽ ٺاهين
- جوڙي واري تعلق کي بيان ڪن ۽ ان جي ڊومين ۽ رينج جي سڃاڻپ ڪن
- عمل کي بيان ڪن ۽ ڊومين ۽ ڪو ڊومين ۽ رينج جي سڃاڻپ ڪن
- هيٺين جي وضاحت ڪري سمجهن
- انٽو ۽ ون - ون عمل (انجيڪٽو عمل)
- آٽو عمل (سرجيڪٽو عمل)
- ون - ون ۽ آٽو عمل (بائي جيڪٽو عمل)
- ڇاچ ڪري سگهن ته ڇا ڏنل تعلق هڪ عمل آهي يا نه
- ون - ون عمل ۽ ون - ون مطابقت جي وچ ۾ فرق ڪري سگهن



17.1 سيٽن تي عمل (Operations on Sets)

17.1(i) سيٽن کي $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{W}, \mathbb{E}, \mathbb{O}, \mathbb{P}$ سان ظاهر ڪرڻ جو دؤر :

حقيقت ۾ سيٽ، رياضي جي بنيادي تصورن مان هڪ آهي جيڪو رياضي جي ڪيترن ئي نظرين کي ٺاهڻ ۽ انهن جو تجزيو ڪرڻ ۾ ڪارائتو آهي. سيٽ جي تصور تي هيٺين ڪلاس ۾ اڳيئي تفصيل سان بحث ٿي چڪو آهي. اچو ته ڪجهه اهم سيٽن جو دؤر ڪريون.

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ قدرتي عددين جو سيٽ:

$\mathbb{W} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ مڪمل يا پورن عددين جو سيٽ:

$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$ سڄن عددين جو سيٽ:

$\mathbb{E} = \{0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots\}$ ٻڌي عددين جو سيٽ:

$\mathbb{O} = \{\pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots\}$ اڪي عددين جو سيٽ:

$\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, \dots\}$ مفرد عددين جو سيٽ:

$\mathbb{Q} = \left\{ x \mid x = \frac{p}{q}; p, q \in \mathbb{Z} \wedge q \neq 0 \right\}$ ناطق عددين جو سيٽ:

$\mathbb{Q}' = \left\{ x \mid x \neq \frac{p}{q}; p, q \in \mathbb{Z} \wedge q \neq 0 \right\}$ غير ناطق عددين جو سيٽ:

$\mathbb{R} = \left\{ x \mid x = \frac{p}{q} \vee x \neq \frac{p}{q}; p, q \in \mathbb{Z} \wedge q \neq 0 \right\}$ حقيقي عددين جو سيٽ:

يعني ته $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$

نوٽ:

$\mathbb{R}^+$ ۽ $\mathbb{R}^-$ ترتيبوار مثبت ۽ منفي حقيقي عددين جو سيٽ کي ظاهر ڪن ٿا.

ناطق، غير ناطق ۽ حقيقي عددين جي سيٽن کي جدولي نموني ۾ نٿو لکجي سگهجي.

مٿي ڏنل سيٽن کي هيٺين ريت به ظاهر ڪري سگهجي ٿو. $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{P}, \mathbb{O}, \mathbb{E}, \mathbb{Z}, \mathbb{W}, \mathbb{N}$

17.1 (ii) سيٽن جا قسم ۽ ظاهر ڪرڻ جا نمونا (Types of sets and representation of sets)

سڀ کان اڳ ۾ اسين سيٽن کي ظاهر ڪرڻ بابت غور ڪنداسين. اسين اڳيئي سيٽ کي ظاهر ڪرڻ وارن ٽن طريقن يا نمونن سان واقف آهيون جيڪي اسان هيٺين ڪلاس ۾ پڙهي چڪا آهيون. اهي هي آهن.


1. بياني نمونو (Descriptive form) 2. جدولي نمونو (Tabular form) 3. علامتي نمونو (Set-builder form)

اسان کي خبر آهي ته، بياني طريقي ۾، هڪ سيٽ کي ان جي رڪنن جي هڪجهڙي خاصيت جي مدد سان ڪنهن عام زبان ۾ بيان ڪيو ويندو آهي، جهڙوڪ:

5 ۽ 10 جي وچ وارن قدرتي عددين جو سيٽ $A =$

جدولي نموني ۾ هڪ سيٽ جي رُڪنن کي وچين ڏنگيءَ جي اندر لکي يا داخل ڪري، سيٽ کي بيان ڪيو ويندو آهي. مٿي ڏنل سيٽ کي جدولي نموني ۾ هيئن لکبو: $A = \{5, 6, 7, 8, 9\}$ جڏهن ته علامتي نموني ۾ هڪ سيٽ جي رُڪنن جي هڪجهڙي خاصيت لاءِ علامتن جو استعمال ڪندي، سيٽ کي بيان ڪبو آهي.

ڏنل سيٽ A کي علامتي نموني ۾ هيئن لکبو: $A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge 5 < x < 10\}$



مثال 1: سيٽ $A = \{6, 8, 10, 12\}$ کي بياني ۽ علامتي نموني ۾ لکو-
حل:

بياني نمونو: 5 ۽ 13 جي وچ وارن ٻڌي عددن جو سيٽ $A =$

علامتي نمونو: $A = \{x \mid x \in \mathbb{E} \wedge 5 < x < 13\}$

مثال 2: سيٽ $B = \{y \mid y \in \mathbb{P} \wedge y < 10\}$ کي جدولِي ۽ بياني نموني ۾ لکو-
حل:

جدولي نمونو: $B = \{2, 3, 5, 7\}$

بياني نمونو: پهرين چئن مفرد عددن جو سيٽ $B =$
هاڻي اسين سيٽن جا ڪجهه قسم سکون ٿا.

خالي سيٽ (Empty set or Null set):

اهڙو سيٽ جنهن ۾ ڪو به رُڪن نه هجي، ان کي خالي سيٽ چئبو آهي. ان کي $\emptyset$ يا $\{ \}$ سان ظاهر ڪبو آهي.

مثال طور:

(i) $A =$ 5 ۽ 6 جي وچ وارن ٻڌي عددن جو سيٽ

(ii) $B = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x < 1\}$

محدود سيٽ (Finite Set):

هڪ سيٽ جنهن جي رُڪنن جو تعداد محدود هجي، ان کي محدود سيٽ چئبو آهي.

مثال طور:

(i) $A = \{10, 12, 14, \dots, 50\}$

(ii) $B =$ دنيا جي سڀني ملڪن جو سيٽ

ياد رکجي ته خالي سيٽ هڪ محدود سيٽ تصور ڪبو آهي.

لامحدود سيٽ (Infinite Set):

هڪ سيٽ جنهن جي رُڪنن جو تعداد محدود نه هجي، ان کي لامحدود سيٽ چئبو آهي.

مثال طور:

(i) $P = \{10, 20, 30, \dots\}$

(ii) $Q = \{x \mid x \in \mathbb{Q} \wedge 1 \leq x \leq 2\}$

ماتحت سيٽ (Subset):

جيڪڏهن سيٽ A جو هر هڪ رُڪن يا ميمبر، سيٽ B جو به رُڪن هجي ته پوءِ A کي B جو ماتحت سيٽ چئبو.

علامت ۾ ان کي هيئن لکبو: $A \subseteq B$

مثال طور: $A = \{2, 3, 5, 7\}$ ، $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ۽ $C = \{6, 7, 8, 9\}$

ته پوءِ $A \subseteq B$ پر $A \not\subseteq C$ (A ماتحت سيٽ نه آهي C جو)

نوٽ: (i) هر هڪ سيٽ پنهنجي پاڻ جو ماتحت سيٽ هوندو آهي.

(ii) خالي سيٽ، هر هڪ سيٽ جو ماتحت سيٽ هوندو آهي.

(iii) هر هڪ غير خالي سيٽ جا گهٽ ۾ گهٽ ٻه ماتحت سيٽ هوندا آهن.

(iv) n رُڪنن واري سيٽ جي ماتحت سيٽن جو تعداد 2^n آهي.


بالا سيٽ (Superset):

جيڪڏهن سيٽ A ماتحت سيٽ آهي سيٽ B جو ته پوءِ A کي B جو بالا سيٽ چئبو.

نشاني طور هيئن لکبو: $B \supseteq A$

مثال طور:

جيڪڏهن $X = \{a, e, i, o, u\}$ ۽ $Y = \{a, b, c, \dots, z\}$ ته پوءِ $Y \supseteq X$



برابر سیت (Equal Sets):

ٻه ساڳي تعداد وارا سیت A ۽ B برابر سیت ڪوٺبا جيڪڏهن ٻنهي سیتن جا سڀ رُڪن ساڳيا هجن.

علامتن ۾ هن ريت لکبو: $A = B$

اهڙيءَ طرح $A = B$ فقط ان صورت ۾ ئي ٿيندو جڏهن $A \subseteq B$ ۽ $B \subseteq A$

ساڳي ريت $A = B$ فقط ان صورت ۾ ئي ٿيندو جڏهن $A \supseteq B$ ۽ $B \supseteq A$

مثال: فرض ڪريو ته $A = \{1, 2, 3, 6\}$, $B = \{x \mid x \in N \wedge x \leq 6\}$ ۽ $C =$ هتي $A = C$ پر $A \neq B$

نوٽ: سیت A جي ترتيب (order of set A) جو مطلب A جي رُڪنن جو تعداد آهي. ان کي نشاني طور $O(A)$ يا $n(A)$ يا $|A|$ لکبو.

هڪجيترا سیت (Equivalent Sets):

ٻه سیت A ۽ B هڪجيترا سیت ڪوٺبا جيڪڏهن انهن جي رُڪنن جو تعداد برابر هجي.

علامتن ۾ هيئن لکبو: $A \sim B$ يعني $A \sim B$ ان صورت ۾ ئي ٿيندو جڏهن $O(A) = O(B)$

اهڙيءَ طرح جيڪڏهن $A \sim B$ ته پوءِ ٻنهي سیتن جي رُڪنن جي وچ ۾ 1-1 مطابقت قائم ٿي سگهجي ٿي.

مثال طور: فرض ڪريو ته $A = \{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge x^2 = 64\}$ ۽ $B =$ 5 کان گهٽ مفرد عددين جو سیت

هتي $A \sim B$ ڇاڪاڻ جو $O(A) = O(B) = 2$

واجب ماتحت سیت (Proper Subset):

فرض ڪريو ته سیت A ماتحت سیت آهي سیت B جو ته سیت A کي B جو واجب ماتحت سیت چئبو

جيڪڏهن $A \neq B$ نشاني طور: اسين هن ريت لکنداسين: $A \subset B$

مثال طور: جيڪڏهن $A = \{2, 4, 6\}$ ۽ $B = \{2, 4, 6, 8\}$

ته پوءِ $A \subset B$ ڇاڪاڻ جو A ماتحت سیت آهي B جو ۽ $A \neq B$

غير واجب ماتحت سیت (Improper Subset):

فرض ڪريو ته سیت A ماتحت سیت آهي سیت B جو ته سیت A کي B جو غير واجب ماتحت سیت چئبو

جيڪڏهن $A = B$

مثال طور: جيڪڏهن $A = \{a, b, c\}$ ۽ انگريزي الف بي جي پهرين ٽن اکرن جو سیت $B =$

ته پوءِ A غير واجب ماتحت سیت آهي B جو يعني $A = B$

سگه سیت (Power Set):

سیت A جي سڀني ماتحت سیتن جي سیت کي A جو سگه سیت چئبو آهي. اهو علامتن ۾ $P(A)$ لکبو آهي

مثال طور: جيڪڏهن $A = \{x, y, z\}$ ته پوءِ $P(A) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x, y\}, \{y, z\}, \{x, z\}, \{x, y, z\}\}$

نوٽ: خالي سیت جو سگه سیت غير خالي هوندو آهي.

واحد سیت (Singleton or Unit Set):

اهڙو سیت جنهن ۾ فقط هڪڙو رُڪن هجي، ان کي واحد سیت چئبو آهي.


مثال طور: $A = \{x \mid x \in W \wedge x < 1\}$ واحد سیت آهي.

ڪائناتي سیت (Universal Set):

زير غور سمورن سیتن جي بالا سیت کي ڪائناتي سیت چئبو آهي. ان کي U يا X سان ظاهر ڪبو آهي.

مثال طور: جيڪڏهن $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ۽ $B = \{2, 4, 6\}$ ته پوءِ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

نوٽ: سیتن جي وڌيڪ قسمن تي سيڪشن 17.1(iv) ۾ بحث ڪنداسين.



مشق 17.1

1. هيٺ ڏنل سيٽن کي جدولِي نموني ۾ لکو.
 - (i) $A = -3$ ۽ 3 جي وچ وارن سمورن سڄن عددن جو سيٽ
 - (ii) $B = 11$ کان گهٽ مرکب عددن جو سيٽ
 - (iii) $C = \{x \mid x \in \mathbb{P} \wedge 5 < x \leq 13\}$
 - (iv) $D = \{y \mid y \in \mathbb{Q} \wedge 7 < y < 17\}$
 - (v) $E = \{z \mid z \in \mathbb{R} \wedge z^2 = 121\}$
 - (vi) $F = \{p \mid p \in \mathbb{Q} \wedge p^2 = -1\}$
2. هيٺ ڏنل سيٽن کي علامتي نموني ۾ لکو.
 - (i) $A = 5$ ۽ 6 جي وچ وارن سمورن ناطق عددن جو سيٽ
 - (ii) $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$
 - (iii) $C = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm 40\}$
 - (iv) $D = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$
 - (v) $E = \{1, 4, 9, 16, 25\}$
 - (vi) $F = \{-1, -3, -5, -7, \dots\}$
3. خالي سيٽ جا ڪي ٻه پنج مثال لکو.
4. هيٺين مان محدود ۽ لامحدود سيٽ ڌار ڌار ڪريو.
 - (i) ايشيائي ملڪن جو سيٽ
 - (ii) دنيا جي سڀني ميڊيڪل يونيورسٽين جو سيٽ
 - (iii) 6 ۽ 9 جي وچ وارن سمورن حقيقي عددن جو سيٽ
 - (iv) سمورن ٻڏي مفرد عددن جو سيٽ
 - (v) 5 کان گهٽ سمورن اڪي عددن جي سيٽ
5. هيٺين سيٽن مان هر هڪ جو هڪ هڪجيترو سيٽ، هڪ غير واجب ماتحت سيٽ ۽ ٽي واجب ماتحت سيٽ لکو.
 - (i) $P = \{a, e, i, o, u\}$
 - (ii) $Q = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge -2 \leq x \leq 2\}$
6. علامتي نموني ۾ واحد سيٽ جا ڪي ٻه مثال لکو.
7. هيٺين سيٽن جا سگهه سيٽ لھو.
 - (i) $A = \{5, 10, 15\}$
 - (ii) $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge -1 < x < 4\}$
8. هڪ سيٽ لکو.
 - (i) جنهن جا فقط ٻه واجب ماتحت سيٽ هجن
 - (ii) جنهن جو فقط هڪ واجب ماتحت سيٽ هجي
 - (iii) جنهن جو ڪو به واجب سيٽ ماتحت نه هجي



17.1 (iii) سٽن تي عمل (Operations on sets):

- ◀ ميلاپ (Union)
- ◀ ڪاٽ (Intersection)
- ◀ فرق (Difference)
- ◀ ڪامپليمينٽ (Complement)

ٻن سٽن جو ميلاپ (Union of two sets):

ٻن سٽن X ۽ Y جو ميلاپ، هڪ اهڙو سٽ آهي جنهن جا رُڪن X سان يا Y سان يا ٻنهي X ۽ Y سان تعلق رکن ٿا. X ۽ Y جو ميلاپ، علامتي طور $X \cup Y$ سان ظاهر ڪيو آهي.

يعني $X \cup Y = \{x | x \in X \vee x \in Y\}$

مثال طور: جيڪڏهن $X = \{1, 3, 5\}$ ۽ $Y = \{1, 2, 3, 4\}$ ته پوءِ $X \cup Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

ٻن سٽن جي ڪاٽ (Intersection of two sets):

ٻن سٽن X ۽ Y جي ڪاٽ، هڪ اهڙو سٽ آهي جنهن جا رُڪن ٻنهي X ۽ Y سان تعلق رکن ٿا. X ۽ Y جي ڪاٽ کي علامتي طور $X \cap Y$ سان ظاهر ڪيو آهي.

يعني $X \cap Y = \{x | x \in X \wedge x \in Y\}$

مثال طور:

جيڪڏهن $X = \{2, 4, 6, 8\}$ ۽ $Y = \{1, 2, 3, 6\}$ ته پوءِ $X \cap Y = \{2, 6\}$

ٻن سٽن جو فرق (Difference of two sets):

ڪن به ٻن سٽن X ۽ Y لاءِ، فرق $X - Y$ هڪ اهڙو سٽ آهي جنهن جا سڀ رُڪن X سان تعلق رکن ٿا پر Y سان تعلق نٿا رکن ان کي $X \setminus Y$ سان به ظاهر ڪيو آهي. يعني ته $X - Y = \{x | x \in X \wedge x \notin Y\}$

ساڳي ريت، فرق $Y - X$ هڪ اهڙو سٽ آهي جنهن جا سڀ رُڪن Y سان تعلق رکن ٿا پر X سان تعلق نٿا رکن ان کي Y/X سان به ظاهر ڪيو آهي. يعني ته $Y - X = \{y | y \in Y \wedge y \notin X\}$

مثال طور:

جيڪڏهن $X = \{4, 6, 8, 9, 10\}$ ۽ $Y = \{2, 4, 6, 8\}$

ته پوءِ $X - Y = \{9, 10\}$

۽ $Y - X = \{2\}$

سٽ جو ڪامپليمينٽ (Complement of a set):

جيڪڏهن سٽ A ماتحت سٽ آهي ڪائناتي سٽ U جو ته پوءِ A جو ڪامپليمينٽ U جي ان سمورن رڪنن جو سٽ آهي جيڪي A ۾ نه هجن ان کي A' يا A^c سان ظاهر ڪيو آهي.

اهڙيءَ طرح $A' = U - A$

يعني ته $A' = \{x | x \in U \wedge x \notin A\}$


مثال طور:

جيڪڏهن $U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$ ۽ $A = \{1, 3, 5, \dots, 19\}$ ته پوءِ $A' = \{2, 4, 6, \dots, 20\}$

17.1 (iv) ٻن سٽن جو همشڪلي فرق (Symmetric difference of two sets):

ٻن سٽن A ۽ B جو همشڪلي فرق هڪ اهڙو سٽ آهي جنهن جا رُڪن A يا B ۾ هوندا پر ٻنهي سٽن ۾ مشترڪ نه هوندا A ۽ B جي همشڪلي فرق کي $A \Delta B$ سان ظاهر ڪيو آهي.

يعني ته $A \Delta B = \{x | x \in A \cup B \wedge x \notin A \cap B\}$ يا $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$



مثال طور: جيڪڏهن $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ۽ $B = \{1, 3, 5, 7\}$ ته پوءِ $A \Delta B = \{2, 4, 7\}$ سيڪشن 17.1(ii) جي تسلسل ۾ سڀتن جا وڌيڪ قسم هيٺ ڏجن ٿا.

منفرد سيٽ (Disjoint Sets):

ٻن سيٽن A ۽ B کي منفرد سيٽ ڪوٺبو جيڪڏهن انهن ۾ ڪو به رڪن مشترڪ نه هجي. يعني ته ٻه سيٽ A ۽ B منفرد سيٽ آهن جيڪڏهن $A \cap B = \emptyset$

مثال طور: سيٽ $A = \{1, 3, 5\}$ ۽ $B = \{2, 4, 6\}$ منفرد سيٽ آهن.

لاڳاپيل سيٽ (Overlapping Sets):

ٻه سيٽ A ۽ B لاڳاپيل سيٽ ڪوٺبا جيڪڏهن ٻنهي سيٽن ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ رڪن مشترڪ هجي. تنهن کانسواءِ ٻنهي مان ڪو به ٻئي جو ماتحت سيٽ نه هجي يعني ته ٻه سيٽ A ۽ B لاڳاپيل سيٽ آهن جيڪڏهن $A \cap B \neq \emptyset$ يا $A \not\subseteq B$ يا $B \not\subseteq A$

مثال طور: سيٽ $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ۽ $B = \{2, 4, 6, 8\}$ لاڳاپيل سيٽ آهن

مڪمل سيٽ (Exhaustive Sets):

جيڪڏهن ٻه سيٽ A ۽ B ماتحت سيٽ آهن ڪائناتي سيٽ U جا ته پوءِ A ۽ B مڪمل سيٽ ڪوٺبا

جيڪڏهن $A \cup B = U$

مثال طور: جيڪڏهن $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ، $B = \{1, 3, 5\}$ ۽ $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ته پوءِ A ۽ B مڪمل سيٽ آهن

ڇاڪاڻ جو $A \cup B = U$

جُزا (Cells):

جيڪڏهن A ۽ B ٻه غير خيالي ماتحت سيٽ آهن ڪائناتي سيٽ U جا ته پوءِ A ۽ B جُزا ڪوٺبا جيڪڏهن اهي منفرد سان گڏوگڏ مڪمل سيٽ پڻ هجن.

يعني ته A ۽ B جُزا ڪوٺبا جيڪڏهن A ۽ B غير خالي ماتحت سيٽ آهن U جا، $A \cap B = \emptyset$ ۽ $A \cup B = U$

مثال طور: جيڪڏهن $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ، $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ۽ $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ ته پوءِ A ۽ B جُزا آهن.

سڀتن تي عملن (Operations on sets) سان لاڳاپو رکندڙ ڪجهه مکيه قانون هيٺيان آهن

ذاتي عنصر وارا قانون (Identity Laws):

ڪنهن به سيٽ A لاءِ

- (i) $A \cup \emptyset = A$ (ii) $A \cup U = U$ (iii) $A \cap U = A$ (iv) $A \cap \emptyset = \emptyset$

هڪجهڙائي وارا قانون (Idempotent Laws):

ڪنهن به سيٽ A لاءِ

- (i) $A \cup A = A$ (ii) $A \cap A = A$

ڪامپليمينٽ وارا قانون (Laws of the Complement):

ڪنهن به سيٽ A لاءِ

- (i) $A \cup A' = U$ (ii) $A \cap A' = \emptyset$
(iii) $(A')' = A$ (iv) $\emptyset' = U$ ۽ $U' = \emptyset$

ڊي مارگن جا قانون (De Morgan's Laws):

ڪن به ٻن سيٽن A ۽ B لاءِ

- (i) $(A \cup B)' = A' \cap B'$ (ii) $(A \cap B)' = A' \cup B'$



مشق 17.2

1. هيٺين مان ڪهڙا منفرد سيٽ، لاڳاپيل سيٽ، مڪمل سيٽ يا جُزا آهن.

$$\{4, 6, 8, 9, 10\} \text{ ۽ } \{1, 2, 3, 5, 7\} \quad (i)$$

$$\{1, 2, 4, 8\} \text{ ۽ } \{1, 2, 3, 6\} \quad (ii)$$

$$U = Z \text{ ۽ } O \text{ جڏهن ته } U = Z \quad (iii)$$

$$U = \{x \mid x \in Z \wedge x \geq 0\} \text{ ۽ } W \text{ جڏهن ته } U = \{x \mid x \in Z \wedge x \geq 0\} \quad (iv)$$

$$U = \mathbb{R} \text{ ۽ } Q' \text{ جڏهن ته } U = \mathbb{R} \quad (v)$$

2. جيڪڏهن $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ۽ $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ته پوءِ هيٺيان لھو:

$$(i) \quad A \cup B \quad (ii) \quad B \cap A \quad (iii) \quad A - B$$

$$(iv) \quad B - A \quad (v) \quad A \Delta B$$

3. جيڪڏهن $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ۽ $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ، $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ ته پوءِ هيٺيان لھو:

$$(i) \quad A' \quad (ii) \quad B' \quad (iii) \quad A' \cup B' \quad (iv) \quad A' \cap B'$$

$$(v) \quad (A \cup B)' \quad (vi) \quad (A \cap B)' \quad (vii) \quad A' \Delta B' \quad (viii) \quad (A \Delta B)'$$

$$(ix) \quad A - B' \quad (x) \quad A' - B$$

4. جيڪڏهن $P = \{p \mid p \in E \wedge -4 < p < 8\}$ ، $U = \{x \mid x \in Z \wedge -4 < x < 6\}$ ته پوءِ تصديق ڪريو ته

$$Q = \{q \mid q \in P \wedge q < 6\}$$

$$(i) \quad P - Q = P \cap Q' \quad (ii) \quad Q - P = Q \cap P'$$

$$(iii) \quad (P \cup Q)' = P' \cap Q' \quad (iv) \quad (P \cap Q)' = P' \cup Q'$$

5. جيڪڏهن $C = \{4n \mid n \in N\}$ ۽ $B = \{3n \mid n \in N\}$ ، $A = \{2n \mid n \in N\}$ ته پوءِ هيٺيان لھو:

$$(i) \quad A \cap B \quad (ii) \quad A \cup C \quad (iii) \quad B \cap C$$

17.1.2(i) ميلاپ ۽ ڪاٽ جون خاصيتون (Properties of Union and Intersection):

ٻن يا ٽن سيٽن جي ميلاپ ۽ ڪاٽ وارين هيٺين بنيادي خاصيتن جون رسمي ثابتيون ڏيڻ:

< ميلاپ جي مٽا واري خاصيت (Commutative Property of Union):

$$A \cup B = B \cup A \text{ لاءِ } A \text{ ۽ } B$$

اسان کي خبر آهي ته ڪن به ٻن سيٽن A ۽ B لاءِ $A \cup B = B \cup A$ ان خاصيت کي ميلاپ جي مٽا واري خاصيت چئبو آهي.

ثابتي:

$$L.H.S = A \cup B$$

$$= \{x \mid x \in A \text{ يا } x \in B\}$$

$$= \{x \mid x \in B \text{ يا } x \in A\}$$

$$= B \cup A$$

$$= R.H.S$$

$$\therefore L.H.S = R.H.S$$


$$\therefore A \cup B = B \cup A$$

انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.

(ميلاپ جي وصف مطابق)

($\therefore$ سيٽ ۾ رُڪنن جي ترتيب مستقل نه هوندي آهي)

(ميلاپ جي وصف مطابق)



◀ کات جي مٽا واري خاصيت (Commutative Property of Intersection):

اسان کي خبر آهي ته ڪن ٻن سيٽن A ۽ B لاءِ $A \cap B = B \cap A$ ان خاصيت کي کات جي مٽا واري خاصيت چئبو آهي.

ثابتي:

$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= A \cap B \\ &= \{x \mid x \in A \text{ ۽ } x \in B\} && (\text{کاتا جي وصف مطابق}) \\ &= \{x \mid x \in B \text{ ۽ } x \in A\} && \because (\text{سيٽن ۾ رُڪنن جي ترتيب مستقل نه هوندي آهي}) \\ &= B \cap A && (\text{کات جي وصف مطابق}) \\ &= \text{R.H.S} \\ \therefore \text{L.H.S} &= \text{R.H.S} \\ \therefore A \cap B &= B \cap A \\ \text{انهيءَ کي ثابت ٿيو.} \end{aligned}$$

◀ ميلاپ جي سنگت واري خاصيت (Associative property of union):

اسين ميلاپ جي سنگت واري خاصيت کان اڳيئي واقف آهيون جيڪا هيٺين ريت آهي

ڪن ٻه تن سيٽن A ، B ۽ C لاءِ $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ ثابتي:


$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= A \cup (B \cup C) \\ &= \{x \mid x \in A \text{ يا } x \in B \cup C\} && (\text{ميلاپ جي وصف مطابق}) \\ &= \{x \mid x \in A \text{ يا } x \in B \text{ يا } x \in C\} \\ &= \{x \mid x \in A \cup B \text{ يا } x \in C\} && (\text{ميلاپ جي وصف مطابق}) \\ &= (A \cup B) \cup C && (\text{ميلاپ جي وصف مطابق}) \\ &= \text{R.H.S} \\ \therefore \text{L.H.S} &= \text{R.H.S} \\ \therefore A \cup (B \cup C) &= (A \cup B) \cup C \\ \text{انهيءَ کي ثابت ٿيو.} \end{aligned}$$

◀ کاتا جي سنگت واري خاصيت (Associative property of intersection):

اسان کي کات جي سنگت واري خاصيت جي اڳيئي خبر آهي جيڪا بيان ڪري ٿي ته، ڪن ٻه تن سيٽن

A ، B ۽ C لاءِ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ ثابتي:

$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= A \cap (B \cap C) \\ &= \{x \mid x \in A \text{ ۽ } x \in B \cap C\} && (\text{کاتا جي وصف جي مطابق}) \\ &= \{x \mid x \in A \text{ ۽ } x \in B \text{ ۽ } x \in C\} \\ &= \{x \mid x \in A \cap B \text{ ۽ } x \in C\} && (\text{کاتا جي وصف جي مطابق}) \\ &= (A \cap B) \cap C && (\text{کاتا جي وصف جي مطابق}) \\ &= \text{R.H.S} \\ \therefore \text{L.H.S} &= \text{R.H.S} \\ \therefore A \cap (B \cap C) &= (A \cap B) \cap C \\ \text{انهيءَ کي ثابت ٿيو.} \end{aligned}$$



< **میلاپ جي ڪاٽ جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت (Distributive property of union over intersection):**
 اسين هيٺين ڪلاس ۾ اڳيئي ميلاپ جي ڪاٽ جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت پڙهي چڪا آهيون
 جيڪا هيٺين ريت آهي.

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad \text{ڪن به سِيٽن } A, B \text{ ۽ } C \text{ لاءِ}$$

ثابتي:


$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= A \cup (B \cap C) \\ &= \{x | x \in A \text{ يا } x \in B \cap C\} && \text{(میلاپ جي خاصيت مطابق)} \\ &= \{x | x \in A \text{ يا } (x \in B \text{ ۽ } x \in C)\} && \text{(ڪاٽا جي وصف مطابق)} \\ &= \{x | (x \in A \text{ يا } x \in B) \text{ ۽ } (x \in A \text{ يا } x \in C)\} \\ &= \{x | x \in A \cup B \text{ ۽ } x \in A \cup C\} && \text{(میلاپ جي وصف مطابق)} \\ &= (A \cup B) \cap (A \cup C) && \text{(ڪاٽا جي وصف مطابق)} \\ &= \text{R.H.S} \\ \therefore \quad \text{L.H.S} &= \text{R.H.S} \\ \therefore \quad A \cup (B \cap C) &= (A \cup B) \cap (A \cup C) \\ &\text{انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.}\end{aligned}$$

< **ڪاٽا جي ميلاپ جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت (Distributive property of intersection over union):**
 اسين اڳيئي ڪاٽا جي ميلاپ جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت سان واقف آهيون.
 جيڪا هيٺين ريت آهي.

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad \text{ڪن به ٽن سِيٽن } A, B \text{ ۽ } C \text{ لاءِ}$$

ثابتي:

$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= A \cap (B \cup C) \\ &= \{x | x \in A \text{ ۽ } x \in B \cup C\} && \text{(ڪاٽا جي وصف مطابق)} \\ &= \{x | x \in A \text{ ۽ } (x \in B \text{ يا } x \in C)\} && \text{(میلاپ جي وصف مطابق)} \\ &= \{x | (x \in A \text{ ۽ } x \in B) \text{ يا } (x \in A \text{ ۽ } x \in C)\} \\ &= \{x | x \in A \cap B \text{ يا } x \in A \cap C\} && \text{(ڪاٽا جي وصف مطابق)} \\ &= (A \cap B) \cup (A \cap C) && \text{(میلاپ جي وصف مطابق)} \\ &= \text{R.H.S} \\ \therefore \quad \text{L.H.S} &= \text{R.H.S} \\ \therefore \quad A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C) \\ &\text{انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.}\end{aligned}$$



< ڊي مارگن جا قانون (De Morgan's Laws):

اسين اڳيئي سيڪشن 17.1(iv) ۾ پڙهي چڪا آهيون ته ڊي مارگن جا قانون ٻه هوندا آهن. جيڪي هيٺين ريت آهن. ڪن به ٻن سيٽن A ۽ B لاءِ

$$(i) \quad (A \cup B)' = A' \cap B' \quad (ii) \quad (A \cap B)' = A' \cup B'$$

ثابتي (i): $(A \cup B)' = A' \cap B'$

$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= (A \cup B)' \\ &= \{x \mid x \in U \text{ ۽ } x \notin A \cup B\} && \text{(ڪامپليمينٽ جي وصف مطابق)} \\ &= \{x \mid x \in U \text{ ۽ } (x \notin A \text{ ۽ } x \notin B)\} \\ &= \{x \mid (x \in U \text{ ۽ } x \notin A) \text{ ۽ } (x \in U \text{ ۽ } x \notin B)\} \\ &= \{x \mid x \in A' \text{ ۽ } x \in B'\} && \text{(ڪامپليمينٽ جي وصف مطابق)} \\ &= A' \cap B' && \text{(ڪاٽا جي وصف مطابق)} \\ &= \text{R.H.S} \\ \therefore \quad \text{L.H.S} &= \text{R.H.S} \end{aligned}$$

$$\therefore \quad (A \cup B)' = A' \cap B'$$

انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.


ثابتي (ii): $(A \cap B)' = A' \cup B'$

$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= (A \cap B)' \\ &= \{x \mid x \in U \text{ ۽ } x \notin A \cap B\} && \text{(ڪامپليمينٽ جي وصف مطابق)} \\ &= \{x \mid x \in U \text{ ۽ } (x \notin A \text{ يا } x \notin B)\} \\ &= \{x \mid (x \in U \text{ ۽ } x \notin A) \text{ يا } (x \in U \text{ ۽ } x \notin B)\} \\ &= \{x \mid x \in A' \text{ يا } x \in B'\} && \text{(ڪامپليمينٽ جي وصف مطابق)} \\ &= A' \cup B' && \text{(مِلاپ جي وصف مطابق)} \\ &= \text{R.H.S} \\ \therefore \quad \text{L.H.S} &= \text{R.H.S} \\ \therefore \quad (A \cap B)' &= A' \cup B' \\ \text{انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.} \end{aligned}$$

17.1.2(ii) ڏنل سيٽن جي بنيادي خاصيتن جي چڪاس ڪرڻ:

اچو ته هيٺين مثالن جي مدد سان بنيادي خاصيتن جي چڪاس ڪريون.

مثال 1: جيڪڏهن $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ ۽ $B = \{4, 6, 8, 9, 10, 12\}$ ته پوءِ مِلاپ ۽ ڪاٽا جي مٿا واري خاصيت جي چڪاس ڪريو.



چڪاس:

(ب) کاتا جي مٿا واري خاصيت
يعني

$$A \cap B = B \cap A$$

L.H.S = $A \cap B$
 $= \{1, 2, 3, 4, 6, 12\} \cap \{4, 6, 8, 9, 10, 12\}$
 $= \{4, 6, 12\}$

R.H.S = $B \cap A$
 $= \{4, 6, 8, 9, 10, 12\} \cap \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$
 $= \{4, 6, 12\}$

$\therefore$ L.H.S = R.H.S
 $\therefore A \cap B = B \cap A$
 انهيءَ ڪري چڪاس ٿي.

(الف) ميلاپ جي مٿا واري خاصيت
يعني

$$A \cup B = B \cup A$$

L.H.S = $A \cup B$
 $= \{1, 2, 3, 4, 6, 12\} \cup \{4, 6, 8, 9, 10, 12\}$
 $= \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12\}$

R.H.S = $B \cup A$
 $= \{4, 6, 8, 9, 10, 12\} \cup \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$
 $= \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12\}$

$\therefore$ L.H.S = R.H.S
 $\therefore A \cup B = B \cup A$
 انهيءَ ڪري چڪاس ٿي.

مثال 2:

جيڪڏهن $A = \{1, 2, 5, 10\}$ ، $B = \{2, 3, 5, 7\}$ ۽ $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ته پوءِ ميلاپ ۽ کاتا جي سنگت واري خاصيت جي چڪاس ڪريو.

چڪاس:

(الف) ميلاپ جي سنگت واري خاصيت
يعني

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

L.H.S = $A \cup (B \cap C)$
 $= \{1, 2, 5, 10\} \cup [\{2, 3, 5, 7\} \cap \{1, 3, 5, 7, 9\}]$
 $= \{1, 2, 5, 10\} \cup \{3, 5, 7\}$
 $= \{1, 2, 3, 5, 7, 9, 10\}$

R.H.S = $(A \cup B) \cap C$
 $= [\{1, 2, 5, 10\} \cup \{2, 3, 5, 7\}] \cap \{1, 3, 5, 7, 9\}$
 $= \{1, 2, 3, 5, 7, 10\} \cap \{1, 3, 5, 7, 9\}$
 $= \{1, 2, 3, 5, 7, 9, 10\}$

$\therefore$ L.H.S = R.H.S
 $\therefore A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$
 انهيءَ ڪري چڪاس ٿي.


(ب) کاتا جي سنگت واري خاصيت
يعني

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$$

L.H.S = $A \cap (B \cup C)$
 $= \{1, 2, 5, 10\} \cap [\{2, 3, 5, 7\} \cup \{1, 3, 5, 7, 9\}]$
 $= \{1, 2, 5, 10\} \cap \{2, 3, 5, 7, 9\}$
 $= \{5\}$

R.H.S = $(A \cap B) \cup C$
 $= [\{1, 2, 5, 10\} \cap \{2, 3, 5, 7\}] \cup \{1, 3, 5, 7, 9\}$
 $= \{2, 5\} \cup \{1, 3, 5, 7, 9\}$
 $= \{1, 2, 3, 5, 7, 9, 10\}$

$\therefore$ L.H.S = R.H.S
 $\therefore A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$
 انهيءَ ڪري چڪاس ٿي.



مثال 3: جيڪڏهن $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ ، $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ۽ $C = \{3, 6, 9\}$ ته پوءِ چڪاس ڪريو

(الف) ميلاپ جي ڪاٽا جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت

(ب) ڪاٽا جي ميلاپ جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت

چڪاس:

(الف) ميلاپ جي ڪاٽا جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad \text{يعني}$$

$$L.H.S = A \cup (B \cap C)$$

$$= \{1, 2, 3, \dots, 10\} \cup [\{2, 4, 6, 8, 10\} \cap \{3, 6, 9\}]$$

$$= \{1, 2, 3, \dots, 10\} \cup \{6\}$$

$$= \{1, 2, 3, \dots, 10\}$$

$$R.H.S = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$= [\{1, 2, 3, \dots, 10\} \cup \{2, 4, 6, 8, 10\}] \cap [\{1, 2, 3, \dots, 10\} \cup \{3, 6, 9\}]$$

$$= \{1, 2, 3, \dots, 10\} \cap \{1, 2, 3, \dots, 10\}$$

$$= \{1, 2, 3, \dots, 10\}$$

$$\therefore L.H.S = R.H.S$$

$$\therefore A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

انهيءَ ڪري چڪاس ٿي.

(ب) ڪاٽا جي ميلاپ جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad \text{يعني}$$

$$L.H.S = A \cap (B \cup C)$$

$$= \{1, 2, 3, \dots, 10\} \cap [\{2, 4, 6, 8, 10\} \cup \{3, 6, 9\}]$$

$$= \{1, 2, 3, \dots, 10\} \cap \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$$

$$= \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$$

$$R.H.S = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$= [\{1, 2, 3, \dots, 10\} \cap \{2, 4, 6, 8, 10\}] \cup [\{1, 2, 3, \dots, 10\} \cap \{3, 6, 9\}]$$


$$= \{2, 4, 6, 8, 10\} \cup \{3, 6, 9\}$$

$$= \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$$

$$\therefore L.H.S = R.H.S$$

$$\therefore A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

انهيءَ ڪري چڪاس ٿي.



مثال 4: جيڪڏهن $U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$ ، $A = \{1, 3, 5, \dots, 19\}$ ۽ $B = \{2, 4, 6, \dots, 20\}$ ته پوءِ ڏي مارڳن جي

قانونن جي چڪاس ڪريو

$$(A \cap B)' = A' \cup B' \quad (\text{ب})$$

$$(A \cup B)' = A' \cap B' \quad (\text{الف})$$

يعني

چڪاس:

$$(A \cup B)' = A' \cap B' \quad (\text{الف})$$

$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= (A \cup B)' \\ &= U - (A \cup B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \{1, 2, 3, \dots, 20\} - [\{1, 3, 5, \dots, 19\} \cup \{2, 4, 6, \dots, 20\}] \\ &= \{1, 2, 3, \dots, 20\} - \{1, 2, 3, \dots, 20\} \\ &= \emptyset \end{aligned}$$

$$\text{R.H.S} = A' \cap B'$$

$$\begin{aligned} &= (U - A) \cap (U - B) \\ &= [\{1, 2, 3, \dots, 20\} - \{1, 3, 5, \dots, 19\}] \cap [\{1, 2, 3, \dots, 20\} - \{2, 4, 6, \dots, 20\}] \\ &= \{2, 4, 6, \dots, 20\} \cap \{1, 3, 5, \dots, 19\} \\ &= \emptyset \end{aligned}$$

$$\therefore \text{L.H.S} = \text{R.H.S}$$

$$\therefore (A \cup B)' = A' \cap B'$$

انهيءَ ڪري چڪاس ٿي.

$$(A \cap B)' = A' \cup B' \quad (\text{ب})$$

$$\text{L.H.S} = (A \cap B)'$$

$$\begin{aligned} &= U - (A \cap B) \\ &= \{1, 2, 3, \dots, 20\} - [\{1, 3, 5, \dots, 19\} \cap \{2, 4, 6, \dots, 20\}] \\ &= \{1, 2, 3, \dots, 20\} - \{\} \\ &= \{1, 2, 3, \dots, 20\} \end{aligned}$$


$$\text{R.H.S} = A' \cup B'$$

$$\begin{aligned} &= (U - A) \cup (U - B) \\ &= [\{1, 2, 3, \dots, 20\} - \{1, 3, 5, \dots, 19\}] \cup [\{1, 2, 3, \dots, 20\} - \{2, 4, 6, \dots, 20\}] \\ &= \{2, 4, 6, \dots, 20\} \cup \{1, 3, 5, \dots, 19\} \\ &= \{1, 2, 3, \dots, 20\} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{L.H.S} = \text{R.H.S}$$

$$\therefore (A \cap B)' = A' \cup B'$$

انهيءَ ڪري چڪاس ٿي.



مشق 17.3


1. هيٺين سيٽن لاءِ ميلاپ ۽ کاتا جي مٿا واري خاصيت جي چڪاس ڪريو.
 $B = \{a, e, i, o, u\}$ ۽ $A = \{a, b, c, d, e\}$ (i)
 $Q = \{y \mid y \in E^+ \wedge y \leq 4\}$ ۽ $P = \{x \mid x \in Z \wedge -3 < x < 3\}$ (ii)
2. هيٺين سيٽن لاءِ ميلاپ ۽ کاتا جي سنگت واري خاصيت جي چڪاس ڪريو.
 $C = \{1, 2, 5, 10\}$ ۽ $B = \{5, 10, 15, 20\}$, $A = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$ (i)
 $C = Z$ ۽ $B = P, A = N$ (ii)
3. هيٺين سيٽن لاءِ تصديق ڪريو.
 (الف) ميلاپ جي کاتا جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت
 (ب) کاتا جي ميلاپ جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت
 $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ۽ $B = \{2, 3, 5, 7\}$, $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ (i)
 $C = W$ ۽ $B = P, A = N$ (ii)
4. ڊي مارگن جي قانونن جي تصديق ڪريو جيڪڏهن $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, $U = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$ ۽ $B = \{2, 4, 6, 8\}$
5. جيڪڏهن A ۽ B ماتحت سيٽ آهن U جا ته پوءِ خاصيتن جو استعمال ڪندي هيٺيان ثابت ڪريو
 (i) $A \cup (A \cap B) = A \cap (A \cup B)$ (ii) $A \cup B = A \cup (A' \cap B)$
 (iii) $B = (A \cap B) \cup (A' \cap B)$ (iv) $A \subseteq B$ جيڪڏهن $B = A \cup (A' \cap B)$

17.1.3 وين ڊايگرام يا شڪليون (Venn Diagrams):

اسين هيٺين ڪلاسز ۾ اڳيئي پڙهي چڪا آهيون ته سيٽ، انهن جا تعلق ۽ عمل جاميٽري سان يا گرافن سان ظاهر ڪري سگهجن ٿا. انهيءَ جاميٽري واري اظهار کي وين ڊايگرام يا شڪليون چئبو آهي جيڪي انگريز رياضي دان جان وين (John Venn) جي نالي تي آهن. جان وين انهن کي 1881ع ۾ پيش ڪيو. وين شڪلين ۾ ڪائناتي سيٽ کي گهڻو ڪري مستطيل سان ظاهر ڪيو آهي. جڏهن ته گول يا بيضوي شڪليون سيٽن کي ظاهر ڪنديون آهن. ڪجهه وين شڪلين جو دؤر ڪريون ٿا.





(i) ڪائناتي سيٽ U جي اندر هڪ سيٽ A کي ڏيکاريندڙ وين شڪل



(ii) ٻن منفرد سيٽن A ۽ B کي ڏيکاريندڙ وين شڪل



(iii) ٻن لاڳاپيل سِيٽن A ۽ B کي ڏيکاريندڙ (iv) سِيٽ A جي ماتحت سِيٽ B کي ڏيکاريندڙ
وين شکل



(i) 17.1.3 وين شڪلين وسيلي هيٺيان ڏيکارڻ:


سِيٽن جو ميلاپ ۽ کاٽا:

سِيٽ جو ڪامپليمينٽ:


ٻن سِيٽن جو همشڪلي فرق:

سِيٽن جو ميلاپ ۽ کاٽا:

وين شڪلين ۾ ٻن سِيٽن A ۽ B جي ميلاپ کي ٻنهي سِيٽن A ۽ B جي سڄي ايراضي سان ظاهر ڪيو آهي. شڪل (i) ۾ شيڊ ڏنل يا رنگ ٿيل ايراضي $A \cup B$ کي ظاهر ڪري ٿي. جڏهن ته سِيٽن A ۽ B جي کاٽا کي ٻنهي سِيٽن A ۽ B جي مشترڪ ايراضي سان ظاهر ڪيو ويندو آهي. شڪل نمبر (ii) ۾، شيڊ ڏنل يا رنگ ٿيل ايراضي $A \cap B$ کي ظاهر ڪري ٿي.



شڪل (ii)



شڪل (i)


مثال 1: جيڪڏهن $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ۽ $B = \{2, 4, 6, 8\}$ ته پوءِ وين شڪلين وسيلي $A \cap B$ ۽ $A \cup B$ کي ڏيکاريو

حل:

شڪل (ب) ۾ رنگ ٿيل يا شيڊ ڏنل ايراضي، $A \cap B$ کي ڏيکاري ٿي
وين شڪل مان اسان حاصل ڪيو:

$$A \cap B = \{2, 4\}$$

$A \cap B$




شڪل (ب)


شڪل (الف) ۾ رنگ ٿيل يا شيڊ ڏنل ايراضي، $A \cup B$ کي ڏيکاري ٿي
وين شڪل مان اسان حاصل ڪيو:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$$


$A \cup B$



شڪل (الف)




A'




شکل (i)

A'




شکل (ii)

$A \Delta B$



شکل (i)

$A \Delta B$



شکل (ii)

سيت جو ڪامپليمينٽ (Complement of a set):

وين شڪل ۾، سيت A جو ڪامپليمينٽ، ڪائناتي سيت جي اُن ايراضي سان ڏيکاربو آهي جيڪا سيت A جي ايراضي ڪڍڻ کانپوءِ بچي. شڪل (i) ۾، شيڊ ڏنل يا رنگ ٿيل ايراضي A' کي ڏيکاري ٿي.

مثال:

جيڪڏهن $U = \{1, 2, 3, \dots, 8\}$ ۽ $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ته پوءِ وين شڪل وسيلي A' کي ڏيکاربو.

حل:

پاسي واري وين شڪل (شڪل ii) ۾ شيڊ ڏنل يا رنگ ٿيل ايراضي A' کي ڏيکاري ٿي.

تنهنڪري اسان وٽ آهي: $A' = \{5, 6, 7, 8\}$

ٻن سيتن جو همشڪلي فرق (Symmetric difference of two sets):

وين شڪل ۾، ٻن سيتن A ۽ B جي همشڪلي فرق کي $A \Delta B$ جي سڃي ايراضي، سواءِ مشترڪ ايراضي سان ڏيکاربو آهي. شڪل (i) ۾ رنگ ٿيل يا شيڊ ڏنل ايراضي $A \Delta B$ کي ڏيکاري ٿي.


مثال:

جيڪڏهن $U = \{a, b, c, d, e, f\}$ ۽ $A = \{a, c, e\}$ ۽ $B = \{a, b, c\}$ ته پوءِ وين شڪل وسيلي $A \Delta B$ کي ڏيکاربو.

حل:

پاسي واري وين شڪل (شڪل ii) ۾ شيڊ ڏنل يا رنگ ٿيل ايراضي $A \Delta B$ کي ڏيکاري ٿي.

تنهنڪري اسان وٽ آهي يعني: $A \Delta B = \{b, e\}$




17.1.3(ii) وین شکل وسیلي هیئین جي چکاس ڪرڻ:

- ◀ میلاپ ۽ کاتا جي مٽا واري خاصیت:
- ◀ ورهاست وارا قانون:
- ◀ سنگت وارا قانون:
- ◀ دي مارگن جا قانون:

◀ میلاپ ۽ کاتا جي مٽا واري خاصیت:

اچو ته هیئین مثال جي مدد سان، وین شکل وسیلي میلاپ ۽ کاتا جي مٽا واري خاصیت جي چکاس ڪریون. مثال: جیکڏهن $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ۽ $B = \{4, 6, 8\}$ ته پوءِ وین شکل وسیلي میلاپ ۽ کاتا جي مٽا واري خاصیت جي چکاس ڪریو.


چکاس (i): میلاپ جي مٽا واري خاصیت یعنی: $A \cup B = B \cup A$



شکل (ii)

شکل (ii) جي وین شکل مان

$$B \cup A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$$



شکل (i)

شکل (i) جي وین شکل مان


$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$$

جيئن ته شید ڏنل يا رنگ ٿیل ایراضیون ۽ انهن جا رکن برابر آهن جهڙي طرح شکل (i) ۽ شکل (ii) ۾ ڏیکاریو ویو آهي.

تنهنڪري $A \cup B = B \cup A$

انهيءَ ڪري چکاس ٿي.


چکاس (ii): کاتا جي مٽا واري خاصیت یعنی: $A \cap B = B \cap A$



شکل (ii)

شکل (ii) جي وین شکل مان

$$B \cap A = \{4, 6\}$$



شکل (i)


شکل (i) جي وین شکل مان

$$A \cap B = \{4, 6\}$$

جيئن ته شید ڏنل يا رنگ ٿیل ایراضیون ۽ انهن جا رکن برابر آهن جهڙي طرح شکل (i) ۽ شکل (ii) ۾ ڏیکاریو ویو آهي.

تنهنڪري $A \cap B = B \cap A$

انهيءَ ڪري چکاس ٿي.




< سنگت وارا قانون (Associative Laws):

وين شڪل وسيلي سنگت واري قانونن جي تصديق ڪرڻ لاءِ، اسين هيٺين مثال ڪڍون ٿا.
مثال: جيڪڏهن $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ، $B = \{6, 8, 10\}$ ۽ $C = \{5, 6, 7, 8\}$ ته پوءِ ميلاپ ۽ ڪاٽا جي سنگت واري قانونن جي تصديق ڪريو.

تصديق: ميلاپ جو سنگت وارو قانون يعني: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$


$$\text{R.H.S} = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cup B$$



شڪل (iii)

$$(A \cup B) \cup C$$




شڪل (iv)

شڪل (iv) جي وين شڪل مان

$$(A \cup B) \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10\}$$


$$\text{L.H.S} = A \cup (B \cup C)$$

$$B \cup C$$



شڪل (i)

$$A \cup (B \cup C)$$



شڪل (ii)


شڪل (ii) جي وين شڪل مان

$$A \cup (B \cup C) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10\}$$

جيئن ته شيد ڏنل يا رنگ ٿيل ايراضيون ۽ انهن جا رڪن برابر آهن جهڙي طرح شڪل (ii) ۽ شڪل (iv) ۾ ڏيکاريل آهي.

تنهنڪري $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$


انهيءَ ڪري تصديق ٿي.




تصديق: کاتا جو سنگت وارو قانون يعني: $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

$$\underline{R.H.S = (A \cap B) \cap C}$$


$$\underline{L.H.S = A \cap (B \cap C)}$$



شکل (iii)




شکل (i)



شکل (iv)

شکل (iv) جي وين شکل مان

$$(A \cap B) \cap C = \{6\}$$



شکل (ii)

شکل (ii) جي وين شکل مان

$$A \cap (B \cap C) = \{6\}$$

جيئن ته رنگ ٿيل يا شيد ڏنل ايراضيون ۽ انهن جا رڪن برابر آهن جهڙي طرح شکل (ii) ۽ شکل (iv) ۾ ڏيکاريل آهي.

تنهنڪري $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

انهيءَ ڪري تصديق ٿي.


◀ **ورهاست وارا قانون (Distributive Laws):**

هاڻي اسين هيٺين مثال جي مدد سان ، وين شکل وسيلي ورهاست واري قانونن جي تصديق ڪريون ٿا.

مثال:

وين شکل وسيلي ورهاست واري قانونن جي تصديق ڪريو جيڪڏهن $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ،

$C = \{2, 4, 6, 8\}$ ۽ $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$




تصديق:

(i) ميلاپ جو ڪات جي لحاظ کان ورهاست وارو قانون (Distributive law of union over intersection):


$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \text{ يعني:}$$

$$\text{R.H.S} = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$




شکل (iii)

$$\text{L.H.S} = A \cup (B \cap C)$$




شکل (i)

$$A \cup C$$



شکل (iv)

$$(A \cup B) \cap (A \cup C)$$




شکل (v)

شکل (v) جي وين شکل مان

$$(A \cup B) \cap (A \cup C) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A \cup (B \cap C)$$



شکل (ii)


شکل (ii) جي وين شکل مان

$$A \cup (B \cap C) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

جيئن ته شيد ڏنل يا رنگ ٿيل ايراضيون ۽ انهن جا رڪن برابر آهن جهڙي طرح شکل (ii) ۽ شکل (v) ۾ ڏيکاريل آهي.

تنهنڪري $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

انهيءَ ڪري تصديق ٿي.



تصديق:


(ii) ڪاتا جي ميلاپ جي لحاظ کان ورهاست وارو قانون : (Distributive law of intersection over union):

يعني: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$$\text{R.H.S} = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$


$$\text{L.H.S} = A \cap (B \cup C)$$

$A \cap B$




شکل (iii)

$B \cup C$




شکل (i)

$A \cap C$



شکل (iv)

$(A \cap B) \cup (A \cap C)$




شکل (v)

شکل (v) جي وين شکل مان

$$(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$A \cap (B \cup C)$



شکل (ii)


شکل (ii) جي وين شکل مان

$$A \cap (B \cup C) = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

جيئن ته شيد ڏنل يا رنگ ٿيل ايراضيون ۽ انهن جا رڪن برابر آهن جهڙي طرح شکل (ii) ۽ شکل (v) ۾ ڏيکاريل آهي.

تنهنڪري $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

انهيءَ ڪري تصديق ٿي.



◀ ڊي مارگن جا قانون (De Morgan's Laws):

اچو ته هيٺين مثال جي مدد سان، وين شڪل ذريعي ڊي مارگن جي قانون جي تصديق ڪريون.


مثال: وين شڪل وسيلي ڊي مارگن جي قانونن جي تصديق ڪريو

جيڪڏهن $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ۽ $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$


تصديق: (i) $(A \cup B)' = A' \cap B'$

$$\underline{L.H.S = (A \cup B)'}$$


$$\underline{R.H.S = A' \cap B'}$$




شڪل (iii)



شڪل (i)




شڪل (iv)



شڪل (v)

شڪل (v) جي وين شڪل مان

$$A' \cap B' = \{7, 9\}$$



شڪل (ii)


شڪل (ii) جي وين شڪل مان

$$(A \cup B)' = \{7, 9\}$$

جيئن ته شيڊ ڏنل يا رنگ ٿيل ايراضيون ۽ انهن جا رڪن برابر آهن جيئن شڪل (ii) ۽ شڪل (v) ۾ ڏيکاريل آهي.

تنهنڪري $(A \cup B)' = A' \cap B'$

انهيءَ ڪري تصديق ٿي.




تصديق (ii): $(A \cap B)' = A' \cup B'$

$$\text{L.H.S} = (A \cap B)'$$


$$\text{R.H.S} = A' \cup B'$$

A'




شكل (iii)

B'



شكل (iv)

$$A' \cup B'$$




شكل (v)

شكل (v) جي وين شكل مان


$$A' \cup B' = \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10\}$$

$A \cap B$



شكل (i)

$$(A \cap B)'$$



شكل (ii)


شكل (ii) جي وين شكل مان

$$(A \cap B)' = \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10\}$$

جيئن ته شيڊ ڏنل يا رنگ ٿيل ايراضيون ۽ انهن جا رڪن برابر آهن جيئن شكل (ii) ۽ شكل (v) ۾ ڏيکاريل آهي.

تنهنڪري $(A \cap B)' = A' \cup B'$

انهيءَ ڪري تصديق ٿي.



مشق 17.4

- جيڪڏهن A ۽ B ڪائناتي سيٽ U جا ڪي به ٻه ماتحت سيٽ آهن ته پوءِ $A \Delta B, A \cap B, A \cup B$ جيڪڏهن $A - B$ جون عام وين شڪيلون ٺاهيو جيڪڏهن
 - A ۽ B منفرد سيٽ آهن.
 - A ۽ B لاڳاپيل سيٽ آهن.
 - A ماتحت سيٽ آهي B جو.
- وين شڪلين وسيلي ميلاپ ۽ ڪاٽا جي مٿا واري خاصيت جي چڪاس ڪريو. جيڪڏهن
 - $A = \{a, b, c, d, e\}$ ۽ $B = \{a, e, i, o, u\}$
 - $P = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ ۽ $Q = \{2, 4, 6, 8, 10\}$
- وين شڪلين وسيلي ڊي مارگن جي قانونن جي تصديق ڪريو. جيڪڏهن $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{5, 6, 7, 8\}$ ۽ $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$
- وين شڪلين وسيلي سنگت ۽ ورهاست واري قانونن جي تصديق ڪريو. جيڪڏهن $A = \{1, 2, 3, \dots, 8\}$, $B = \{4, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ۽ $C = \{5, 7, 9, 11\}$

17.1.4 ترتيب ڏنل جوڙا ۽ ڪارٽيسي ضرب آپٽ (Ordered pairs and Cartesian product):

ڪارٽيسي ضرب آپٽ، فرانسيسي رياضي دان رين ڊڪارٽس (Rene Descartes) جي نالي تي آهي جنهن تجزياتي جاميٽري (Analytical Geometry) جو تعارف ڪرايو. تجزياتي جاميٽري ۾ هموار سطح يا پلين (Plane) تي ٽيڪن جو هنڌ لهڻ لاءِ ترتيب ڏنل جوڙن جو استعمال ٿيندو آهي. اچو ته ترتيب ڏنل جوڙن ۽ ڪارٽيسي ضرب آپٽ تي تفصيلي بحث ڪريون.

(i) 17.1.4 ترتيب ڏنل جوڙن جي سڃاڻپ ڪرڻ:

عددن جو هڪ اهڙو جوڙو جنهن ۾ ترتيب برقرار هجي تنهن کي ترتيب ڏنل جوڙو چئبو آهي. ڪن به حقيقي عددن a ۽ b لاءِ، جيڪڏهن اسين a کي پهريون ۽ b کي ٻيون رڪون ته پوءِ a ۽ b جو ترتيب ڏنل جوڙو هيئن لکبو: (a, b) . ترتيب ڏنل جوڙي (a, b) ۾ a کي پهريون جڙو يا رڪن چئبو آهي ۽ b کي ٻيو جڙو يا رڪن چئبو آهي.

ٻه ترتيب ڏنل جوڙا برابر هوندا جيڪڏهن انهن جا مطابقت رکندڙ رڪن پاڻ ۾ برابر هجن.

يعني $(a, b) = (c, d)$ فقط ان صورت ۾ ئي ٿيندو جڏهن $a = c$ ۽ $b = d$

مثال: x ۽ y جو ملهه لھو جيڪڏهن $(x+5, 8)$ ۽ $(9, y-6)$ برابر آهن

حل: اسان وٽ آهي $(x+5, 8) = (9, y-6)$

$$\Rightarrow 9 = x + 5 \quad \text{۽} \quad y - 6 = 8$$

$$\Rightarrow 9 - 5 = x \quad \Rightarrow \quad y = 8 + 6$$

$$x = 4 \quad \text{يا} \quad y = 14$$

انهيءَ ڪري x ۽ y جا ملهه ترتيب وار 4 ۽ 14 آهن.


(ii) 17.1.4 ڪارٽيسي ضرب آپٽ ٺاهڻ:

جيڪڏهن A ۽ B ڪي به ٻه غير خالي سيٽ آهن ته پوءِ A جو B سان ڪارٽيسي ضرب آپٽ، سڀني ترتيب ڏنل جوڙن (a, b) جو سيٽ آهي جڏهن ته $a \in A$ ۽ $b \in B$. ان کي نشانين ۾ $A \times B$ لکبو آهي.

يعني $A \times B = \{(a, b) | a \in A \text{ ۽ } b \in B\}$

ساڳي ريت، B جو A سان ڪارٽيسي ضرب آپٽ هيئن بيان ڪبو

$$B \times A = \{(b, a) | b \in B \text{ ۽ } a \in A\}$$



مثال طور: جيڪڏهن $P = \{1, 2, 4\}$ ۽ $Q = \{5, 10\}$

تہ پوءِ $P \times Q = \{(1, 5), (1, 10), (2, 5), (2, 10), (4, 5), (4, 10)\}$

۽ $Q \times P = \{(5, 1), (5, 2), (5, 4), (10, 1), (10, 2), (10, 4)\}$

نوٽ: (i) $A \times B$ کي "A کراس B" پڙهيو آهي.

(ii) جيڪڏهن $O(A) = m$ ۽ $O(B) = n$ تہ پوءِ $O(A \times B) = mn$

(iii) عام طرح سان $A \times B \neq B \times A$

17.2 جوڙي وارا تعلق (Binary Relations)

جوڙي واري تعلق کي بيان ڪرڻ ۽ ان جي ڊومين (Domain) ۽ رينج (Range) جي سڃاڻپ ڪرڻ.

جوڙي وارو تعلق (Binary Relation)

جيڪڏهن A ۽ B کي ٻہ غير خالي سيٽ آهن تہ پوءِ ڪارٽيسي ضرب آپريٽر $A \times B$ جو ڪوبہ ماتحت سيٽ R ، A کان B ۾ جوڙي وارو تعلق ڪوٺبو.

مثال: جيڪڏهن $A = \{a, b, c\}$ ۽ $B = \{2, 4\}$ تہ پوءِ هيٺيان لھو

(الف) A کان B ۾ ٻہ جوڙي وارا تعلق.

(ب) B کان A ۾ ٽي جوڙي وارا تعلق.

(ج) B ۾ چار جوڙي وارا تعلق.

حل: (الف) A کان B ۾ ٻہ جوڙي وارا تعلق:

هتي $A \times B = \{(a, 2), (a, 4), (b, 2), (b, 4), (c, 2), (c, 4)\}$

هاڻي $R_1 = \{(a, 2), (b, 4)\}$ ۽ $R_2 = \{(b, 2), (c, 2), (c, 4)\}$

A کان B ۾ ٻہ جوڙي وارا تعلق آهن.

(ب) B کان A ۾ ٽي جوڙي وارا تعلق:

هتي $B \times A = \{(2, a), (2, b), (2, c), (4, a), (4, b), (4, c)\}$

هاڻي $R_1 = \{(2, a)\}$ ، $R_2 = \{(2, a), (2, b)\}$ ۽ $R_3 = \{(4, a), (4, b), (4, c)\}$

B کان A ۾ ٽي جوڙي وارا تعلق آهن.

(ج) B ۾ چار جوڙي وارا تعلق:

هتي $B \times B = \{(2, 2), (2, 4), (4, 2), (4, 4)\}$

هاڻي $R_1 = \emptyset$ ، $R_2 = \{(2, 2)\}$ ، $R_3 = \{(2, 4), (4, 2)\}$ ۽ $R_4 = \{(2, 2), (2, 4)\}$


چار جوڙي وارا تعلق B ۾ آهن.

جوڙي واري تعلق جي ڊومين ۽ رينج (Domain and Range of a Binary Relation)

جيڪڏهن R هڪ جوڙي وارو تعلق آهي. سيٽ A کان سيٽ B ۾، تہ پوءِ R جي ڊومين، هڪ اهڙو سيٽ آهي جنهن جا رڪن R جي سمورن ترتيب ڏنل جوڙن جا پهريان رڪن هجن. R جي ڊومين کي $\text{Dom } R$ سان ظاهر ڪبو آهي. R جي رينج، لکبي $\text{Range } R$ ، هڪ اهڙو سيٽ آهي جنهن جا رڪن R جي سمورن ترتيب ڏنل جوڙن جا ٻيا رڪن هجن.

مثال طور: جيڪڏهن $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ، $B = \{4, 5, 6, 7\}$ ۽ $R = \{(1, 4), (2, 4), (3, 5), (3, 6)\}$ کان A کان B

۾ هڪ جوڙي وارو تعلق آهي تہ پوءِ $\text{Dom } R = \{1, 2, 3\}$ ۽ $\text{Range } R = \{4, 5, 6\}$



مثال: جيڪڏهن $x, y \in \mathbb{N}$ ۽ R هڪ جوڙي وارو تعلق R هن ريت ڏنل آهي.
 $R = \{(x, y) | x + y = 5\}$ ته پوءِ R کي جدولِي نموني ۾ لکڻ. ان جي ڊومين ۽ رينج به لھو.

حل: جدولِي نموني ۾ ، $R = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$

هتي $\text{Dom } R = \{1, 2, 3, 4\}$

۽ $\text{Range } R = \{1, 2, 3, 4\}$

17.3 عمل (Functions):

عمل (Function) رياضي جي هڪ شاخ ڪيلڪيولس (Calculus) جي بنيادي تصورن مان هڪ آهي جنهن سائنس جي ميدان ۾ انقلاب پيدا ڪري ڇڏيو. عمل حقيقت ۾ هڪ اصول يا تعلق آهي جيڪو ٻن سڀتن يا مقدارن ۾ لاڳاپو ٺاهي ٿو. مثال طور گول جي ايراضي ”A“ لاڳاپيل آهي رداس ”r“ سان هن اصول مطابق: $A = \pi r^2$ هتي ، اسين عمل کي سڀتن جي بنياد تي پڙهنداسين.

(i) 17.3 عمل کي بيان ڪرڻ ۽ ڊومين ، ڪوڊومين (Codomain) ۽ رينج جي سڃاڻپ ڪرڻ:

عمل هڪ اهڙو جوڙي وارو تعلق آهي جنهن ۾ ڊومين جو هر هڪ رڪن ، رينج جي هڪ ۽ فقط هڪ ئي رڪن سان لاڳاپيل هوندو آهي. مثال طور $\{(1, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 6)\}$ هڪ عمل آهي. جڏهن ته $\{(1, 5), (2, 6), (2, 7), (3, 9)\}$ هڪ عمل نه آهي ڇاڪاڻ ته ڊومين جو رڪن ”2“ رينج جي هڪ کان وڌيڪ رڪنن سان لاڳاپيل آهي.

← سيٽ A کان سيٽ B طرف عمل (Function from set A to set B):

فرض ڪريو A ۽ B ڪي به ٻه غير خالي سيٽ آهن ۽ R هڪ جوڙي وارو تعلق آهي. A کان B ۾ .
 ته پوءِ R کي A کان B طرف عمل ڪوٺبو جيڪڏهن

$$\text{Dom } R = A \quad (\text{i})$$

(ii) A جو هر هڪ رڪن ، R وسيلي، B جي ڪنهن هڪ خاص رڪن سان لاڳاپيل هجي.

يعني جيڪڏهن $(a, b) \in R$ ۽ $(a, c) \in R$ ته پوءِ $b = c$ عملن کي عام طرح سان انگريزي يا يوناني الف بي جي اکرن سان ظاهر ڪبو آهي جهڙوڪ h, g, f وغيره ۽ α, β, γ وغيره.

جيڪڏهن f هڪ عمل آهي. A کان B طرف، ته پوءِ اسين ان ريت لکنداسين $f: A \rightarrow B$ ۽ هر هڪ


$(a, b) \in f$ لاءِ، b کي f وسيلي a جو پاڇو (image) چئبو ۽ هن ريت لکبو $b = f(a)$.

مثال: فرض ڪريو $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ۽ $B = \{2, 3, 4, 5\}$ سڃاڻپ ڪريو ته هيٺين مان ڪهڙو A کان B طرف عمل آهي.


$$R_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\} \quad (\text{i})$$

$$R_2 = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (4, 5)\} \quad (\text{ii})$$

$$R_3 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\} \quad (\text{iii})$$




نقشي خاڪو



حل:


$$R_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\} \quad (i)$$

R_1 هڪ عمل نه آهي ڇاڪاڻ ته $\text{Dom } R_1 \neq A$ جيئن ته پاسي واري شڪل ۾ ڏيکاريل آهي



$$R_2 = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (4, 5)\} \quad (ii)$$

R_2 هڪ عمل نه آهي ڇاڪاڻ ته ڊومين جو هڪ رڪن "2" جي ڪنهن مخصوص رڪن سان لاڳاپيل نه آهي. جيئن ته پاسي واري شڪل ۾ ڏيکاريل آهي.




$$R_3 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\} \quad (iii)$$

R_3 هڪ عمل آهي ڇاڪاڻ ته $\text{Dom } R_3 = A$ ۽ ڊومين جو هر هڪ رڪن B جي ڪنهن مخصوص رڪن سان لاڳاپيل آهي. جيئن ته پاسي واري شڪل ۾ ڏيکاريل آهي.

< ڊومين، ڪو ڊومين ۽ رينج (Domain, Co-domain and Range)

جيڪڏهن A کان B طرف f هڪ عمل آهي يعني $f: A \rightarrow B$ ته پوءِ A کي ان جو ڊومين (پهريون سيٽ) چئبو ۽ B کي ان جو ڪو ڊومين (Co-domain) چئبو. جڏهن ته f جي سڀني پاڇن جي سيٽ کي رينج چئبو آهي.



مثال: جيڪڏهن A کان B طرف f هڪ عمل آهي جيئن ته ڏنل شڪل ۾ ڏيکاريو ويو آهي ته پوءِ ان جو ڊومين، ڪو ڊومين ۽ رينج لکو. $f(a) = x$ ۽ $f(c) = z$ جا ملهه پڻ لکو.

حل:

f جي نقشي خاڪي مطابق

$$\text{Dom } f = A = \{a, b, c\} \text{ جو ڪو ڊومين } B = \{x, y, z\} \text{ ۽ } f \text{ جي رينج } \{x, z\} \text{ ان کان علاوه } f(a) = x \text{ ۽ } f(c) = z$$

نوٽ:

(i) f جي رينج ماتحت سيٽ آهي ڪو ڊومين جو.

(ii) هر هڪ عمل هڪ تعلق آهي پر ان جو ابتڙ صحيح نه آهي.


17.3 (ii) هيٺين جي وضاحت ڪري سمجهايو :

< آنتو ۽ ون - ون عمل (انجيڪٽو عمل):


< آنتو عمل (سرجيڪٽو عمل):

< ون - ون ۽ آنتو عمل (باڻي جيڪٽو عمل):

سڀ کان اڳ ۾ اسين آنتو عمل ۽ ون - ون عمل کي بيان ڪريون ٿا.



➤ انتو عمل (Into function):




ڪن به ٻن سڀتن A ۽ B لاءِ، هڪ عمل $f: A \rightarrow B$ انتو ڪوٺيو جيڪڏهن f جي رينج، B جو واجب ماتحت سيٽ هجي. (يعني ته $\text{Range } f \subset B$)

مثال طور: $A = \{x, y, z\}$ ۽ $B = \{a, b, c\}$ لاءِ هڪ عمل $f: A \rightarrow B$ جيڪو هن ريت

$$f = \{(x, a), (y, a), (z, b)\}$$

بيان ڪيل آهي ان عمل کي انتو عمل چئبو ڇاڪاڻ ته $\text{Range } f \subset B$ ، جيئن ڏنل شڪل ۾ ڏيکاريل آهي جڏهن ته $\text{Range } f = \{a, b\}$

➤ ون - ون عمل (One-one function):



ڪن به ٻن سڀتن A ۽ B لاءِ، هڪ عمل $f: A \rightarrow B$ کي ون - ون عمل ڪوٺيو جيڪڏهن A جي مختلف رڪنن جا B ۾ ڌار ڌار پاڇا هجن.


مثال طور: $A = \{1, 2, 3\}$ ۽ $B = \{2, 3, 4\}$ لاءِ هڪ عمل $f: A \rightarrow B$ جيڪو هن ريت

$$f = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$$


بيان ڪيل آهي ان کي ون - ون عمل چئبو ڇاڪاڻ ته A جي مختلف رڪنن جا B ۾ ڌار ڌار پاڇا آهن جيئن ته ڏنل شڪل ۾ ڏيکاريل آهي.

➤ انتو ۽ ون - ون عمل يا انجيڪٽو عمل (Into and one-one function or injective function):

اهڙو عمل جيڪو انتو هجڻ سان گڏوگڏ ون - ون به هجي، تنهن کي انتو ۽ ون - ون عمل يا انجيڪٽو عمل چئبو آهي.



شڪل (ii)



شڪل (i)

مثال طور: $A = \{1, 2, 3\}$ ۽ $B = \{2, 3, 4, 5\}$ لاءِ، هڪ عمل

$$f: A \rightarrow B$$

جيڪو هن ريت بيان ڪيل آهي.

$$f = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$$

ڇاڪاڻ ته اهو انتو هجڻ سان گڏوگڏ ون - ون به آهي.

جيئن شڪل (i) ۾ ڏيکاريل آهي.

هڪ عمل $g: A \rightarrow B$ جيڪو هن ريت بيان ڪيل آهي


$$g = \{(1, 3), (2, 5), (3, 4)\}$$

ان کي پڻ انجيڪٽو عمل چئبو جيئن ته شڪل (ii) ۾ ڏيکاريل آهي.

➤ آنتو عمل يا سرجيڪٽو عمل (Onto function or surjective function):

ڪن به ٻن سڀتن A ۽ B لاءِ، هڪ عمل $f: A \rightarrow B$ آنتو يا سرجيڪٽو عمل ڪوٺيو

جيڪڏهن $\text{Range } f = B$



مثال طور: $A = \{a, b, c\}$ ۽ $B = \{p, q\}$ لاءِ، هڪ عمل $f: A \rightarrow B$



$$f = \{(a, p), (b, q), (c, q)\}$$

جيڪو هن ريت بيان ڪيل آهي ان کي آنتو عمل

چئبو ڇاڪاڻ ته $\text{Range } f = B$ جيئن پاسي واري شڪل ۾ ڏيکاريل آهي.

➤ ون - ون ۽ آنتو عمل يا بائيجيڪٽو عمل (One-one and onto function or bijective function):

اهڙو عمل جيڪو ون - ون هجڻ سان گڏوگڏ آنتو به هجي تنهن کي ون - ون ۽ آنتو يا بائيجيڪٽو عمل چئبو آهي.




مثال طور: $A = \{1, 3, 5\}$ ۽ $B = \{1, 9, 25\}$ لاءِ، هڪ عمل $f: A \rightarrow B$ جيڪو هن ريت بيان ڪيل آهي $f = \{(1, 1), (3, 9), (5, 25)\}$ ان کي بائيجيڪٽو عمل چئبو آهي ڇاڪاڻ ته اهو ون - ون هجڻ سان گڏوگڏ آنتوبه آهي. جيئن ته پاسي واري شڪل ۾ ڏيکاريل آهي

(iii) 17.3 جايڻ ته ڇا ڏنل تعلق هڪ عمل آهي يا نه:

هڪ تعلق جي عمل هجڻ يا نه هجڻ جي جاچ ڪرڻ لاءِ اسان کي ڊومين تي سمورو ڌيان ڏيڻو پوندو. جيڪڏهن هڪ تعلق ۾، ڊومين جو ڪو رڪن بنا پاڇي جي آهي يا ڪو رڪن هڪ کان وڌيڪ پاڇن سان لاڳاپيل آهي ته پوءِ اهو تعلق عمل نه آهي.

مثال: A کان B طرف ڏنل تعلقن جي جاچ ڪريو جن جون نقشي شڪليون ڏنل آهن. فيصلو ڪريو ته ڪهڙو عمل آهي ۽ ڪهڙو عمل نه آهي




حل: R_1 هڪ عمل نه آهي ڇاڪاڻ ته ڊومين جو هڪ رڪن "4" بنا پاڇي جي آهي
 R_2 به هڪ عمل نه آهي ڇاڪاڻ ته ڊومين جي هڪ رڪن "3" کي هڪ کان وڌيڪ پاڇا آهن.
 R_3 هڪ عمل آهي ڇاڪاڻ ته ڊومين جي هر هڪ رڪن کي هڪ مخصوص پاڇو آهي.


(iv) 17.3 ون - ون عمل ۽ ون - ون مطابقت جي وچ ۾ فرق:

(Difference between one-one correspondence and one-one function)

فرض ڪريو A ۽ B کي ٻه ٻه غير خالي سيٽ آهن. A ۽ B جي وچ واري ون - ون مطابقت ۾، ٻنهي سيٽن مان ڪنهن هڪ سيٽ جو هر هڪ رڪن ٻئي سيٽ جي نڪ هڪ رڪن سان لاڳاپيل هوندو آهي. يعني ته ون - ون مطابقت هميشه بائيجيڪٽو عمل کي ظاهر ڪندي آهي جڏهن ته ون - ون عمل هميشه بائيجيڪٽو نه هوندو آهي.


مثال طور: شڪل (i) ون - ون مطابقت ڏيکاري ٿي. جڏهن ته شڪل (ii) ۾ ون - ون مطابقت نه آهي پر اها ون - ون عمل ڏيکاري ٿي.





مشق 17.5

1. x ۽ y جو ملهه لهر جيڪڏهن
 - (i) $(x-5, 10) = (11, y-7)$
 - (ii) $(5x+8, 5y-4) = (3x+10, 2y+2)$
 - (iii) $(2x-3y, 5x+y) = (3, 16)$
2. جيڪڏهن سيٽ P جا 10 رڪن آهن ۽ سيٽ Q جا 15 رڪن آهن ته پوءِ $P \times P$ ۽ $Q \times P$, $P \times Q$ جي رڪنن جو تعداد لهر
3. جيڪڏهن $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$ ۽ $C = \{1, 3, 5\}$ ته هيٺيان لهر.
 - (i) $A \times B$
 - (ii) $B \times C$
 - (iii) $A \times (B \cup C)$
 - (iv) $B \times (A \cup C)$
 - (v) $(A \cap B) \times (B \cap C)$
4. جيڪڏهن $A = \{5, 6\}$ ۽ $B = \{1, 2, 3\}$ ته هيٺيان لکو:
 - (i) $A \times B$ ۾ ٽي جوڙي وارا تعلق
 - (ii) $B \times A$ ۾ چار جوڙي وارا تعلق
 - (iii) B ۾ پنج جوڙي وارا تعلق
 - (iv) A جا سڀئي جوڙي وارا تعلق.
5. ٻن سيٽن A ۽ B لاءِ، جيڪڏهن $O(A) = 3$ ۽ $O(B) = 4$ ته پوءِ $A \times B$ ۾ سڀني جوڙي واري تعلقن جو تعداد لکو.
6. $A \times B$ جا هيٺيان جوڙي وارا تعلق جدولي نموني ۾ لکو جڏهن ته $A = \{0, 1, 2, 3\}$ ۽ $B = \{2, 4, 6, 8\}$ اهڙيءَ طرح جو $a \in A$ ۽ $b \in B$
 - (i) $R_1 = \{(a, b) | b < 5\}$
 - (ii) $R_2 = \{(a, b) | a + b = 9\}$
 - (iii) $R_3 = \{(a, b) | a - b = 1\}$
7. جيڪڏهن تعلق $R = \{(x, y) | y = 2x + 5\}$ آهي Z ۾ ته پوءِ
 - (i) رينج لکو جيڪڏهن ڊومين $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ آهي.
 - (ii) ڊومين لکو جيڪڏهن رينج $\{11, 13, 15, 17\}$ آهي.
8. جيڪڏهن x, y رڪن آهن W جا ته پوءِ هيٺين تعلقن جي ڊومين ۽ رينج W ۾ لکو.
 - (i) $\{(x, y) | 3x + y = 11\}$
 - (ii) $\{(x, y) | x - y = 6\}$
9. جيڪڏهن $f: A \rightarrow B$ هڪ عمل آهي جيڪو هيٺ ڏنل آهي $f = \{(1, 5), (2, 6), (3, 7), (4, 8)\}$ جڏهن ته $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ۽ $B = \mathbb{N}$. ان جي ڊومين، ڪو ڊومين ۽ رينج لکو. $f(2)$ ۽ $f(4)$ جا ملهه به لکو.
10. جيڪڏهن $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ۽ $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ته پوءِ ڇاڇ ڪريو ته ڇا A کان B طرف هيٺيان تعلق عمل آهن يا نه جيڪڏهن اهي عمل آهن ته پوءِ انهن جا قسم لکو.
 - (i) $R_1 = \{(0, 2), (1, 4), (2, 6), (3, 8)\}$




(ii) $R_2 = \{(0,10), (1,8), (2,6), (2,4), (3,4), (4,2)\}$

(iii) $R_3 = \{(0,2), (1,4), (2,6), (3,8), (4,8)\}$

(iv) $R_4 = \{(0,2), (1,2), (2,2), (3,2), (4,8)\}$

(v) $R_5 = \{(0,2), (1,4), (2,6), (3,8), (4,10)\}$

11. هيٺين مان ڪهڙو ون - ون عمل يا ون - ون مطابقت يا ڪو به نه آهي.




12. جيڪڏهن $P = \{a, b, c\}$, $Q = \{x, y, z\}$ ۽ $R = \{p, q, r, s\}$ ته پوءِ هيٺيان لکو.

- (i) P کان Q طرف هڪ آئتو عمل f .
(ii) R کان P طرف هڪ آئتو عمل g .
(iii) P کان R طرف هڪ انجڪٽو عمل h .
(iv) Q کان P طرف هڪ بائيجيڪٽو عمل k .

جائزي واري مشق 17

1. صحيح جواب ڳوليو:

- (i) ڪهڙو N جو ماتحت سيٽ آهي
(a) Z (b) Q (c) E (d) P
- (ii) $A = \{x \mid x \in Z \wedge x^2 = 25\}$ جو جدولِي نمونو _____ آهي.
(a) $\{1, 5\}$ (b) $\{-5, 5\}$
(c) $\{1, 5, 25\}$ (d) $\{-5\}$
- (iii) ٻن سيٽن A ۽ B لاءِ، جيڪڏهن $O(A) = O(B)$ ته پوءِ
(a) $A \subseteq B$ (b) $B = A$
(c) $A \sim B$ (d) $A \subset B$
- (iv) _____ $\{x \mid x \in N \wedge x < 1\}$ آهي.
(a) واحد سيٽ (b) غير محدود سيٽ
(c) خالي سيٽ (d) بالا سيٽ
- (v) جيڪڏهن $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ۽ $B = \{2, 4, 6\}$ ته پوءِ $A \Delta B =$ _____
(a) $\{1, 2\}$ (b) $\{6\}$
(c) $\{1, 3\}$ (d) $\{1, 3, 6\}$



- (vi) ڪهڙو عمل مٿا جي خاصيت نٿو رکي
 (a) همشڪلي فرق (b) ميلاپ
 (c) فرق (d) ڪاٽا

(vii) $\{x | x \in P \vee x \in Q\} = \text{_____}$

- (a) $P \cap Q$ (b) $P \cup Q$
 (c) $P - Q$ (d) $P \Delta Q$

(viii) $\{x | x \in U \wedge x \notin A \cap B\} = \text{_____}$

- (a) $A \cap B$ (b) $(A \cup B)'$
 (c) $(A \cap B)'$ (d) $A' \cap B'$

(ix) ڪن به ٻن غير خالي سيٽن A ۽ B لاءِ جيڪڏهن $A \cap B = \emptyset$ ۽ $A \cup B = U$ ته پوءِ A ۽ B
 _____ آهن.

- (a) جزا (b) لاڳاپيل سيٽ
 (c) برابر سيٽ (d) ڪو به نه

(x) $((A'))' = \text{_____}$

- (a) $(A')'$ (b) A'
 (c) A (d) B

(xi) جيڪڏهن $A \supseteq B$ ته پوءِ $A \cup B = \text{_____}$

- (a) A (b) B
 (c) $\emptyset$ (d) U

(xii) وين شڪلين ۾ _____ ڪائناتي سيٽ کي ظاهر ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو آهي

- (a) مستطيل (b) گول
 (c) گول نما (d) سڀئي

(xiii) جيڪڏهن $(x, 6) = (2, y - 6)$ ته پوءِ $x + y = \text{_____}$

- (a) 8 (b) 10 (c) 12 (d) 14

(xiv) جيڪڏهن $O(A \times B) = 100$ ۽ $O(B) = 5$ ته پوءِ $O(A) = \text{_____}$


- (a) 10 (b) 15 (c) 20 (d) 25

(xv) هڪ عمل کي سرچيڪٽو چئبو آهي جيڪڏهن Range _____ Co-domain


- (a) $\supseteq$ (b) $\subset$
 (c) = (d) اهي سڀئي

(xvi) هڪ عمل کي ايترو چئبو جيڪڏهن Range _____ Co-domain

- (a) $\supseteq$ (b) $\subset$
 (c) = (d) ڪو به نه



- (xvii) هينين مان ڪهڙو عمل آهي.
- (a) $\{(2,5), (2,7), (3,8)\}$ (b) $\{(6,7), (7,6), (6,8)\}$
- (c) $\{(0,5), (6,0), (5,6)\}$ (d) ڪو به نه
- (xviii) هينين مان ڪهڙو هميشه بائيجيڪٽو هوندو آهي
- (a) آنتو عمل (b) ون - ون عمل
- (c) آنتو عمل (d) ون - ون مطابقت
- (xix) جيڪڏهن $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ته پوءِ ڪهڙو ممڪن نه آهي.
- (a) $f(5) = 6$ (b) $f(7) = 8$
- (c) $f(-2) = 6$ (d) $f(9) = 0$
- (xx) هينين مان ڪهڙو مٿا جي خاصيت رکي ٿو
- (a) فرق (b) ميلاپ
- (c) ڪارٽيسي ضرب اپت (d) ڪو به نه
2. جيڪڏهن $A = \{1, 2, 5\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ ۽ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ته پوءِ هينيان لھو.
- (a) $A \cup B$ (b) $A \cap B$ (c) $A \Delta B$
- (d) $A - B$ (e) A' (f) B'
3. سوال 2 جي سڀتن لاءِ ڏي مارگن جي قانونن جي تصديق ڪريو
4. ٻن سڀتن $A = \{a, b, d\}$ ۽ $B = \{a, d, e\}$ لاءِ ميلاپ ۽ ڪاٽا جي مٿا واري خاصيت جي تصديق ڪريو.
5. ٻن سڀتن $P = \{1, 3, 5\}$ ۽ $Q = \{1, 3, 7\}$ لاءِ هينين سڀتن کي وين شڪلين وسيلي ڏيکاريو.
- (a) $P \cup Q$ (b) $P \cap Q$ (c) $P \Delta Q$ (d) $P - Q$
6. جيڪڏهن $A = \{a, c\}$ ۽ $B = \{b, d\}$ ته هينيان لکو.
- (a) ٻه جوڙي وارا تعلق A ۾ (b) ٽي جوڙي وارا تعلق B ۾
- (c) ٽي جوڙي وارا تعلق $A \times B$ ۾ (d) ٻه جوڙي وارا تعلق $A \cup B$ ۾
7. جيڪڏهن $A = \{1, 2, 5\}$ ۽ $B = \{6, 8\}$ ته پوءِ A کان B طرف عمل لھو جيڪو
- (a) آنتو عمل هجي (b) آنتو عمل هجي



خلاصو

- ◀ جدولي، بياني ۽ علامتي نمونا هڪ سيٽ کي ظاهر ڪرڻ جا طريقا آهن.
- ◀ خالي سيٽ ۾ ڪو به رڪن نه هوندو آهي.
- ◀ جيڪڏهن A ماتحت سيٽ آهي B جو ته پوءِ B بالا سيٽ آهي A جو.
- ◀ جيڪڏهن $A \subseteq B$ ۽ $B \subseteq A$ ته پوءِ $A = B$.
- ◀ هڪ جيترا سيٽ ون - ون مطابقت رڪن ٿا.
- ◀ جيڪڏهن $A \subseteq B$ ۽ $A \neq B$ ته پوءِ $A \subset B$.
- ◀ ميلاپ، ڪاٽا، فرق، همشڪلي فرق، ڪامپليمينٽ ۽ ڪارٽيسي ضرب آپٽ سيٽن تي عمل آهن.
- ◀ جيڪڏهن $A \cap B = \emptyset$ ته پوءِ A ۽ B منفرد سيٽ آهن.
- ◀ جيڪڏهن $A \cup B = U$ ته پوءِ A ۽ B مڪمل سيٽ آهن.
- ◀ جڙا هميشه منفرد ۽ مڪمل سيٽ هوندا آهن.
- ◀ فرق ۽ ڪارٽيسي ضرب آپٽ مٿا جي خاصيت نٿا رکن.
- ◀ ميلاپ، ڪاٽا ۽ همشڪلي فرق مٿا ۽ سنگت واري خاصيت رڪن ٿا.
- ◀ ميلاپ ۽ ڪاٽا هڪٻئي تي ورهاست واري خاصيت رڪن ٿا.
- ◀ ڊي مارگن جا قانون: $(A \cup B)' = A' \cap B'$ (i) $(A \cap B)' = A' \cup B'$ (ii)
- ◀ سيٽن، انهن جي تعلقن ۽ عملن جي جاميٽري واري اظهار کي وين شڪل چئبو آهي.
- ◀ جان وين (John Venn) 1881ع ۾ وين شڪلين کي پيش ڪيو.
- ◀ وين شڪلين ۾ سيٽن ۽ ڪائناتي سيٽ کي ترتيبوار گولن يا بيضوي شڪلين ۽ مستطيل سان ظاهر ڪبو آهي.
- ◀ جيڪڏهن $(a, b) = (c, d)$ ۽ $a = c$ ۽ $b = d$
- ◀ $O(A \times B) = O(A) \cdot O(B)$
- ◀ $A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$
- ◀ ڪارٽيسي ضرب آپٽ جي هر هڪ ماتحت سيٽ کي جوڙي وارو تعلق چئبو آهي.
- ◀ عمل هڪ اهڙو جوڙي وارو تعلق آهي جنهن ۾ ڊومين جي هر هڪ رڪن کي هڪ مخصوص پاڇو هوندو آهي.
- ◀ جيڪڏهن $f: X \rightarrow Y$ هڪ عمل آهي ته پوءِ X ۽ Y ترتيبوار ڊومين ۽ ڪو ڊومين آهن جڏهن ته رينج سمورن پاڇن جو سيٽ آهي.
- ◀ هڪ عمل (i) انٽو ڪوئبو جيڪڏهن $\text{Range} \subset \text{Co-domain}$
- ◀ (ii) آنتو ڪوئبو جيڪڏهن $\text{Range} = \text{Co-domain}$
- ◀ (iii) ون - ون ڪوئبو جيڪڏهن ڊومين جي مختلف رڪنن جا رينج ۾ ڌار ڌار پاڇا هجن.
- ◀ هڪ عمل (i) انجيڪٽو ڪوئبو جيڪڏهن اهو ون - ون ۽ انٽو آهي
- ◀ (ii) سرجيڪٽو ڪوئبو جيڪڏهن اهو آنتو آهي
- ◀ (iii) بائيجيڪٽو ڪوئبو جيڪڏهن اهو ون - ون ۽ آنتو آهي.
- ◀ ون - ون مطابقت هميشه بائيجيڪٽو هوندي آهي.
- ◀ ون - ون عمل هميشه بائيجيڪٽو نه هوندو آهي.



يونٽ


ڦيرقاريا مٽجڻ

VARIATIONS

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هن يونٽ جي پڙهڻ کانپوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته

- نسبت، تناسب ۽ ڦيرقار (سڌو ۽ اُٺو) بيان ڪن
- مسلسل تناسب ۾ ٽيون، چوٿون ۽ وچيون متناسب لهن
- تناسبن جا قانون
- ❖ تناسب جو سوال حل ڪرڻ لاءِ عڪسي نسبت، نسبت جي تبديلي، نسبت جي ملائڻ ۽ نسبت جي وٺڻ وارن قانونن جو استعمال ڪن
- گڏيل ڦيرقار کي بيان ڪن
- گڏيل ڦيرقار سان لاڳاپيل سوال حل ڪن
- تناسبن تي مشتمل شرطي مساواتن کي ثابت ڪرڻ لاءِ K واور طريقو استعمال ڪن
- ڦيرقار وارا روزمره زندگي جا مسئلا حل ڪن



18.1 نسبت، تناسب ۽ ڦير قار

18.1.1 نسبت، تناسب ۽ ڦير قار (ستو ۽ اُبتو) بيان ڪرڻ:

(a) نسبت (Ratio):

ساڳي ايڪن واري ٻن مقدارن جي ڀيٽ کي نسبت چئبو آهي. اها ٻن ساڳي قسم جي مقدارن جو تعلق آهي. ٻين لفظن ۾، نسبت جو مطلب آهي ته هڪ مقدار ٻي مقدار جو ڪهڙو حصو آهي. جيڪڏهن a ۽ b ٻه ساڳي قسم جون مقدارون آهن ۽ b ٻڙي نه آهي ته پوءِ a ۽ b جي نسبت کي ان ريت لکبو: $a:b$ يا $\frac{a}{b}$

مثال طور: جيڪڏهن هڪ ڪلاس ۾ 13 ڇوڪرا ۽ 8 ڇوڪريون آهن ته پوءِ ڇوڪرن جي تعداد جي نسبت ڇوڪرين جي تعداد سان هن ريت لکي سگهجي ٿي 13:8 يا اٺڀورن ۾ $\frac{13}{8}$ لکبو.

نوٽ:

- (i) نسبت ۾ رُڪنن جي ترتيب جي اهميت هوندي آهي.
- (ii) نسبت جو ڪوبه ايڪو نه هوندو آهي.
- (iii) نسبت $a:b$ ۾ پهرين رُڪن (First term) کي ”مُنبَ“ (Antecedent) چئبو آهي ۽ ٻيئي رُڪن (Second term) کي ”پُڇڙ“ (Consequent) چئبو آهي.

مثال 1: هيٺين جي نسبت لکو:

- (i) 400 ميٽر ۽ 900 ميٽر
- (ii) 700 گرام ۽ 2 ڪلو گرام
- (iii) 30 سيڪنڊ ۽ 2 منٽ
- (iv) 200 رُپيا ۽ 300 گرام

حل:

(i) 400 ميٽر ۽ 900 ميٽر جي نسبت

$$400 : 900 = \frac{400}{900} = \frac{4}{9} = 4 : 9$$

900 : 400 جي سادي صورت 4 : 9 آهي.

(ii) 700 گرام ۽ 2 ڪلو گرام جي نسبت

جيئن ته 1 ڪلوگرام = 1000 گرام
تنهن ڪري 2 ڪلوگرام = 2000 گرام

هاڻي

$$700 : 2000 = \frac{700}{2000} = \frac{7}{20} = 7 : 20$$

(iii) 30 سيڪنڊ ۽ 2 منٽ جي نسبت


جيئن ته 1 منٽ = 60 سيڪنڊ
تنهن ڪري 2 منٽ = 120 سيڪنڊ

هاڻي

$$30 : 120 = \frac{30}{120} = \frac{1}{4} = 1 : 4$$

(iv) 200 رُپيا ۽ 300 گرام جي نسبت

جيئن ته مقدارون ساڳي قسم جون نه آهن تنهن ڪري 200 روپيا ۽ 300 گرام جي نسبت نٿي لهي سگهجي.



مثال 2: نسبت $5a + 2b : 4a + 3b$ لھو جيڪڏھن $a : b = 4 : 5$

حل: ڏنل آھي ته $a : b = 4 : 5$ يا $\frac{a}{b} = \frac{4}{5}$

$$5a + 2b : 4a + 3b = \frac{5a + 2b}{4a + 3b} \quad \text{ھاڻي}$$

$$\frac{5a + 2b}{4a + 3b} = \frac{5(\frac{a}{b}) + 2(\frac{b}{b})}{4(\frac{a}{b}) + 3(\frac{b}{b})} \quad (\text{انس ۽ چيد کي } b \text{ سان ونڊ ڪندي})$$

$$= \frac{5(\frac{4}{5}) + 2}{4(\frac{4}{5}) + 3} = \frac{4 + 2}{\frac{16}{5} + 3} = \frac{6}{\frac{31}{5}} = \frac{30}{31} \quad \left(\because \frac{a}{b} = \frac{4}{5} \right)$$

انهي ڪري $5a + 2b : 4a + 3b = 30 : 31$

مثال 3: m جو ملھ لھو جيڪڏھن نسبتون

$$3m + 5 : 4m + 3 \text{ ۽ } 2 : 3 \text{ برابر آھن}$$

مثال 4: نسبت $4 : 15$ جي ھر ھڪ رڪن ۾ ڪھڙو عدد جوڙ ڪجي جو اھا نسبت $\frac{2}{3}$ جي برابري ٿئي.

حل:

ڏنل شرط موجب **حل:** فرض ڪيو ته گھربل عدد a آھي

ڏنل شرط موجب

$$\Rightarrow \frac{4 + a}{15 + a} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow 3(4 + a) = 2(15 + a)$$

$$\Rightarrow 12 + 3a = 30 + 2a$$

$$\Rightarrow 3a - 2a = 30 - 12$$

$$\Rightarrow a = 18$$

$$\Rightarrow \frac{3m + 5}{4m + 3} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow 3(3m + 5) = 2(4m + 3)$$

$$\Rightarrow 9m + 15 = 8m + 6$$

$$\Rightarrow 9m - 8m = 6 - 15$$

$$\Rightarrow m = -9$$

انهي ڪري m جو گھربل ملھ -9 آھي

انهي ڪري گھربل عدد 18 آھي

(d) تناسب (Proportion):

ٻن نسبتن جي برابري کي تناسب چئبو آھي يا تناسب ھڪ اهڙو بيان آھي جيڪو ٻن نسبتن جي برابري طور ظاھر ٿي سگھي. جيڪڏھن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ته پوءِ a, b, c, d ۽ تناسب ۾ آھن ۽ اسين ان کي ھن ريت لکي

سگھون ٿا: $a : b :: c : d$ جڏھن ته مقدار a ۽ d کي ٻاھريان رُڪن (Extremes) چئبو آھي. مقدار b ۽ c کي

وچيان رُڪن (Means) چئبو آھي. a, b, c, d جي تناسب کي ھن ريت لکبو آھي.


$$a : b :: c : d$$

$$a : b = c : d \quad \text{يا}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{يا}$$

$$ad = bc \quad \text{يا}$$

نوٽ: ٻاھرين رُڪن جي ضرب اُٻت = وچين رُڪن جي ضرب اُٻت



مثال 5: x جو مله لهو جيڪڏهن $40:60=50:x$

حل:

$$40:60=50:x \quad \text{ڏنل آهي ته}$$

جيئن ته وچين رُڪنن جي ضرب اُپت = ٻاهرين رُڪنن جي ضرب اُپت

$$40x = 60 \times 50 \quad \text{تنهنڪري}$$

$$x = \frac{60 \times 50}{40} = 75$$

$x = 75$ يعني ته

مشق 18.1

1. هيٺين جي نسبت لهو

- (i) 70 ڪلو گرام ۽ 28 ڪلو گرام (ii) 60 سينٽي ميٽر ۽ 1 ميٽر
(iii) 40 سيڪنڊ ۽ 3 منٽ (iv) 200 ملي ليٽر ۽ 2 ليٽر
(v) 135° ۽ 360° (vi) 5 ڪلو گرام ۽ 200 گرام

2. هڪ ڪارخاني ۾ 120 ڪم ڪندڙ آهن جن مان 45 عورتون ۽ باقي مرد آهن. ته هيٺين کي ڳوليو:

- (i) مردن ۽ عورتن جي نسبت (ii) عورتن ۽ مردن جي نسبت
(iii) عورتن ۽ سمورن ڪم ڪندڙن جي نسبت
(iv) مردن ۽ سمورن ڪم ڪندڙن جي نسبت:

3. جيڪڏهن $5(4x-2y)=3x-4y$ ته $x:y$ لهو.

4. "a" جو مله لهو جيڪڏهن نسبتون $3a+4:2a+5$ ۽ $4:3$ برابر آهن.

5. نسبت $5:27$ جي هر هڪ رُڪن ۾ ڪهڙو عدد جوڙ ڪجي جو اها نسبت $1:3$ جي برابر ٿئي.

6. جيڪڏهن $a:b=5:8$ ته پوءِ $3a+4b:5a+7b$ جو مله لهو.

7. هيٺين مان x جو مله لهو.

- (i) $2x+5:5::3x-2:7$ (ii) $\frac{4x-3}{5}:\frac{3}{4}::\frac{4x}{3}:\frac{7}{2}$
(iii) $\frac{x-3}{2}:\frac{5}{x-1}::\frac{x-1}{3}:\frac{4}{x+4}$ (iv) $(a^2-ab+b^2):x::\frac{a^3+b^3}{a-b}:(a+b)^2$
(v) $11-x:8-x::25-x:16-x$

(e) ڦير قار (Variation):

هڪ مقدار ۾ تبديلي اچڻ ڪري ٻي مقدار جي متجڻ کي ڦير قار چئبو آهي. ڦير قار جا ٻه قسم آهن


◀ اُبتو ڦير قار

◀ سڌو ڦير قار

سڌو ڦير قار (Direct variation):

جيڪڏهن ٻه مقدارون A ۽ B اهڙي طرح سان ڳنڍيل هجن جو جيڪڏهن A هڪ نسبت ۾ وڌي (يا گهٽجي) ته پوءِ B پڻ ساڳي نسبت ۾ وڌي (يا گهٽجي) ته پوءِ ان ڦير قار کي سڌو ڦير قار چئبو آهي. جيڪڏهن هڪ مقدار y سڌي طرح متجي ٿي. مقدار x جي مطابق ته پوءِ اسين چوندا سين ته y سڌي طرح x سان متناسب آهي ۽ هن ريت لکندا سين: $y \propto x$ يا $y = kx$ جڏهن ته $k \neq 0$

علامت " $\propto$ " کي تناسب يا متجڻ جي نشاني چئبو آهي ۽ k کي تناسب يا متجڻ جو مستقل (Constant of variation) چئبو آهي.



مثال طور:

(i) چورس جي پاسي جي ڊيگهه ۽ ان جي ايراضي سڌي تناسب ۾ آهن.

(ii) سائيڪل جو رفتار ۽ ان جو مفاصلو سڌي تناسب ۾ آهن.

مثال: جيڪڏهن y سڌي طرح متجي ٿو x جي مطابق ته پوءِ هيٺيان لھو.

(a) x ۽ y کي ڳنڍيندڙ مساوات (b) x ۽ y جي وچ وارو تعلق جڏهن $x=3$ ۽ $y=7$

(c) y جي قيمت جڏهن $x=24$ (d) x جي قيمت جڏهن $y=21$

حل: (a) جيئن ته y سڌي طرح متجي ٿو x جي مطابق

تنهنڪري $y \propto x$

يعني $y = kx$... (i)

جڏهن ته متجڻ جو مستقل k آهي

(b) مساوات (i) ۾ $x=3$ ۽ $y=7$ رکڻ سان،

اسان کي مليو $7=3k$

$$\Rightarrow k = \frac{7}{3}$$

مساوات (i) ۾ x جي قيمت رکڻ سان، اسان کي مليو $y = \frac{7}{3}x$... (ii)

(c) مساوات (ii) ۾ $x=24$ رکڻ سان، اسان کي مليو $y = \frac{7}{3}(24) = 56$

(d) مساوات (ii) ۾ $y=21$ رکڻ سان، اسان کي مليو

$$21 = \frac{7}{3}x \Rightarrow x = \frac{3 \times 21}{7} = 9$$

مثال 2: جيڪڏهن y سڌي طرح متجي ٿو x جي ٻيئي مول مطابق جڏهن ته $x=16$ ۽ $y=10$ ته پوءِ y جو

ملھ لھو جڏهن ته $x=36$

حل: ڏنل آهي ته y سڌي طرح سان متجي ٿو x جي ٻيئي مول مطابق

يعني $y \propto \sqrt{x}$

يا $y = k\sqrt{x}$... (i)

جڏهن ته متجڻ جو مستقل k آهي.

مساوات (i) ۾ $x=16$ ۽ $y=10$ رکڻ سان اسان کي مليو

$$10 = k\sqrt{16}$$

$$\Rightarrow k = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$


مساوات (i) ۾ $k = \frac{5}{2}$ رکڻ سان اسان کي مليو

$$y = \frac{5}{2}\sqrt{x} \text{ ... (ii)}$$

مساوات (ii) ۾ $x=36$ رکڻ سان اسان کي مليو

$$y = \frac{5}{2}\sqrt{36}$$

$$\Rightarrow y = \frac{5}{2}(6) = 15$$



مثال 3: جيڪڏهن V سڌي طرح متجي ٿو r جي ڪعب مطابق ۽ $V = \frac{792}{7}$ جڏهن ته $r = 3$

V جو ملهه لھو جڏهن ته $r = 7$

حل: جيئن ته V سڌي طرح متجي ٿو r جي ڪعب مطابق

تنهنڪري $V \propto r^3$

$$V = kr^3 \quad (i) \quad (\text{جڏهن ته } k \text{ متجڻ جو مستقل آهي})$$

$$\text{مساوات (i) ۾ } r = 3 \text{ ۽ } V = \frac{792}{7} \text{ رکندي}$$

$$\frac{792}{7} = k(3)^3 \Rightarrow k = \frac{792}{7 \times 27} = \frac{88}{21} \quad \text{اسان کي مليو}$$

$$V = \frac{88}{21} r^3 \quad \dots (ii) \quad \text{انهيءَ ڪري}$$

مساوات (ii) ۾ $r = 7$ رکندي

$$V = \frac{88}{21} (7)^3 = \frac{4312}{3} \quad \text{اسان کي مليو}$$

اُبتو ڦير ڦار (Inverse Variation):

جيڪڏهن ٻه مقدارون هڪٻئي سان اهڙي طرح ڳنڍيل هجن جو هڪ مقدار ۾ اضافو ٻيئي مقدار ۾ گهٽتائي جو سبب ٿيئي ۽ ان جي ابتڙ ٻه ٿيئي ته پوءِ مقدارون هڪ ٻئي سان اُبتو ڦير ڦار يا متجڻ رکن ٿيون. جيڪڏهن هڪ مقدار y اُبتو متجي ٿي x جي مطابق ته اسين چوندا سين ته y اُبتي طرح سان x سان متناسب آهي ۽ اسين ان کي هن ريت لکندا سين.

$$y \propto \frac{1}{x} \quad \text{يا} \quad y = \frac{k}{x} \quad \text{جڏهن ته } k \neq 0 \text{ (متجڻ جو مستقل)}$$

$$\Rightarrow yx = k$$

مثال 2: جيڪڏهن y اُبتو متجي ٿو x جي ٽيئن مول

مطابق ۽ $y = 27$ جڏهن $x = 8$ ته پوءِ x جو ملهه لھو

جڏهن $y = 36$

حل: هتي y اُبتو متجي ٿو $\sqrt[3]{x}$ جي مطابق

$$\text{يعني ته } y \propto \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$$

$$\text{يا } y = \frac{k}{\sqrt[3]{x}} \Rightarrow y(\sqrt[3]{x}) = k \quad \dots (i)$$

مساوات (i) ۾ $x = 8$ ۽ $y = 27$ رکڻ سان

$$k = (27)(\sqrt[3]{8}) = 54 \quad \text{اسان کي مليو}$$

هاڻي مساوات (i) ۾ $k = 54$ رکڻ سان

$$(y\sqrt[3]{x}) = 54 \quad \dots (ii) \quad \text{اسان کي مليو}$$

هاڻي مساوات (ii) ۾ $y = 36$ رکڻ سان

$$\text{اسان کي مليو } (36)(\sqrt[3]{x}) = 54$$

$$\Rightarrow \sqrt[3]{x} = \frac{54}{36} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow x = \frac{27}{8}$$

مثال 1: جيڪڏهن y اُبتو متجي ٿو x جي مطابق ۽

$y = 7$ جڏهن $x = 2$ ته پوءِ y جو ملهه لھو جيڪڏهن

$x = 126$

حل: هتي y اُبتو متجي ٿو x جي مطابق

$$\text{يعني ته } y \propto \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow y = k\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{k}{x}$$

$$\Rightarrow k = xy \quad \dots (i)$$

مساوات (i) ۾ $y = 7$ ۽ $x = 2$ رکڻ سان

$$k = (2)(7) = 14 \quad \text{اسان کي مليو}$$

$$\Rightarrow xy = 14 \quad \dots (ii)$$

مساوات (ii) ۾ $x = 126$ رکڻ سان

$$\text{اسان کي مليو } (126)y = 14$$

$$y = \frac{14}{126}$$

$$y = \frac{1}{9}$$



مشق 18.2

1. جيڪڏهن y سڌي طرح متجي ٿو x جي مطابق ۽ $y=10$ جڏهن $x=3$ ته پوءِ هيٺيان لھو.
(i) y کي x جي شڪل ۾ (ii) y جڏهن $x=6$ (iii) x جڏهن $y=15$
2. جيڪڏهن $V \propto T$ ۽ $V=15$ جڏهن $T=24$ ته پوءِ هيٺيان لھو.
(i) T ۽ V کي ڳنڍيندڙ مساوات (ii) V جڏهن $T=30$ (iii) T جڏهن $V=10$
3. جيڪڏهن $u \propto \sqrt[3]{v}$ ۽ $u=4$ جڏهن $v=64$ ته پوءِ u جو ملھ لھو جڏهن $v=216$ ۽ v جو ملھ لھو جڏهن $u=5$
4. جيڪڏهن F سڌي طرح متجي ٿو m^3 جي مطابق جڏهن $m=3$ ۽ $F=81$ ته پوءِ F لھو جڏهن $m=5$
5. جيڪڏهن y اُبتو متجي ٿو x جي مطابق ۽ $y=10$ جڏهن $x=3$ ته پوءِ y لھو جڏهن $x=10$
6. هڪ گيس جو مقدار V اُبتو متجي ٿو داب P جي ٻيئي مول مطابق ۽ $V=12$ جڏهن $P=9$ ته پوءِ P لھو جڏهن $V=4$
7. جيڪڏهن $F \propto \frac{1}{r^2}$ ۽ $F=8$ جڏهن $r=2$ ته هيٺيان لھو.
(i) F جڏهن $r=5$ (ii) r جڏهن $F=24$
8. x جو ٽيون مول متجي ٿو y جي چورس مطابق جيڪڏهن $x=8$ ۽ $y=3$ ته پوءِ x جو ملھ لھو جڏهن $y=\frac{3}{2}$
9. ٻن جسمن جي وچ واري قوت F اُبتو متجي ٿي انهن ٻنهي جي مرڪزن جي وچ واري فاصلي d جي چورس مطابق جيڪڏهن $F=2$ ۽ $d=3$ ته پوءِ d جو ملھ لھو جڏهن $F=72$
10. جيڪڏهن y اُبتو متجي ٿو $(x-5)$ جي مطابق جڏهن $y=6$ ۽ $x=8$ ته پوءِ y جو ملھ لھو جڏهن $x=10$.

18.1(ii) مسلسل تناسب ۾ ٽيون، چوٿون ۽ وچيون متناسب لھڻ

اسين تناسب سان اڳيئي واقف آھيون. جيڪڏهن a, b, c ۽ d تناسب ۾ آھن ته پوءِ $a:b::c:d$ هتي a, b, c ۽ d کي ترتيبوار پھريون، ٻيون، ٽيون، ۽ چوٿون متناسب چوندا آھيون.

(a) ٽيون متناسب (Third Proportional):

مثال 1:

جيڪڏهن هڪ تناسب ۾ 4، 7 ۽ 14 ترتيبوار پھريون، ٻيون ۽ چوٿون متناسب آھن ته پوءِ ٽيون متناسب لھو.

حل: فرض ڪريو ته x ٽيون متناسب آھي. ته پوءِ

$$4:7::x:14$$

$$\Rightarrow 7x = 56$$

$$\Rightarrow x = 8$$

مثال 2:

جيڪڏهن $(a-b), (a^2+ab+b^2)$ ۽ (a^3-b^3) ترتيبوار پھريون، ٻيون ۽ چوٿون متناسب آھن ته پوءِ ٽيون متناسب لھو.

حل: فرض ڪريو ته x ٽيون متناسب آھي ته پوءِ


$$(a-b):(a^2+ab+b^2)::x:a^3-b^3$$

$$\Rightarrow (a^2+ab+b^2)x = (a-b)(a^3-b^3)$$

$$(a^2+ab+b^2)x = (a-b)^2(a^2+ab+b^2)$$

$$\Rightarrow x = \frac{(a-b)^2(a^2+ab+b^2)}{(a^2+ab+b^2)}$$

$$\Rightarrow x = (a-b)^2$$



(b) چوٿون متناسب (Fourth Proportional):

مثال 1: چوٿون متناسب لھو جيڪڏھن پھريان ٽي متناسب $a^3 + b^3$, $a - b$, ۽ $a^2 - ab + b^2$ آھن. **حل:**

فرض ڪريو ته x چوٿون متناسب آھي ته پوءِ

$$a^3 + b^3 : a - b :: (a^2 - ab + b^2) : x$$

$$x(a^3 + b^3) = (a - b)(a^2 - ab + b^2) \quad \text{يعني ته}$$

$$\Rightarrow x = \frac{(a - b)(a^2 - ab + b^2)}{(a + b)(a^2 - ab + b^2)}$$

$$\Rightarrow x = \frac{a - b}{a + b}$$

مسلسل تناسب (Continued Proportion) ۽ وچون متناسب (Mean Proportional):

مقدارون a , b ۽ c مسلسل تناسب ۾ ھونديون جيڪڏھن

$$a : b = b : c$$

$$a : b :: b : c \quad \text{يا}$$

$$\Rightarrow b^2 = ac$$

ھتي b کي وچون متناسب چوندا سين

مثال 1: $x^2 - y^2$ ۽ $\frac{x - y}{x + y}$ جو وچون متناسب معلوم ڪريو.

حل: فرض ڪريو ته z وچون متناسب آھي، ته پوءِ

$$x^2 - y^2 : z :: z : \frac{x - y}{x + y}$$

$$z^2 = (x^2 - y^2) \frac{(x - y)}{x + y} = (x - y)^2 \quad \text{يعني ته}$$

$$\Rightarrow z = x - y$$

مثال 2: a جو ملھ لھو جيڪڏھن $a - 3$, 7 ۽ 28 مسلسل تناسب ۾ آھن.

حل: جيئن ته $a - 3$, 7 ۽ 28 مسلسل تناسب ۾ آھن.

$$7 : a - 3 :: a - 3 : 28 \quad \text{تنھنڪري}$$

$$(a - 3)^2 = 7 \times 28 \quad \text{يعني ته}$$

$$\Rightarrow (a - 3)^2 = 196$$

$$\Rightarrow a - 3 = 14$$

$$\Rightarrow a = 14 + 3$$


$$\Rightarrow a = 17$$

مشق 18.3

ٽيون متناسب لھو جيڪڏھن پھريون، ٻيون ۽ چوٿون متناسب ھيٺ ڏنل آھن

$$a - b \quad \text{۽} \quad a + b, a^2 - b^2 \quad \text{(i)} \quad 54 \quad \text{۽} \quad 18, 6 \quad \text{(ii)}$$

$$a + b \quad \text{۽} \quad \frac{a^2 - ab + b^2}{a - b}, \frac{a^3 + b^3}{a^2 - b^2} \quad \text{(iv)} \quad x + y \quad \text{۽} \quad x^3 + y^3, (x + y)^2 \quad \text{(iii)}$$



2. هيٺين جو چوٿون متناسب لهو.

- (i) 8, 4, 2 (ii) $a^3 + b^3, a^2 - b^2, a^2 - ab + b^2$
 (iii) $a^2 - 8a + 12, a - 2, 2a^3 - 12a^2$
 (iv) $(a^2 - b^2)(a^2 - ab + b^2), a^3 + b^3, a^3 - b^3$

3. هيٺين جو وچون متناسب لهو.

- (i) 8, 18 (ii) $5ab^2, 28a^3b^2$
 (iii) $a^4 - b^4, \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$ (iv) $a^3 - b^3, \frac{a - b}{a^2 - ab + b^2}$

4. هيٺ ڏنل عدد مسلسل تناسب ۾ آهن ته x جو ملهه لهو.

- (i) 45, x , 5 (ii) 16, x , 9
 (iii) 12, $3x - 6$, 27 (iv) 7, $x - 3$, 112

18.2 تناسب جا قانون:

18.2.1 تناسب جو سوال حل ڪرڻ لاءِ عڪسي نسبت، نسبت جي تبديلي، نسبت جي ملائڻ ۽ نسبت جي ونڊ وارن قانونن جو استعمال ڪرڻ:

(i) عڪسي نسبت وارو قانون (Theorem of invertendo):

جيڪڏهن $a:b = c:d$ ته پوءِ $b:a = d:c$

مٿي ڏنل بيان کي عڪسي نسبت وارو قانون چئبو آهي.

ثابتي: جيئن ته $a:b = c:d$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$$

(ٻنهي پاسن جو اُبتڙ وٺڻ سان)

يعني ته $b:a = d:c$ انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.

مثال طور: (i) جيڪڏهن $2:3 = 4:6$ ته پوءِ عڪسي نسبت واري قانون مطابق $3:2 = 6:4$

(ii) جيڪڏهن $4p:5q = 2r:5s$ ته پوءِ عڪسي نسبت واري قانون مطابق

$$5q:4p = 5s:2r$$

(ii) نسبت جي تبديلي وارو قانون (Theorem of Alternando):

جيڪڏهن $a:b = c:d$ ته پوءِ $a:c = b:d$

مٿين بيان کي نسبت جي تبديلي وارو قانون چئبو آهي.

ثابتي: جيئن ته $a:b = c:d$


$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{يا}$$

$$\Rightarrow ad = bc$$

ٻنهي پاسن کي cd سان ونڊ ڪندي

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{d} \quad \text{اسان کي مليو}$$

$$a:c = b:d \quad \text{يعني}$$



مثال:

(i) جيڪڏهن $2:5=6:15$ ته پوءِ نسبت جي تبديلي واري قانون مطابق

$$2:6=5:15$$

(ii) جيڪڏهن $4p-1:2-3q=5+2r:2s+1$ ته پوءِ نسبت جي تبديلي واري قانون مطابق

$$4p-1:5+2r=2-3q:2s+1$$

(iii) **نسبت کي ملائڻ وارو قانون (Theorem of Componendo):**

جيڪڏهن $a:b=c:d$ ته پوءِ نسبت کي ملائڻ واري قانون مطابق

$$(i) \quad a+b:b=c+d:d \quad (ii) \quad a:a+b=c:c+d$$

ثابتي: (i) جيئن ته $a:b=c:d$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{ته پوءِ}$$

ٻنهي پاسن ۾ 1 جوڙ ڪرڻ سان

$$\frac{a}{b} + 1 = \frac{c}{d} + 1$$

$$\Rightarrow \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$$

$$a+b:b=c+d:d \quad \text{يا}$$

انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.

ثابتي: (ii) جيئن ته $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

$$\text{ته پوءِ} \quad \frac{b}{a} = \frac{d}{c} \quad (\text{عڪي نسبت واري قانون مطابق})$$

ٻنهي پاسن ۾ 1 جوڙ ڪرڻ سان

$$\frac{b}{a} + 1 = \frac{d}{c} + 1$$

$$\frac{b+a}{a} = \frac{d+c}{c}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b+a} = \frac{c}{c+d}$$

$$a:a+b=c:c+d \quad \text{يا}$$

انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.

مثال: جيڪڏهن $p+2:q=r:s-3$ ته پوءِ نسبت کي ملائڻ واري قانون (i) جي مطابق

$$p+2+q:q=r+s-3:s-3$$

ساڳي ريت، نسبت کي ملائڻ واري قانون (ii) جي مطابق

$$p+2:p+2+q=r:r+s-3$$

(iv) **نسبت جي ونڊ وارو قانون (Theorem of Dividendo):**

جيڪڏهن $a:b=c:d$ ته پوءِ نسبت جي ونڊ واري قانون مطابق

$$(i) \quad a-b:b=c-d:d \quad (ii) \quad a:a-b=c:c-d$$



ثابتي: (i) جيئن ته $a:b=c:d$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{يا}$$

ٻنهي پاسن مان 1 کي ڪٽ ڪندي

$$\frac{a}{b} - 1 = \frac{c}{d} - 1$$

$$\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d} \quad \text{يا}$$

يا $a-b:b=c-d:d$ انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.

ثابتي: (ii) جيئن ته $a:b=c:d$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{تنهنڪري}$$

عڪسي نسبت واري قانون موجب

$$\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$$

ٻنهي پاسن مان 1 کي ڪٽ ڪندي

$$\frac{b}{a} - 1 = \frac{d}{c} - 1$$

$$\Rightarrow \frac{b-a}{a} = \frac{d-c}{c}$$

عڪسي نسبت واري قانون موجب

$$\frac{a}{b-a} = \frac{c}{d-c}$$

يا $a:b-a=c:d-c$ انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.

مثال: جيڪڏهن $m+5:n-3=4p+7:3q+2$ ته پوءِ ثابت ڪري ڏيکاريو ته $m-n+8:n-3=4p-3q+5:3q+2$

حل: جيئن ته $m+5:n-3=4p+7:3q+2$

$$\Rightarrow \frac{m+5}{n-3} = \frac{4p+7}{3q+2}$$

نسبت جي ونڊ واري قانون مطابق

$$\frac{(m+5)-(n-3)}{n-3} = \frac{(4p+7)-(3q+2)}{3q+2}$$

$$\Rightarrow \frac{m-n+8}{n-3} = \frac{4p-3q+5}{3q+2}$$

يعني ته $m-n+8:n-3=4p-3q+5:3q+2$

انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.

(v) نسبت جي ملائڻ ۽ ونڊ وارو قانون (Theorem of componendo and dividendo):

جيڪڏهن $a:b=c:d$ ته پوءِ نسبت جي ملائڻ ۽ ونڊ واري قانون مطابق

$$(i) \quad a+b:a-b=c+d:c-d$$


$$(ii) \quad a-b:a+b=c-d:c+d$$

مثال: جيڪڏهن $m:n=p:q$ ته پوءِ ثابت ڪري ڏيکاريو ته $3m-2n:3m+2n=3p-2q:3p+2q$

حل: جيئن ته $m:n=p:q$

$$\frac{m}{n} = \frac{p}{q} \quad \text{تنهنڪري}$$

ٻنهي پاسن کي $\frac{3}{2}$ سان ضرب ڪندي



$$\frac{3m}{2n} = \frac{3p}{2q}$$

نسبت جي ملائڻ ۽ ونڊ واري قانون جو استعمال ڪندي

$$\frac{3m-2n}{3m+2n} = \frac{3p-2q}{3p+2q}$$

$$3m-2n : 3m+2n = 3p-2q : 3p+2q \quad \text{يا}$$

انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.

مثال 2: جيڪڏهن $3p+4q : 3p-4q = 3r+4s : 3r-4s$ ته پوءِ ثابت ڪري ڏيکاريو ته $p : q = r : s$

حل: جيئن ته $3p+4q : 3p-4q = 3r+4s : 3r-4s$

نسبت جي ملائڻ ۽ ونڊ واري قانون (i) مطابق

$$\therefore \frac{(3p+4q) + (3p-4q)}{(3p+4q) - (3p-4q)} = \frac{(3r+4s) + (3r-4s)}{(3r+4s) - (3r-4s)}$$

$$\frac{3p+4q+3p-4q}{3p+4q-3p+4q} = \frac{3r+4s+3r-4s}{3r+4s-3r+4s}$$

$$\frac{6p}{8q} = \frac{6r}{8s} \quad (\text{ٻنهي پاسن مان } \frac{6}{8} \text{ ڪي ڪٽيندي})$$

$$\Rightarrow \frac{p}{q} = \frac{r}{s}$$

يا $p : q = r : s$

انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.

مثال 3: نسبت جي ملائڻ ۽ ونڊ واري قانون جو استعمال ڪندي x جو ملهه لھو

$$\frac{\sqrt{x+6} - \sqrt{x-6}}{\sqrt{x+6} + \sqrt{x-6}} = \frac{2}{5} \quad \text{جيڪڏهن}$$

$$\frac{\sqrt{x+6} - \sqrt{x-6}}{\sqrt{x+6} + \sqrt{x-6}} = \frac{2}{5} \quad \text{حل: اسان وٽ آهي}$$

نسبت جي ملائڻ ۽ ونڊ واري قانون موجب

$$\frac{(\sqrt{x+6} - \sqrt{x-6}) + (\sqrt{x+6} + \sqrt{x-6})}{(\sqrt{x+6} - \sqrt{x-6}) - (\sqrt{x+6} + \sqrt{x-6})} = \frac{2+5}{2-5}$$

$$\frac{\sqrt{x+6} - \sqrt{x-6} + \sqrt{x+6} + \sqrt{x-6}}{\sqrt{x+6} - \sqrt{x-6} - \sqrt{x+6} - \sqrt{x-6}} = \frac{7}{-3}$$

$$\frac{2\sqrt{x+6}}{-2\sqrt{x-6}} = \frac{7}{-3} \Rightarrow \frac{\sqrt{x+6}}{\sqrt{x-6}} = \frac{7}{3}$$

ٻنهي پاسن جو چورس وٺندي


$$\frac{x+6}{x-6} = \frac{49}{9}$$

$$9x+54 = 49x-294$$

$$9x-49x = -294-54$$

$$-40x = -348$$

$$x = \frac{348}{40} = \frac{87}{10}$$



مثال 4: نسبت جي ملائڻ ۽ ونڊ واري قانون جو استعمال ڪندي مساوات $\frac{(x+3)^2 + (x-1)^2}{(x+3)^2 - (x-1)^2} = \frac{5}{4}$ کي حل ڪريو.

حل: اسان وٽ آهي: $\frac{(x+3)^2 + (x-1)^2}{(x+3)^2 - (x-1)^2} = \frac{5}{4}$

نسبت جي ملائڻ ۽ ونڊ واري قانون موجب

$$\frac{(x+3)^2 + (x-1)^2 + (x+3)^2 - (x-1)^2}{(x+3)^2 + (x-1)^2 - (x+3)^2 + (x-1)^2} = \frac{5+4}{5-4}$$

$$\Rightarrow \frac{2(x+3)^2}{2(x-1)^2} = \frac{9}{1}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x+3}{x-1} \right)^2 = 9$$

$$\Rightarrow \frac{x+3}{x-1} = \pm 3$$

$$\begin{array}{ll} \frac{x+3}{x-1} = 3 & \text{يا} \quad \frac{x+3}{x-1} = -3 \\ x+3 = 3x-3 & x+3 = -3x+3 \\ -2x = -6 & 4x = 0 \\ x = 3 & x = 0 \end{array}$$

انهي ڪري حل سيٽ $\{0, 3\}$ آهي

مثال 5: ثابت ڪريو ته $a:b=c:d$ جيڪڏهن $\frac{ac^2-bd^2}{ac^2+bd^2} : \frac{c^3-d^3}{c^3+d^3}$

حل:

$$\frac{ac^2-bd^2}{ac^2+bd^2} = \frac{c^3-d^3}{c^3+d^3} \quad \text{جيئن ته}$$

نسبت جي ملائڻ ۽ ونڊ واري قانون مطابق


$$\frac{ac^2-bd^2+ac^2+bd^2}{ac^2-bd^2-ac^2-bd^2} = \frac{c^3-d^3+c^3+d^3}{c^3-d^3-c^3-d^3}$$

$$\frac{2ac^2}{-2bd^2} = \frac{2c^3}{-2d^3}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

يا $a:b=c:d$

انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.



مشق 18.4

1. جيڪڏهن $x : y = z : w$ ته پوءِ ثابت ڪريو ته

$$(i) \frac{4x+3y}{4x-3y} = \frac{4z+3w}{4z-3w}$$

$$(ii) \frac{5x-3y}{5x+3y} = \frac{5z-3w}{5z+3w}$$

$$(iii) \frac{x^3+y^3}{x^3-y^3} = \frac{z^3+w^3}{z^3-w^3}$$

$$(iv) \frac{3x+2y}{3x-2y} = \frac{3z+2w}{3z-2w}$$

$$(v) \frac{2x+3y+2z+3w}{2x+3y-2z-3w} = \frac{2x-3y+2z-3w}{2x-3y-2z+3w}$$

2. ثابت ڪريو ته $a:b=c:d$ جيڪڏهن

$$(i) a^2-b^2 : a^2+b^2 = ac-bd : ac+bd$$

$$(ii) \frac{a+b+c+d}{a+b-c-d} = \frac{a-b+c-d}{a-b-c+d}$$

3. نسبت جي ملائڻ ۽ ونڊ واري قانون جو استعمال ڪندي هيٺيون مساواتون حل ڪريو

$$(i) \frac{(x+3)^2 - (x-5)^2}{(x+3)^2 + (x-5)^2} = \frac{4}{5}$$

$$(ii) \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}} = \frac{1}{2}$$

$$(iii) \frac{\sqrt{x+5} - \sqrt{x-5}}{\sqrt{x-5} + \sqrt{x-5}} = \frac{1}{10}$$

$$(iv) \frac{(x+3)^2 + (x-1)^3}{(x+3)^2 - (x-1)^3} = \frac{11}{7}$$

18.3 گڏيل ڦير ڦار يا متج (Joint Variation):

18.3(i) گڏيل ڦير ڦار کي بيان ڪرڻ

جڏهن هڪ مقدار يا بدلجندڙ ٻن يا ٻن کان وڌيڪ مقدارن جي ضرب اُپت يا ونڊ اُپت تي انحصار ڪري ته ان ڦير ڦار کي گڏيل ڦير ڦار چئبو آهي. ٻين لفظن ۾ گڏيل ڦير ڦار تڏهن ٿئي ٿي جڏهن هڪ مقدار يا بدلجندڙ هڪ کان وڌيڪ مقدارن سان سڌي طرح يا اُبتو متجي ٿو.

مثال طور: (i) جيڪڏهن x سڌي طرح متجي ٿو y ۽ z سان ته اسان وٽ آهي $x \propto yz$
 $\Rightarrow x = kyz$

(ii) جيڪڏهن x سڌي طرح متجي ٿو y سان ۽ اُبتو متجي ٿو z سان ته اسان وٽ آهي

$$x \propto \frac{y}{z} \Rightarrow x = \frac{ky}{z}$$

18.3 (ii) گڏيل ڦير ڦار سان لاڳاپيل سوال حل ڪرڻ:

مثال 1: جيڪڏهن y سڌي طرح سان متجي ٿو xz^2 سان ۽ $y = 4$ جڏهن $x = 6$ ۽ $y \cdot z = 3$ جو ملهه لهو جڏهن

$$z = 5 \text{ ۽ } x = -81$$

حل: جيئن ته x سڌي طرح سان متجي ٿو $x \propto z^2$ جي مطابق

$$y \propto xz^2 \quad \text{تنهنڪري}$$

$$y = kxz^2 \quad \text{يعني}$$

مساوات (i) ۾ $y = 4$ ، $x = 6$ ۽ $z = 3$ رکڻ سان

$$4 = k(6)(3)^2 \Rightarrow k = \frac{4}{54} = \frac{2}{27}$$



مساوات (i) ۾ $k = \frac{2}{27}$ رکڻ سان

اسان کي مليو $y = \frac{2}{27} x z^2$... (ii)

هاڻي مساوات (ii) ۾ $x = -81$ ۽ $z = 5$ رکڻ سان

$$y = \frac{2}{27} (-81) (5)^2 = 2(-3)(25) = -150$$

مثال 2: جيڪڏهن s سڌي طرح متجي ٿو v^3 سان ۽ $\sqrt{t}$ سان u سان $s = 16$ جڏهن $t = 9$ ، $v = 4$ ۽ $u = 24$ جو ملهه لھو جڏهن $u = 25$ ، $t = 36$ ۽ $v = 5$

حل: جيئن ته s سڌي طرح متجي ٿو v^3 سان ۽ $\sqrt{t}$ سان u سان

تنهنڪري (i) $s \propto \frac{v^3}{u\sqrt{t}} \Rightarrow s = k \frac{v^3}{u\sqrt{t}}$... (i)

مساوات (i) ۾ $k = 18$ رکڻ سان

$$s = \frac{18 v^3}{u\sqrt{t}} \quad \dots (ii)$$

مساوات (ii) ۾ $u = 25$ ، $t = 36$ ۽ $v = 5$ رکڻ سان اسان کي مليو

$$s = \frac{18 (5)^3}{\sqrt{36} (25)} = \frac{18 \times 125}{6 \times 25} = 15$$


مساوات (i) ۾ $s = 16$ ، $t = 9$ ، $v = 4$ ۽ $u = 24$ رکڻ سان

$$16 = \frac{k(4)^3}{\sqrt{9}(24)}$$

$$16 = \frac{k(64)}{72} \Rightarrow k = 16 \times \frac{72}{64} = 18$$

مشق 18.5

- جيڪڏهن y سڌي طرح متجي ٿو x^2 سان ۽ $y = 6$ جڏهن $x = 4$ ، $z = 9$ کي x ۽ z جي عمل طور لکو. y جو ملهه لھو جڏهن $x = -8$ ۽ $z = 12$
- جيڪڏهن y سڌي طرح متجي ٿو x ۽ u^2 سان ۽ $y = 40$ جڏهن $x = 8$ ، $u = 5$ ۽ $v = 3$ کي y ، $t = 2$ جي شڪل ۾ لکو. y جو ملهه پڻ لھو جڏهن $x = -2$ ، $u = 4$ ، $v = 3$ ۽ $t = -1$
- جيڪڏهن w سڌي طرح متجي ٿو u^2 سان ۽ v جي ٽيئن مول سان $w = 216$ ۽ $u = 6$ جو ملهه لھو جڏهن $u = 10$ ۽ $v = 125$
- جيڪڏهن سادي لتڪڻي (پينڊولم) جو وقت T سڌي طرح نسبت رکي ٿو ان جي ڊيگهه L جي ٻئي مول سان ۽ اُپتي نسبت رکي ٿو کشش ثقل واري تيزي g جي ٻئي مول سان ۽ سيڪنڊ $T = 2$ س. م $L = 100$ ميٽر في سيڪنڊ چورس $g = 9.8$ ته پوءِ ڪنهن خاص اُچائي تي سادي پينڊولم جو وقت لھو جڏهن ته ميٽر $L = 200$ ۽ ميٽر في سيڪنڊ چورس $g = 7.6$
- ڪنهن خاص گئس جو مقدار V سڌي نسبت رکي ٿو گرمي پد T سان ۽ اُپتي نسبت رکي ٿو ڊاڀ P سان. جيڪڏهن $V = 100$ ، $T = 30$ ۽ $P = 64$ ته پوءِ V جو ملهه لھو جڏهن ته $T = 60$ ۽ $P = 81$



18.4-k وارو طريقو (K - Method):

جڏهن ٻه يا وڌيڪ نسبتون پاڻ ۾ برابر هجن ته پوءِ هر هڪ برابر نسبت کي علامت ”k“ سان ظاهر ڪندي گهڻا فائديمند تناسب ثابت ڪري سگهجن ٿا. اهو طريقو جنهن ۾ هر هڪ برابر نسبت لاءِ ”k“ جو استعمال ٿيئي ان کي k وارو طريقو چئبو آهي. ڪيترن ئي مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ k وارو طريقو ڏاڍو ڪارائتو آهي.

(i) 18.4 تناسبن تي مشتمل شرطيه مساواتن کي ثابت ڪرڻ لاءِ k وارو طريقو استعمال ڪرڻ:

جيڪڏهن $a:b::c:d$ هڪ تناسب آهي

ته پوءِ k واري طريقي سان

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$$

$$\Rightarrow \frac{c}{d} = k \text{ ۽ } \frac{a}{b} = k$$

$$c = dk \dots (ii) \text{ ۽ } a = bk \dots (i)$$

انهن مساواتن جو استعمال ڪندي، اسين تناسب سان لاڳاپيل سوال حل ڪري سگهون ٿا.

مثال 1: جيڪڏهن $a:b::c:d$ ته پوءِ ثابت ڪري ڏيکاريو ته $\frac{8a-5b}{8a+5b} = \frac{8c-5d}{8c+5d}$

حل: جيئن ته $a:b=c:d$

فرض ڪريو ته $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$

ته پوءِ $c = dk$ ۽ $a = bk$

L.H.S = $\frac{8a-5b}{8a+5b} = \frac{8bk-5b}{8bk+5b} = \frac{b(8k-5)}{b(8k+5)} = \frac{8k-5}{8k+5}$ هاڻي

R.H.S = $\frac{8c-5d}{8c+5d} = \frac{8dk-5d}{8dk+5d} = \frac{d(8k-5)}{d(8k+5)} = \frac{8k-5}{8k+5}$

$\therefore$ L.H.S = R.H.S

$\therefore \frac{8a-5b}{8a+5b} = \frac{8c-5d}{8c+5d}$

انهيءَ کي ثابت ٿيو.

مثال 2: جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$ ته پوءِ ثابت ڪريو ته $\frac{(a+c+e)^3}{(b+d+f)^3} = \frac{ace}{bdf}$

حل: اسان وٽ آهي $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$


فرض ڪريو ته $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k$

ته پوءِ $\frac{e}{f} = k$ ۽ $\frac{c}{d} = k$ ۽ $\frac{a}{b} = k$

$\Rightarrow e = fk$ ۽ $\Rightarrow c = dk$ $\Rightarrow a = bk$

هاڻي

L.H.S = $\frac{(a+c+e)^3}{(b+d+f)^3} = \frac{(bk+dk+fk)^3}{(b+d+f)^3} = \frac{[k(b+d+f)]^3}{(b+d+f)^3} = k^3$



$$\text{R.H.S} = \frac{ace}{bdf} = \frac{(bk)(dk)(fk)}{bdf} = \frac{k^3 bdf}{bdf} = k^3$$

$$\therefore \text{L.H.S} = \text{R.H.S}$$

$$\therefore \frac{(a+c+e)^3}{(b+d+f)^3} = \frac{ace}{bdf}$$

انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.

مثال 3:

جيڪڏهن $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$ ته پوءِ ثابت ڪري ڏيکاريو ته $(a^2 + c^2 + e^2)(b^2 + d^2 + f^2) = (ab + cd + ef)^2$

حل: فرض ڪريو ته $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k$

$$\Rightarrow e = f k \text{ ۽ } c = d k, a = b k$$

$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= (a^2 + c^2 + e^2)(b^2 + d^2 + f^2) \\ &= (b^2 k^2 + d^2 k^2 + f^2 k^2)(b^2 + d^2 + f^2) \\ &= k^2(b^2 + d^2 + f^2)(b^2 + d^2 + f^2) \\ &= k^2(b^2 + d^2 + f^2)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{R.H.S} &= (ab + cd + ef)^2 \\ &= [(b k)b + (d k)d + (f k)f]^2 \\ &= [k b^2 + k d^2 + k f^2]^2 \\ &= [k(b^2 + d^2 + f^2)]^2 \\ &= k^2(b^2 + d^2 + f^2)^2 \\ \therefore \text{L.H.S} &= \text{R.H.S} \end{aligned}$$

$$\therefore (a^2 + c^2 + e^2)(b^2 + d^2 + f^2) = (ab + cd + ef)^2$$

انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.

مشق 18.6

1. جيڪڏهن $p:q=r:s$ ته پوءِ ثابت ڪري ڏيکاريو ته

$$(i) \frac{8p-3q}{8p+3q} = \frac{8r-3s}{8r+3s}$$

$$(ii) 3\sqrt{\frac{p^3+r^3}{q^3+s^3}} = \frac{p}{q}$$

$$(iii) (p^2+q^2): \frac{p^3}{p+q} = (r^2+s^2): \frac{r^3}{r+s}$$

$$(iv) p^5+r^5:q^5+s^5 = p^3 r^2 : q^3 s^2$$


$$(v) \frac{p-q}{p} : \frac{q}{p+q} = \frac{r-s}{r} : \frac{s}{r+s}$$

2. جيڪڏهن $a:b=c:d=e:f$ ته پوءِ ثابت ڪري ڏيکاريو ته

$$(i) \frac{a^4 b^2 + a^2 e^2 - e^4 f}{b^6 + b^2 f^2 - f^5} = \frac{a^4}{b^4}$$

$$(ii) \frac{a^2 b + c^2 d + e^2 f}{ab^2 + cd^2 + ef^2} = \frac{a+c+e}{b+d+f}$$

$$(iii) \frac{ac}{bd} + \frac{ce}{df} + \frac{ea}{fb} = \frac{a^2}{b^2} + \frac{c^2}{d^2} + \frac{e^2}{f^2}$$



(ii) 18.4 ڦير ڦار وارا روز مره زندگي جا مسئلا حل ڪرڻ

مثال 1: هڪ جسم جي مخفي توانائي "p" گڏيل متجي تي جسم جي مائي "m" ۽ اوچائي "h" سان جيڪڏهن مخفي توانائي 1940 جول آهي جڏهن ته ڪلو گرام $m=2$ ۽ ميٽر $h=100$ ته پوءِ ان جسم جي مخفي توانائي لھو جنهن جو مايو 5 ڪلو گرام ۽ اوچائي 300 ميٽر آهي.

حل: جيئن ته مخفي توانائي "p"، مائي "m" ۽ اوچائي "h" سان گڏيل متجي ٿي.

تنهن ڪري $p \propto mh$

(i) $p = kmh$ (جڏهن ته تناسب جو مستقل k آهي)

مساوات (i) ۾ $m=2$, $h=100$ ۽ $p=1960$ رکندي

اسان کي مليو $1960 = k(2)(100)$

$$\Rightarrow k = \frac{1960}{200} = 9.8$$

مساوات (i) ۾ k جو ملهه رکندي

(ii) $p = 9.8mh$

هاڻي مساوات (ii) ۾ $m=5$ ۽ $h=300$ رکندي

اسان کي مليو $p = 9.8(5)(300)$

جول 14700

مثال 2: هڪ جي قانون موجب هڪ اسپرنگ کي ڇڪڻ لاءِ لڳيل قوت "F" سڌي طرح سان متجي ٿي وڌيل ڊيگهه "S" سان جڏهن پائونڊ $F=64$ ۽ انچ $S=3.2$

(i) S جو ملهه لھو جڏهن پائونڊ $F=100$

(ii) F جو ملهه لھو جڏهن انچ $S=0.4$

حل: جيئن ته $F \propto S$

$$\Rightarrow F = kS \dots (i)$$

$F=64$ ۽ $S=3.2$ رکڻ سان

اسان کي مليو

$$64 = 3.2k$$

$$\Rightarrow k = \frac{64}{3.2} = 20$$

مساوات (i) ۾ $k=20$ رکندي

اسان کي مليو $F=20S \dots (ii)$

(i) مساوات (ii) ۾ $F=100$ رکندي

اسان کي مليو $100 = 20S$

$$\Rightarrow S = 5$$

(ii) مساوات (ii) ۾ $S=0.4$ رکندي

اسان کي مليو $F = 20(0.4)$

پائونڊ 8

مثال 3: مزدوري جي رقم "C" گڏيل متجي ٿي مزدورن جي تعداد "n" ۽ ڏينهن جي سراسر تعداد "d" سان جيڪڏهن 10 ڏينهن لاءِ 210 مزدورن جي مزدوري جي رقم 450,000 رُپيا آهي. ته پوءِ 16 ڏينهن لاءِ 300 مزدورن جي مزدوري جي رقم لھو.

حل: جيئن ته رقم سڌي طرح سان متجي ٿي ڏينهن ۽ مزدورن جي تعداد سان

تنهنڪري $C \propto nd$

(i) $C = knd$

مساوات (i) ۾ $n=200$, $C=450,000$ ۽ $d=10$

رکڻ سان

اسان کي مليو $450,000 = k(200)(10)$

$$\Rightarrow k = \frac{450,000}{2000} = 225$$

مساوات (i) ۾ $k=225$ استعمال ڪندي

اسان کي مليو $C = 225 \cdot nd \dots (ii)$

مساوات (ii) ۾ $n=300$ ۽ $d=16$ رکندي

اسان کي مليو $C = 225 \times 300 \times 16$

$$C = 1080000$$

انهيءَ ڪري 16 ڏينهن لاءِ 300 مزدورن جي رقم 1080000 رُپيا آهي.



مثال 4: هاسٽيل جا خرچ ڪجهه مستقل آهن ۽ ڪجهه شاگردن جي تعداد مطابق متنجن ٿا. جڏهن شاگردن جو تعداد 140 آهي ته خرچو 19300 رُپيا ۽ 200 شاگردن لاءِ خرچو آهي 26500 رُپيا. خرچو لھو جيڪڏهن شاگردن جو تعداد 300 آهي.

حل: فرض ڪريو ته مستقل خرچ ”C“ آهي ۽ ”Q“ غير مستقل خرچن کي ظاهر ڪري ٿو. فرض ڪريو ته x شاگردن جو تعداد ۽ ”P“ ڪُل خرچ کي ظاهر ڪري ٿو.

$$\therefore Q \propto x$$

$$\therefore Q = nx \text{ (جڏهن } n \text{ تناسب جو مستقل آهي)}$$

$$P = C + Q$$

$$P = C + nx \text{ (ڏنل شرط موجب)}$$

ڏنل رڻمن جو استعمال ڪندي اسان کي مليون

$$26500 = C + 200n \quad \dots(ii) \quad \text{۽} \quad 19300 = C + 140n \quad \dots(i)$$

$$P = C + 300n \quad \dots(iii) \quad \text{تنهن کان سواءِ}$$

$$\text{مساواتن (i) ۽ (ii) مان، اسان کي مليو: } C = 2500 \text{ ۽ } n = 120$$

$$\text{مساوات (iii) ۾ } C = 2500 \text{ ۽ } n = 120 \text{ رکندي}$$

$$\text{اسان کي مليو } P = 2500 + 300(120) = 38500$$

انهي ڪري 300 شاگردن جو ڪُل خرچ 38500 رُپيا آهي

مشق 18.7


- هڪ ٽار ۾ بجلي جو وهڪرو ”I“ سڌي نسبت رکي ٿو برقي سگهه جي فرق ”V“ سان ۽ آبتي نسبت رکي ٿو روڪ ”R“ سان. جيڪڏهن ايمپيئر $I = 6$ جڏهن وولٽ $V = 220$ ۽ اوهم $R = 5$ ۽ I جو مُلھ لھو جڏهن وولٽ $V = 180$ ۽ اوهم $R = 8$
- روشني جي شدت جيڪا فوت ڪينڊلز ۾ پيمائش ڪبي آهي. اها آبتو متجي ٿي ان مفاصلي جي چورس سان جيڪو روشني جي ذريعي وٽان هجي. فرض ڪريو ته هڪ بلب جي روشني جي شدت 0.08 فوت ڪينڊلز آهي جيڪو 3 ميٽرن جي فاصلي تي آهي. روشني جي شدت لھو جيڪڏهن فاصلو 8 ميٽر هجي.
- هڪ مستطيلي ٽنپ جي طاقت ”S“ سڌي طرح متجي ٿي ويڪرائي ”b“ ۽ اُونھائي ”d“ جي چورس سان جيڪڏهن هڪ 9 س. م ويڪرو ۽ 12 س. م اُونھو ٽنپ 1200 پائونڊن جو سهارو ڏيئي سگهي ٿو ته 12 س. م ويڪرو ۽ 9 س. م اُونھو ٽنپ ڪيتري وزن جو سهارو ڏيئي سگهي ٿو.
- مزدوري جي رقم ”c“ گڏيل متجي ٿي ڏينهن جي سراسر تعداد ”d“ ۽ مزدورن جي تعداد ”n“ سان جيڪڏهن 15 ڏينهن لاءِ 100 مزدورن جي رقم 9000 آهي ته پوءِ 20 ڏينهن لاءِ 300 مزدورن جي مزدوري جي رقم لھو.
- هڪ نئين گاڏي جي خريد تي وڪري وارو ٽيڪس سڌي طرح سان متجي ٿو گاڏي جي قيمت سان جيڪڏهن هڪ نئين گاڏي 20000000 رپين ۾ خريدي وڃي ته پوءِ وڪري وارو ٽيڪس 40000 رُپيا آهي. وڪري وارو ٽيڪس گهڻو لڳندو جيڪڏهن نئين گاڏي جي قيمت 2800000 رُپيا آهي.

جائزي واري مشق 18

1. صحيح جواب چونڊيو

(i) تناسب $p:q::r:s$ ۾ p کي _____ چئبو آهي.

پهريون متناسب (d) چوٿون متناسب (c) وچون متناسب (b) ٽيون متناسب (a)



- (ii) هڪ نسبت $l : m$ ۾ l کي _____ چئبو آهي.
- (a) پُڇڙ (b) مُنڍ (c) تعلق (d) ڪوبه نه
- (iii) نسبت $u : v$ ۾ v کي _____ چئبو آهي.
- (a) مُنڍ (b) پُڇڙ (c) تعلق (d) ڪوبه نه
- (iv) جيڪڏهن a, b, c مسلسل تناسب ۾ آهن ته پوءِ b کي تناسب جو _____ آهي.
- (a) پهريون متناسب (b) وچون متناسب (c) ٽيون متناسب (d) ڪوبه نه
- (v) a^2 ۽ b^2 جو وچون متناسب _____ چئبو آهي.
- (a) $\sqrt{ab}$ (b) ab (c) $\frac{a}{b}$ (d) $-ab$
- (vi) جيڪڏهن $x+5 : x+7 = 5 : 7$ ته پوءِ x _____ جي برابر آهي.
- (a) 2 (b) -1 (c) 0 (d) 1
- (vii) جيڪڏهن 1، 9، x ۽ 45 تناسب ۾ آهن ته پوءِ $x =$ _____
- (a) 27 (b) $\frac{1}{5}$ (c) 5 (d) 405
- (viii) جيڪڏهن $p : q = r : 5$ ته پوءِ $p : r = q : 5$ ان کي _____ وارو قانون چئبو آهي.
- (a) نسبت کي ملائڻ (b) عڪسي نسبت (c) نسبت جي ونڊ (d) نسبت جي تبديلي
- (ix) جيڪڏهن $x : y = z : w$ ته پوءِ نسبت کي ملائڻ واري قانون موجب
- (a) $\frac{x}{x+y} = \frac{z}{z+w}$ (b) $\frac{x}{x-y} = \frac{z}{z-w}$ (c) $\frac{x-y}{x+y} = \frac{z-w}{z+w}$ (d) $\frac{x-y}{y} = \frac{z-w}{w}$
- (x) جيڪڏهن $a : b = c : d$ ته پوءِ نسبت جي تبديلي واري قانون موجب
- (a) $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ (b) $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{c}$ (c) $\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$ (d) $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$
- (xi) 3، 5، 12 جو چوٿون متناسب _____ آهي
- (a) 20 (b) 15 (c) 60 (d) 36
- (xii) جيڪڏهن $2x$ ، $3y$ ۽ $6z$ مسلسل تناسب ۾ آهن ته پوءِ
- (a) $y^2 = 12xy$ (b) $9y^2 = xz$ (c) $9y^2 = 12xz$ (d) $3y^2 = 4xz$
- (xiii) جيڪڏهن $\frac{x}{y} = \frac{w}{z}$ ته پوءِ نسبت جي ونڊ واري قانون موجب
- (a) $\frac{x-y}{y} = \frac{w-z}{z}$ (b) $\frac{x+y}{y} = \frac{w+z}{z}$ (c) $\frac{x}{x+y} = \frac{w}{w+z}$ (d) ڪوبه نه
- (xiv) قوت ۽ تيزي _____ ۾ آهن.
- (a) سڌي تناسب (b) گڏيل تناسب (c) اُپتي تناسب (d) ڪوبه نه
- (xv) جيڪڏهن $a : 4 = 15 : 5$ ته پوءِ $a =$ _____
- (a) 20 (b) 15 (c) 12 (d) 10



2. هيٺين جي نسبت لهو
(i) 100 ميٽر ۽ 500 س. م (ii) 50 ڪلو گرام ۽ 300 گرام
3. هيٺين ۾ x جو ملهه لهو
(i) $9 : x - 10 = x + 13 : 12$ (ii) $5 : x - 3 = x + 11 : 3$
4. جيڪڏهن y سڌي طرح x سان متجي ٿو ۽ $y = 25$ جڏهن $x = 75$ ته پوءِ y جو ملهه لهو جڏهن $x = 144$
5. جيڪڏهن y اُبتو متجي ٿو x سان ۽ $y = 100$ جڏهن $x = \frac{1}{2}$ ته پوءِ y جو ملهه لهو جڏهن $x = 4$
6. جيڪڏهن $x : y = 3 : w$ ته پوءِ ثابت ڪريو ته $\frac{7x+5y}{7x-5y} = \frac{7z+5w}{7z-5w}$
7. نسبت جي ملائڻ ۽ ونڊ واري قانون کي استعمال ڪندي هيٺين مساوات حل ڪريو
$$\frac{(x-3)(x-5)}{(x-7)(x-2)} = \frac{(x-6)(x-2)}{(x-1)(x-8)}$$
8. جيڪڏهن x سڌي طرح سان متجي ٿو y سان ۽ اُبتو متجي ٿو z سان ۽ $x = 30$ جڏهن $y = 15$ ۽ $z = 2$ ته پوءِ x جو ملهه لهو جيڪڏهن $y = 30$ جڏهن $z = 12$
9. سرڪٽ ۾ بجلي جو وهڪرو اُبتو متجي ٿو روڪ سان جيڪا اوهر ۾ پيمائش ڪجي ٿي جڏهن سرڪٽ ۾ بجلي جو وهڪرو 40 امپيئر ۽ روڪ 10 اوهر آهي ته بجلي جو وهڪرو لهو جيڪڏهن روڪ 12 اوهر آهي.

خلاصو:


- ◀ ٻن ساڳي قسم واري مقدارن جي ڀيٽ کي نسبت چئبو آهي.
- ◀ جيڪڏهن ٻه نسبتون $a:b$ ۽ $c:d$ برابر آهن ته پوءِ اسين هن طرح لکنداسين $a:b :: c:d$
- ◀ ٻن نسبتن جي برابري کي تناسب چئبو آهي.
- ◀ جيڪڏهن ٻه مقدارون پاڻ ۾ اهڙي طرح لاڳاپيل آهن جو هڪ مقدار ۾ اضافو (گهٽتائي) ٻئي مقدار ۾ ترتيبوار اضافي (گهٽتائي) جو سبب ٿئي ته اهڙي ڦير ڦار کي سڌو ڦير ڦار چئبو آهي.
- ◀ جيڪڏهن ٻه مقدارون پاڻ ۾ اهڙي طرح سان لاڳاپيل آهن جو جيڪڏهن هڪ مقدار وڌي ته ٻي گهٽجي ۽ ان جو اُبتو ٻه هجي. اهڙي ڦير ڦار کي اُبتو ڦير ڦار چئبو آهي
- ◀ نسبت وارا قانون
- (i) عڪسي نسبت وارو قانون: جيڪڏهن $a:b = c:d$ ته پوءِ $b:a = d:c$
- (ii) نسبت جي تبديلي وارو قانون: جيڪڏهن $a:b = c:d$ ته پوءِ $a:c = b:d$
- (iii) نسبت کي ملائڻ وارو قانون:
جيڪڏهن $a:b = c:d$ ته پوءِ $a+b : b = c+d : d$ (a) $a+b : b = c+d : d$ (b) $a : a+b = c : c+d$
- (iv) نسبت جي ونڊ وارو قانون:
جيڪڏهن $a:b = c:d$ ته پوءِ $a-b : b = c-d : d$ (a) $a-b : b = c-d : d$ (b) $a : a-b = c : c-d$
- (v) نسبت جي ملائڻ ۽ ونڊ وارو قانون:
جيڪڏهن $a:b = c:d$ ته پوءِ $a+b : a-b = c+d : c-d$
- ◀ جڏهن هڪ مقدار ٻن يا ٻن کان وڌيڪ مقدارن جي ضرب اُبت يا ونڊ اُبت تي انحصار ڪري ته ان ڦير ڦار کي گڏيل ڦير ڦار چئبو آهي.



شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هن يونٽ جي پڙهڻ کانپوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته

- ◀ قالب کي حقيقي رڻمن سان بيان ڪن ۽ ان جي مستطيلي خاڪي جو عام زندگي ۾ اظهار لاءِ تعلق ٺاهين.
- ❖ قالب جي قطارن ۽ ڪالمن جي باري ۾ ڄاڻ رکڻ.
- ❖ قالب جي ترتيب بيان ڪن
- ❖ ٻن قالبن جي برابري بيان ڪن
- ◀ قطاري قالب، ڪالمي قالب، مستطيلي قالب، چورس قالب، ٻُڙي قالب، وحداني قالب، غير طرفي قالب، اريبي قالب، متاسٽا ٿيل قالب، هر شڪلي قالب (3 ٻاءِ 3 تائين 3×3) ايتو هر شڪلي قالب کي بيان ڪن ۽ انهن جي سڃاڻپ ڪن
- ◀ اهو ڄاڻڻ ته ڇا ڏنل قالب جوڙ ۽ ڪٽ لاءِ موافق آهي
- ◀ حقيقي عدد سان قالب جي غير طرفي ضرب
- ◀ قالبن کي جوڙ ۽ ڪٽ ڪن
- ◀ جوڙ جي لحاظ کان مٿا ۽ سنگت واري قانونن جي چڪاس ڪن
- ◀ قالب جو جوڙ لاءِ ذاتي قالب بيان ڪن
- ◀ قالب جو جمعي ايتڙ لهن
- ◀ اهو ڄاڻڻ ته ڇا ڏنل قالب ضرب لاءِ موافق آهن
- ◀ ٻن يا ٽن قالبن کي ضرب ڪن
- ◀ ضرب جي لحاظ کان سنگت واري قانون جي تصديق ڪن
- ◀ ورهاست واري قانون جي تصديق ڪن
- ◀ مثال جي مدد سان تصديق ڪريو ته قالب عام طرح سان ضرب جي لحاظ کان مٿا وارو قانون نٿا رکن (يعني ته $AB \neq BA$)
- ◀ ضرب لاءِ ذاتي قالب بيان ڪن
- ◀ چڪاس ڪن ته $(AB)^t = B^t A^t$
- ◀ چورس قالب جو قطعي مله بيان ڪن
- ◀ قالب جي قطعي مله جي قيمت لهن
- ◀ نادر ۽ غير نادر قالبن کي بيان ڪن
- ◀ قالب جا ننڍا قطعي مله ۽ هر جُزا بيان ڪن
- ◀ قالب جو انڊجوائنٽ بيان ڪن
- ◀ هڪ غير نادر قالب A جو ضربِي ايتڙ لهن ۽ تصديق ڪن ته $AA^{-1} = I = A^{-1}A$ جڏهن ته I هڪ ضرب لاءِ ذاتي قالب آهي.
- ◀ هڪ غير نادر قالب جو ضربِي ايتڙ لهن لاءِ انڊجوائنٽ طريقي جو استعمال ڪن
- ◀ ٻن بدلجندڙن ۾ ٻن هڪ درجي مساواتن جي مجموعي کي حل ڪن جيڪو عام زندگي جي مسئلن سان لاڳاپيل هجي.
- ❖ ضربِي ايتڙ قالب وارو طريقو استعمال ڪندي
- ❖ ڪريمر وارو قانون استعمال ڪندي



19.1 قاتبن جو تعارف Introduction to Matrices

قاتبن جو تعلق رياضي جي هڪ شاخ سان آهي جنهن کي خطي الجبرا (linear Algebra) چئبو آهي. انهن جو استعمال خاص طور سان ڪاروبار انجنيئر، فزڪس ۽ ڪمپيوٽر سائنس ۾ ٿئي ٿو. آرٿر ڪيلي (Arther Cayley) (1821-1895) هڪ رياضي دان هو جنهن قاتل جو نظريو پيش ڪيو.

(i) 19.1 قاتل کي حقيقي قمن سان بيان ڪرڻ ۽ ان جي مستطيلي خاڪي جو عام زندگي ۾ اظهار لاءِ تعلق ٺاهڻ.

قاتل، رُڪنن جي هڪ مستطيلي صف بندي آهي ان جا رُڪن علامتي اظهار يا عدد ٿي سگهن ٿا. عام طرح سان قاتل کي انگريزي الف بي جي وڏن حرفن سان ظاهر ڪيو آهي ۽ قاتل جي هر هڪ رُڪن کي ننڍن حرفن سان ظاهر ڪيو آهي. قاتل جا رُڪن [] يا () جي اندر لکبا آهن.

مثال طور:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ يا } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

رُڪن a_{11} ، a_{22} ، ۽ a_{33} وڏي اُريب جا رُڪن آهن ۽ انهن کي اُريبي رُڪن (Diagonal Elements) ڪوٺبو آهي. اچو ته عام زندگي مان قاتل جو هڪ مثال کڻون هيٺين جدول ٽن گهرن جي رهواسين. ٽيليويزن ۽ ڪمپيوٽرن جو تعداد ڏيکاري ٿي.

رهواسي ٽيليويزن ۽ ڪمپيوٽر

1	2	4	A گهر
3	2	6	B گهر
0	1	2	C گهر

مٿين مواد (data) کي قاتل جي شڪل ۾ هن ريت لکي سگهون ٿا:

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 6 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

نوٽ: لفظ "قاتل" جو جمع "قاتل" يا "قاتلن" آهي..

(ii) 19.1 قاتل جي قطارن (Rows) ۽ ڪالمن (Columns) جي باري ۾ ڄاڻڻ:

قاتل ۾ رُڪنن جي افقي ليڪ کي قاتل جي قطار چئبو آهي ۽ قاتل ۾ رُڪنن جي عمودي ليڪ کي قاتل جو ڪالمر چئبو آهي.


مثال طور قاتل $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 & 4 \\ 6 & 3 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ ۾ رُڪنن جون ٻه افقي ليڪون آهن انهي ڪري اهو قاتل ٻه قطارون رکي ٿو. ان ۾ رُڪنن جون چار عمودي ليڪون آهن انهي ڪري اهو قاتل ٻه ڪالمر رکي ٿو.

(iii) 19.1 قاتل جي ترتيب (Order/Size of Matrix):

قاتل جي ترتيب کي ان جي قطارن ۽ ڪالمن جي تعداد سان بيان ڪيو آهي. قاتل جي ترتيب کي $m \times n$ (پڙهيو m باءِ n) سان ظاهر ڪيو آهي جڏهن ته ڏنل قاتل ۾ m قطارن جو تعداد ۽ n ڪالمن جو تعداد آهي.

جيڪڏهن $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 9 \\ 12 & 11 & 35 \end{bmatrix}$ ته پوءِ A جي ترتيب 2×3 آهي.

مثال طور:



(iv) 19.1. ٻن ڦالبن جي برابري (Equality of two matrices):

ٻه ڦال A ۽ B برابر ڦال ڪوٺبا جيڪڏهن انهن جي ترتيب ساڳي هجي ۽ انهن جا مطابقت رکندڙ رڪن برابر هجن علامتي طور اسين هيئن لکنداسين.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 0 & 5 & 3 \end{pmatrix} \text{ ۽ } A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 0 & 5 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{مثال طور:}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \text{ ۽ } P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

ڇاڪاڻ ته انهن جي ترتيب ساڳي نه آهي

19.2 ڦالبن جا قسم (Types of Matrices):

(i) 19.2. قطاري ڦال، ڪالم ڦال، مستطيلي ڦال، چورس ڦال، ٻُڙي ڦال، وحداني ڦال، غير طرفي ڦال، اڀري ڦال، متاسٽا ٿيل ڦال، هم شڪلي ڦال (3×3) ۽ ايتو هم شڪلي ڦال بيان ڪرڻ ۽ انهن جي سڃاڻپ ڪرڻ:

قطاري ڦال (Row Matrix):

اهڙو ڦال جنهن ۾ فقط هڪ قطار هجي ان کي قطاري ڦال چئبو آهي.

مثال طور:

$$[1 \ 4 \ 7] \text{ ۽ } [4 \ 3 \ 8 \ 6] \text{ قطاري ڦال آهن.}$$

ڪالم ڦال (Column matrix):

اهڙو ڦال جنهن ۾ فقط هڪ ڪالم هجي ان کي ڪالم ڦال چئبو آهي.

مثال طور:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ ۽ } \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix} \text{ ڪالم ڦال آهن}$$

مستطيلي ڦال (Rectangular matrix):


اهڙو ڦال جنهن ۾ قطارن جو تعداد، ڪالمن جي تعداد جي برابر نه هجي ته ان کي مستطيلي ڦال چئبو آهي.
يعني $m \neq n$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ مستطيلي ڦال آهن} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 9 \\ 1 & -7 & 10 \end{bmatrix}; \quad A = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{مثال طور:}$$

چورس ڦال (Square Matrix):

اهڙو ڦال جنهن ۾ قطارن جو تعداد، ڪالمن جي تعداد جي برابر هجي ان کي چورس ڦال چئبو آهي.
يعني $m = n$

$$C = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \\ a & b & c & 1 \\ p & q & r & 1 \\ m & n & o & 1 \end{bmatrix} \text{ چورس ڦال آهن} \quad B = \begin{bmatrix} 9 & 5 & 2 \\ 1 & 8 & 5 \\ 3 & 1 & 6 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$



ٻڙي قالب (Zero/null matrix):

ٻڙي قالب هڪ اهڙو قالب هوندو آهي جنهن جو هر هڪ رُڪن ٻڙي هجي. اهو عام طرح سان وڏي حرف "O" سان ظاهر ڪيو آهي ٻڙي قالب جا ڪجهه مثال هيٺ ڏنل آهن.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ ۽ } \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ايريبي قالب (Diagonal matrix):

هڪ چورس قالب کي ايريبي قالب ڪوٺيو جيڪڏهن گهٽ ۾ گهٽ هڪ ايريبي رُڪن کانسواءِ سڀ رُڪن ٻڙي هجن.

مثال طور:

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ ۽ } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

غير طرفي قالب (Scalar Matrix):

اهڙو ايريبي قالب جنهن جا سڀ ايريبي ڪارڪن ساڳيا هجن. ان کي غير طرفي قالب چئبو آهي.

$$C = \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix} \text{ ۽ } B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

وحداني قالب (Identity/unit matrix):

اهڙو ايريبي قالب جنهن جو هر هڪ ايريبي رُڪن 1 هجي. ان کي وحداني قالب ڪوٺيو آهي. عام طرح سان ان کي وڏي حرف "I" سان ظاهر ڪيو آهي.

مثال طور:

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ ۽ } I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

مٽا سٽا ٿيل قالب (Transpose of a matrix):

ڪنهن ڏنل قالب جي قطارن کي ڪالمن ۾ يا ڪالمن کي قطارن ۾ بدلائڻ سان حاصل ٿيل قالب کي اصل قالب جو مٽا سٽا ٿيل قالب ڪوٺيو آهي جيڪڏهن ڏنل قالب A آهي ته مٽا سٽا ٿيل قالب کي A^t سان ظاهر ڪيو آهي.

مثال طور:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} \text{ جو مٽا سٽا ٿيل قالب } \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 6 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \text{ آهي.}$$

همشڪلي قالب (Symmetric Matrix):


هڪ چورس قالب کي همشڪلي قالب ڪوٺيو جيڪڏهن ان جو مٽا سٽا ٿيل قالب به ان ڏنل قالب جي برابر

هجي. يعني ته $A^t = A$.

مثال طور:

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 17 \\ 2 & 5 & -11 \\ 17 & -11 & 9 \end{bmatrix} \text{ جيڪڏهن } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 17 \\ 2 & 5 & -11 \\ 17 & -11 & 9 \end{bmatrix} \text{ ته پوءِ.}$$

جيئن ته $A^t = A$ تنهنڪري A هڪ همشڪلي قالب آهي.



اُبتو همشڪلي قالب (Skew-symmetric matrix):

هڪ چورس قالب کي اُبتو همشڪلي قالب ڪوٺيو جيڪڏهن ان جو مٽاسٽائيل قالب ان ڏنل قالب جو منفي هجي. يعني $A^t = -A$

مثال طور:

$$-A = A^t = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -4 \\ 3 & 0 & -7 \\ 4 & 7 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{جيڪڏهن} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ -3 & 0 & 7 \\ -4 & -7 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{تہ پوءِ}$$

جيئن ته $A^t = -A$ تنهنڪري A اُبتو همشڪلي قالب آهي.

19.3. قالبن جي جوڙ ۽ ڪٽ (Addition and Subtraction of Matrices):

(i) 19.3. اهو ڄاڻڻ ته ڇا ڏنل قالب جوڙ ۽ ڪٽ لاءِ موافق (Conformable) آهن:

جيڪڏهن ٻن قالبن A ۽ B جي ترتيب ساڳي آهي ته پوءِ اهي جوڙ ۽ ڪٽ لاءِ موافق آهن

مثال طور:

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{۽} \quad \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

(ii) 19.3. حقيقي عدد سان قالب جي غير طرفي ضرب (Scalar multiplication of a matrix by a real numbers):

ڪنهن قالب جي غير طرفي ضرب جو مطلب آهي ته ڏنل قالب ۽ حقيقي عدد جي ضرب اُپت، غير طرفي ضرب ۾ قالب جو هر هڪ رُڪن ڏنل غير طرفي مقدار (Scalar) سان ضرب ٿيندو آهي. جيڪڏهن c غير طرفي مقدار ۽ A هڪ قالب آهي ته پوءِ قالب جي غير طرفي ضرب کي cA سان ظاهر ڪيو آهي.

مثال طور:

$$cA = -5 \begin{pmatrix} 0 & -1 & 5 \\ -3 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{جيڪڏهن} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 5 \\ -3 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{۽} \quad c = -5 \quad \text{تہ پوءِ}$$

$$cA = \begin{pmatrix} 0 & 5 & -25 \\ 15 & -10 & -5 \\ -10 & 0 & 20 \end{pmatrix} \quad \text{يعني}$$

(iii) 19.3. قالبن کي جوڙ ۽ ڪٽ ڪرڻ (Add and Subtract Matrices):

ٻن قالبن A ۽ B کي جوڙ يا ڪٽ ڪرڻ لاءِ انهن جا واسطيدار رُڪن جوڙ يا ڪٽ ڪبا آهن

مثال طور:

$$A+B = \begin{pmatrix} 2+1 & 5+4 \\ -1+3 & 3+7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 10 \end{pmatrix} \quad \text{جيڪڏهن} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \quad \text{۽} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{تہ پوءِ}$$

ڪٽ لاءِ


$$P-Q = \begin{pmatrix} 1-10 & 0-4 & 2-2 \\ 4-2 & 6-7 & 1-1 \\ -2-1 & 9-9 & 0-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & -4 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 0 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{جيڪڏهن} \quad Q = \begin{pmatrix} 10 & 4 & 2 \\ 2 & 7 & 1 \\ 1 & 9 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{۽} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 6 & 1 \\ -2 & 9 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{تہ پوءِ}$$

(iv) 19.3. جوڙ جي لحاظ کان مٽا ۽ سنگت واري قانونن جي چڪاس ڪرڻ:

جوڙ جي لحاظ کان مٽا وارو قانون:

جيڪڏهن A ۽ B ساڳي ترتيب وارا ٻه قالب آهن ته پوءِ جوڙ جي لحاظ کان مٽا وارو قانون هن ريت آهي:

$$A+B = B+A$$



مثال: جوڙ جي لحاظ کان مٿا واري قانون جي چڪاس ڪريو

$$B = \begin{pmatrix} 10 & 4 & 2 \\ 2 & 7 & 1 \\ 1 & 9 & 4 \end{pmatrix} \text{ ۽ } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 6 & 1 \\ -2 & 9 & 0 \end{pmatrix} \text{ جيڪڏهن}$$

هتي

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+10 & 0+4 & 2+2 \\ 4+2 & 6+7 & 1+1 \\ -2+1 & 9+9 & 0+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 4 & 4 \\ 6 & 13 & 2 \\ -1 & 18 & 4 \end{pmatrix}$$

هاڻي

$$B + A = \begin{pmatrix} 10+1 & 4+0 & 2+2 \\ 2+4 & 7+6 & 1+1 \\ 1-2 & 9+9 & 4+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 4 & 4 \\ 6 & 13 & 2 \\ -1 & 18 & 4 \end{pmatrix}$$

جيئن ته $A + B = B + A$ تنهنڪري جوڙ جي لحاظ کان مٿا واري قانون جي چڪاس ٿي.

جوڙ جي لحاظ کان سنگت وارو قانون (Associative law w.r.t addition):

جيڪڏهن A, B, C ساڳي ترتيب وارا ڪي ٽي قالب آهن ته پوءِ جوڙ جي لحاظ کان مٿا وارو قانون هن ريت

$$(A+B) + C = A + (B+C) \text{ آهي}$$

مثال: جوڙ جي لحاظ کان سنگت واري قانون جي تصديق ڪريو

$$C = \begin{pmatrix} 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix} \text{ ۽ } B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ جيڪڏهن}$$

هتي

$$(A+B) + C = \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \right] + \begin{pmatrix} 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (A+B) + C = \begin{pmatrix} 15 & 18 \\ 21 & 24 \end{pmatrix}$$

هاڻي

$$A + (B+C) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \left[\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 14 & 16 \\ 18 & 20 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A + (B+C) = \begin{pmatrix} 15 & 18 \\ 21 & 24 \end{pmatrix}$$


$$(A+B) + C = A + (B+C) \text{ جيئن ته}$$

تنهنڪري جوڙ جي لحاظ کان سنگت واري قانون جي تصديق ٿي

19.3.(v) هڪ قالب جو جوڙ لاءِ ذاتي قالب (Additive Identity) بيان ڪرڻ

جيڪڏهن A ۽ O ٻه ساڳي ترتيب وارا قالب آهن ۽ $A + O = A = O + A$ هتي O بڙي قالب آهي ۽ ان

ڪي قالب A جو جوڙ لاءِ ذاتي قالب چئبو آهي.



19.3.(vi) قالب جو جمعي ايتڙ لھڻ (Additive inverse of a matrix):

جيڪڏهن A ۽ B ٻه ساڳئي ترتيب وارا قالب آهن اهڙي طرح جو $A + B = O = B + A$ ته پوءِ A ۽ B جي هڪٻئي جو جمعي ايتڙ چئبو قالب A جي جمعي ايتڙ کي $-A$ سان ظاهر ڪبو آهي.

مثال طور:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 6 & 1 \\ -2 & 9 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{جيڪڏهن}$$

ته پوءِ

$$-A = -\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 6 & 1 \\ -2 & 9 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ -4 & -6 & -1 \\ 2 & -9 & 0 \end{pmatrix}$$

19.4. قالبن جي ضرب (2 ٻاءِ 2 تائين)

(i) 19.4. اهو ڄاڻڻ ته ڇا ڏنل قالب ضرب لاءِ موافق آهن.

ٻه قالب A ۽ B ضرب لاءِ موافق ڪوٺبا جيڪڏهن پهرين قالب جي ڪالمن جو تعداد ٻئي قالب جي قطارن جي تعداد جي برابر هجي

مثال طور:

$$\begin{bmatrix} 4 & -7 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \quad \text{۽} \quad \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}$$

(ii) 19.4. ٻن يا ٽن قالبن کي ضرب ڪرڻ:

جيڪڏهن ٻه قالب ضرب لاءِ موافق آهن ته پوءِ ضرب آپت AB جو رُڪن a_{ij} حاصل ڪرڻ لاءِ i هين قطار (i^{th} row) ۽ j هون ڪالمر جي واسطيدار رُڪنن کي ضرب ڪبو آهي.

مثال 1:

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \quad \text{۽} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{جيڪڏهن}$$

حل:

هتي AB ممڪن آهي ڇو جو A جي ڪالمن جو تعداد ۽ B جي قطارن جو تعداد برابر آهي جيڪو 2 آهي.

هاڻي

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow AB &= \begin{bmatrix} 1(0)+2(6) & 1(-1)+2(7) \\ 3(0)+4(6) & 3(-1)+4(7) \end{bmatrix} \\ \Rightarrow AB &= \begin{bmatrix} 0+12 & -1+14 \\ 0+24 & -3+28 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 24 & 25 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow AB &= \begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 24 & 25 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



مثال 2:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \text{ ضرب لھو:}$$

حل:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4+12 & 5+0 \\ 8+16 & 10+0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 16 & 5 \\ 24 & 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 96+25 & 128+5 \\ 144+50 & 192+10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 121 & 133 \\ 194 & 202 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(iii) 19.4. ضرب جي لحاظ کان سنگت واري قانون جي تصديق ڪرڻ:

جيڪڏهن A ، B ۽ C ڪي به ٽي ضرب لاءِ موافق قالب آهن ته پوءِ ضرب جي لحاظ کان سنگت وارو قانون هن ريت آهي: $(AB)C = A(BC)$

مثال: ضرب جي لحاظ کان سنگت واري قانون جي تصديق ڪريو جيڪڏهن

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ ۽ } B = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

تصديق:

$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= (AB)C \\ &= \left(\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 13 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 11 & 36 \\ -5 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{R.H.S} &= A(BC) \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ -2 & 24 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 11 & 36 \\ -5 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

جڏهن ته $\text{L.H.S} = \text{R.H.S}$


تنهنڪري ضرب جي لحاظ کان سنگت واري قانون جي تصديق ٿي.

(iv) 19.4. ورهاست واري قانونن جي تصديق ڪرڻ (Distributive Laws):

جيڪڏهن A ، B ۽ C ڪي به ٽي ضرب ۽ جوڙ جي لحاظ کان موافق قالب آهن ته پوءِ ورهاست وارا قانون هن ريت آهن

$$A(B+C) = AB + AC \quad (\text{i}) \quad (\text{ڪاپو ورهاست وارو قانون})$$

$$(B+C)A = BA + CA \quad (\text{ii}) \quad (\text{ساڄو ورهاست وارو قانون})$$



مثال: جيڪڏهن $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ۽ $C = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ته پوءِ هيٺين جي تصديق ڪريو

(i) $A(B+C) = AB + AC$ (ii) $(B+C)A = BA + CA$

تصديق:

$$\begin{aligned} \text{L.H.S.} &= A(B+C) & \text{R.H.S.} &= AB + AC \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

جيئن ته $LHS = RHS$

تنهنڪري $A(B+C) = AB + AC$ انهي ڪري تصديق ٿي.

ساڳي طريقي سان $(B+C)A = BA + CA$ جي به تصديق ٿيندي.

19.4. (v) مثال جي مدد سان تصديق ڪريو ته قالب عام طرح سان ضرب جي لحاظ کان مٿا وارو قانون نٿا رکن $AB \neq BA$.

مثال:

فرض ڪريو $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ ۽ $B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ ته پوءِ تصديق ڪريو ته $AB \neq BA$

تصديق:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow AB &= \begin{bmatrix} -5+6 & 10-4 \\ 2-3 & -4+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

هاڻي

$$\begin{aligned} BA &= \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow BA &= \begin{bmatrix} -5-4 & -2-2 \\ 15+4 & 6+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 & -4 \\ 19 & 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

جيئن ته $AB \neq BA$

تنهنڪري تصديق ٿي ته عام طرح سان ضرب جي لحاظ کان مٿا وارو قانون ٽنهي تي لاڳو نٿو ٿئي.

19.4. (vi) ضرب لاءِ ذاتي قالب (Multiplicative Identity) کي بيان ڪرڻ:

فرض ڪريو ته A ترتيب n وارو هڪ چورس قالب آهي ته پوءِ وحداني قالب I کي ضرب لاءِ ذاتي قالب

چئبو آهي ۽ $A I_n = A$ يا $I_n A = A$



مثال 1: فرض کریو تہ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ تصدیق کریو $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ضرب لاء ذاتی قالب آھی.

حل:
ہتی

$$AI_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = A$$

$$I_2A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = A.$$

جئین تہ $AI_2 = I_2A$

تنہکری I_2 ضرب لاء ذاتی قالب آھی

19.4(vii) چکاس کریو تہ $(AB)^t = B^tA^t$

مثال: جیکڈھن $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ۽ $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ چکاس کریو تہ $(AB)^t = B^tA^t$

چکاس:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 11 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (AB)^t = \begin{bmatrix} 5 & 11 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}.$$

ہاٹی

$$B^tA^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 11 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$$


جئین تہ $(AB)^t = B^tA^t$
انہی کری چکاس تی

مثال 2:

جیکڈھن $A = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 2 \\ 4 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}$ ۽ $B = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 0 \\ 5 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix}$ تصدیق کریو تہ $AB^t = B^tA^t$

تصدیق:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 6 & 5 & 2 \\ 4 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 8 & 0 \\ 5 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 36+25+6 & 48+5+12 & 0+10+8 \\ 24+30+9 & 32+6+18 & 0+12+12 \\ 0+5+21 & 0+1+42 & 0+2+28 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 67 & 65 & 18 \\ 63 & 56 & 24 \\ 26 & 43 & 30 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



$$(AB)^t = \begin{pmatrix} 67 & 65 & 18 \\ 63 & 56 & 24 \\ 26 & 43 & 30 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 67 & 63 & 26 \\ 65 & 56 & 43 \\ 18 & 24 & 30 \end{pmatrix}$$

هاڻي

$$B^t A^t = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 0 \\ 5 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix}^t \cdot \begin{pmatrix} 6 & 5 & 2 \\ 4 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}^t$$

$$= \begin{pmatrix} 6 & 5 & 3 \\ 8 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 4 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 36+25+6 & 24+30+9 & 0+5+21 \\ 48+5+12 & 32+6+18 & 0+1+42 \\ 0+10+8 & 0+12+12 & 0+2+28 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 67 & 63 & 26 \\ 65 & 56 & 43 \\ 18 & 24 & 30 \end{pmatrix}$$

$$(AB)^t = B^t A^t$$

انهي ڪري تصديق ٿي

مشق 19.1

1. هيٺين ڦالبن مان هر هڪ جو قسم لکو.


(i). $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ (ii). $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ (iii). $[-2 \ 0]$ (iv). $\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ (v). $\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$

2. هيٺ ڏنل هر هڪ ڦال جي ترتيب لکو

(i). $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 2 \end{bmatrix}$ (ii). $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ (iii). $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ (iv). $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ (v). $[0]$

3. چڪاس ڪريو ته ڇا هيٺيان ڦال همشڪلي يا اُبتا همشڪلي ڦال آهن.

(i). $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ (ii). $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 0 \end{bmatrix}$ (iii). $\begin{bmatrix} 1 & 7 & 3 \\ 7 & 4 & -5 \\ 3 & -5 & 6 \end{bmatrix}$ (iv). $\begin{bmatrix} 0 & -6 & 4 \\ -6 & 0 & 7 \\ 4 & 7 & 0 \end{bmatrix}$



4. جيڪڏهن $E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ۽ $D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ته هيٺيان لھو جيڪڏهن ممڪن هجي

- (i) $A + C$ (ii) $A + E$ (iii) $B - D$ (iv) $2B + 3A$
(v) $B - C$ (vi) A^2 (vii) B^2 (viii) $D + E$

5. جيڪڏهن $B = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ ۽ $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ ته هيٺيان لھو

- (i) $A + B$ (ii) $A - B$ (iii) $3A + 2B$
(iv) AB (v) BA (vi) A^2

6. تصديق ڪريو ته (i) $A + B = B + A$ (ii) $C - D \neq D - C$

جيڪڏهن $D = \begin{bmatrix} 2 & 7 & -5 \\ -2 & 1 & 0 \\ 6 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ ۽ $C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 4 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -7 & 4 \end{bmatrix}$

7. ثابت ڪري ڏيکاريو $AB \neq BA$ جڏهن ته $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 2 & 5 & 7 \\ 0 & -4 & 3 \end{bmatrix}$ ۽ $A = \begin{bmatrix} 8 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

8. جيڪڏهن $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -7 & 4 \end{bmatrix}$ ۽ $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$ ته پوءِ $2A - 3B + 4C$ جو ملهه لھو


9. جيڪڏهن $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ته پوءِ a, b, c, d جو ملهه لھو

10. جيڪڏهن $\begin{bmatrix} x & -1 & y \\ 2 & 0 & 3 \\ z & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & a & x \\ b & 0 & c \\ 2 & 3 & d \end{bmatrix}$ ته پوءِ a, b, c, d, x, y, z جي قيمت لھو

11. هيٺين قالبن لاءِ ممڪن ضرب اُپتون لھو

$C = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & -4 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ ۽ $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

12. ضرب اُپت لھو: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$



13. جيڪڏهن $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ ۽ $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

تہ پوءِ تصديق ڪريو تہ: (i) $A(B+C) = AB+AC$ (ii) $(B+C)A = BA+CA$

14. جيڪڏهن $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ ۽ $B = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 0 \\ 5 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 2 \\ 4 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}$

(a) $A+B=B+A$ (b) $(A+B)+C=A+(B+C)$
(c) $(A+B)C=AC+BC$ (d) $A(B+C)=AB+AC$

15. جيڪڏهن $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ ۽ $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

$A(BC) = (AB)C$

19.5. قالب جو قطعي ملهه (Determinant of a Matrix):

19.5.(i) قالب جو قطعي ملهه (Determinant of a Matrix) بيان ڪرڻ:

اسين R تي، هر هڪ چورس قالب A سان هڪ عدد $|A|$ ملائي سگهون ٿا. ان عدد کي قالب A جو قطعي ملهه چئبو آهي.

جيڪڏهن $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ته پوءِ A جي قطعي ملهه کي $|A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ سان ظاهر ڪبو آهي.

19.5.(ii) قالب جي قطعي ملهه جي قيمت لھڻ:

ڪنهن به 2×2 قالب $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ لاءِ $|A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ هتي $ad - bc$ کي قالب جي قطعي ملهه جي قيمت چئبو آهي.

مثال طور:


$$\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = 3 \times (-4) - 7 \times 1 = -19$$

هيٺين فارمولي کي ليبنيز فارمولو (Leibniz formula) يا ليپلاسيئن پکيڙ (Laplacian expansion) چئبو آهي

جيڪڏهن $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ ته پوءِ

$$|A| = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

نوٽ: هن طريقي سان قالب جي قطعي ملهه جي قيمت لھڻ R_1 سان پکيڙ آهي



مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 5 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & 5 & 2 \end{bmatrix} \quad |A| \text{ جي قيمت لھو جيڪڏھن}$$

حل: $|A|$ جي قيمت لھڻ لاءِ اچو ته قطعي مُلھ کي R_1 سان ڪوليون

$$|A| = 4 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow |A| = 4(0 - 15) + 3(2 + 3) + 5(5 + 0) = -20.$$

نوٽ: قالب جي قطعي مُلھ جي قيمت مخصوص ھوندي آھي.

(iii) 19.5. نادر ۽ غير نادر قابطن (Singular and non-singular matrices) کي بيان ڪرڻ:

قالب A کي نادر ڪوئو جيڪڏھن ان جي قطعي مُلھ جي قيمت ٻڙي ھجي يعني ته $|A| = 0$
 قالب A کي غير نادر ڪوئو جيڪڏھن ان جي قطعي مُلھ جي قيمت ٻڙي جي برابر نه ھجي يعني ته $|A| \neq 0$

نوٽ: ھڪ نادر قالب کي غير اُبتو ٿيندڙ (Non-invertible matrix)، قالب پڻ چئبو آھي. غير نادر قالب کي اُبتو ٿيندڙ قالب پڻ چئبو آھي

مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 2 & 0 & 2 \\ 6 & 8 & 14 \end{bmatrix} \quad \text{چا ھڪ نادر قالب آھي يا نه فيصلو ڪيو ته}$$

حل:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 2 & 0 & 2 \\ 6 & 8 & 14 \end{vmatrix} = 2(0 - 16) - 4(28 - 12) + 6(16 - 0) = -32 - 64 + 96 = 0.$$

$$|A| = 0 \quad \text{جيئن ته}$$

تنھنڪري A ھڪ نادر قالب آھي.

(iv) 19.5. قالب جا ننڍا قطعي مُلھ ۽ ھم جُزا (Minors and Cofactors) بيان ڪرڻ:

فرض ڪريو ته A ھڪ 3×3 ترتيب/جو چورس قالب آھي ته پوءِ ھڪ رُڪن a_{ij} جو ننڍو قطعي مُلھ کي M_{ij} سان ظاھر ڪيو آھي. جيڪو اھڙي قالب جو قطعي مُلھ آھي جيڪو i^{th} قطار ۽ j^{th} ڪالم ڪڍي ڇڏڻ سان حاصل ٿيندو آھي.


مثال طور:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \text{ته پوءِ پھرين قطار ۽ ٻيون ڪالم ڪڍي ڇڏڻ سان}$$

$$\begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

قالب حاصل ٿيندو ۽ ان جي قطعي مُلھ کي ننڍو قطعي مُلھ M_{12} چئبو ۽ ھن ريت لکبو $M_{12} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

جڏھن ته رُڪن a_{ij} جو ھم جزو جيڪو A_{ij} سان ظاھر ڪيو آھي، اھو ھن ريت لھبو: $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$
 ھتي M_{ij} چورس قالب A جي رُڪن a_{ij} جو ننڍو قطعي مُلھ آھي.



مثال: جيڪڏهن $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{bmatrix}$ ته پوءِ M_{12} ۽ A_{12} لھو

حل: هتي $M_{12} = \begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 1 & -7 \end{vmatrix} = 6(-7) - 4(1) = -46$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}, \quad \text{۽}$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} \quad \text{تنهنڪري}$$

$$A_{12} = (-1)^3 (-46)$$

$$A_{12} = (-1)(-46) = 46.$$

19.6. قالب جو ضربِي اُٻَٽَ (Multiplicative Inverse of a Matrix):

19.6. (i) قالب جو اُٻَٽَ جوائنٽ بيان ڪرڻ (Adjoint of a matrix):

2×2 ترتيب واري قالب جو اُٻَٽَ جوائنٽ

فرض ڪريو A هڪ چورس قالب آهي. A جي هر جُزن واري قالب جو مٿا سٽا ٿيل قالب تي A جو اُٻَٽَ جوائنٽ ڪوٺبو

جيڪڏهن $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ته پوءِ قالب A جي اُٻَٽَ جوائنٽ کي $\text{Adj}(A)$ يا $\text{adj}(A)$ سان ظاهر ڪبو آهي.

$$\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad \text{۽}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \text{جيڪڏهن هڪ قالب آهي}$$

$$\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}^t \quad \text{ته پوءِ}$$

جڏهن ته $A_{11}, A_{12}, A_{13}, A_{21}, A_{22}, A_{23}, A_{31}, A_{32}, A_{33}$ قالب A جا هر جُزا آهن.


مثال: جيڪڏهن $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ ته پوءِ قالب A جو اُٻَٽَ جوائنٽ لھو

حل: سڀ کان اڳ ۾، اسين قالب A جا سمورا هر جُزا لھنداسين.

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 2$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6$$



$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -5$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = -2$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -8$$

هاڻي

$$\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}'$$

$$\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 6 \\ -1 & -2 & -5 \\ -2 & -2 & -8 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \\ 6 & -5 & -8 \end{bmatrix}$$

19.6. (ii) هڪ غير نادر قالب A جو ضربِي اُبتَر ۽ تصديق ڪرڻ ته $AA^{-1} = I = A^{-1}A$ جڏهن ته I هڪ ضرب لاءِ ذاتي قالب آهي.

جيڪڏهن A ۽ B ، $n \times n$ ترتيب جا ٻه قالب آهن اهڙي طرح جو $AB = BA = I_n$ ته پوءِ A ۽ B هڪ ٻئي جا ضربِي اُبتَر ڪوٺبا. قالب A جي ضربِي اُبتَر کي A^{-1} سان ظاهر ڪبو آهي.

مثال:

$$\text{چڪاس ڪيو ته ڇا } A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \text{ ۽ } B = \begin{bmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \text{ هڪ ٻئي جا ضربِي اُبتَر آهن}$$

حل:


$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15-14 & -21+21 \\ 10-10 & -14+15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ساڳي ريت

$$BA = \begin{bmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15-14 & 35-35 \\ -6+6 & -14+15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

جيئن ته $AB = BA = I_2$

تنهنڪري A ۽ B هڪٻئي جا ضربِي اُبتَر آهن.
چڪاس ٿي.



(iii) 19.6. هڪ غير نادر قالب جو ضربِي اُبتَر لَهڻ لاءِ ائڊجوائنٽ طريقي جو استعمال ڪرڻ

فرض ڪريو $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ هڪ غير نادر قالب آهي ته پوءِ A^{-1} هن ريت معلوم ڪبو:

$$|A| \neq 0 \text{ جڏهن ته } A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A)}{|A|}$$

ضربي اُبتَر لَهڻ جو هي طريقو ائڊجوائنٽ طريقو ڪوٺبو آهي

مثال 1:

ائڊجوائنٽ واري طريقي سان قالب $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ جو ضربِي اُبتَر لَهو

حل:

هتي $|A| = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 2$ جيئن ته $|A| \neq 0$ تنهنڪري A جو ضربِي اُبتَر وجود رکي ٿو

$$\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} \text{ هاڻي}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -2 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \text{ ۽}$$

مثال 2:

ائڊجوائنٽ واري طريقي سان قالب $A = \begin{bmatrix} 9 & 2 & 1 \\ 5 & -1 & 6 \\ 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ جو ضربِي اُبتَر لَهو

حل:

هتي

$$|A| = \begin{vmatrix} 9 & 2 & 1 \\ 5 & -1 & 6 \\ 4 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 9(2-0) - 2(-10-24) + 1(0+4)$$

$$= 18 + 68 + 4$$

$$= 90.$$


جيئن ته $|A| \neq 0$,

تنهنڪري A^{-1} وجود رکي ٿو.

هاڻي اسين سمورا هم جُزا لهنداسين

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -6 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 2 - 0 = 2$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -(-10-24) = 34$$



$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 4 = 4$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -(-4 - 0) = 4$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 9 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = (-18 - 4) = -22$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 9 & 2 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = -(0 - 8) = 8$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 6 \end{vmatrix} = 12 + 1 = 13$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 9 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -(54 - 5) = -49$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 9 & 2 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = -9 - 10 = -19$$

$$\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 13 \\ 34 & -22 & -49 \\ 4 & 8 & -19 \end{bmatrix} \quad \text{انهي ڪريءَ} \quad \text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}^t \quad \text{هاڻي}$$

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A)}{|A|} \quad \text{هاڻي}$$


$$A^{-1} = \frac{1}{90} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 13 \\ 34 & -22 & -49 \\ 4 & 8 & -19 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{45} & \frac{2}{45} & \frac{13}{90} \\ \frac{17}{45} & \frac{-11}{45} & \frac{-49}{90} \\ \frac{2}{45} & \frac{4}{45} & \frac{-19}{90} \end{bmatrix}$$

19.6. (iv) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ جي چڪاس ڪرڻ:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \quad \text{جيڪڏهن} \quad B = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{۽} \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{تہ پوءِ چڪاس ڪريو تہ}$$

حل:

$$B = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{۽} \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{ڏنل آهي تہ}$$



B جو ضربی اُبتَر

$$B = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} \text{ اسان وٽ آهي ته}$$

هاڻي

$$|B| = 54 - 56 = -2$$

جيئن ته $|B| \neq 0$,

تنهنڪري B^{-1} وجود رکي ٿو

$$B^{-1} = \frac{\text{adj } B}{|B|} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 9 & -8 \\ -7 & 6 \end{bmatrix}$$

هاڻي

$$B^{-1}A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 9 & -8 \\ -7 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 45 + 16 & -63 - 24 \\ -35 - 12 & 49 + 18 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1}A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 61 & -87 \\ -47 & 67 \end{bmatrix} \dots (ii)$$

مساوات (i) ۽ (ii) مان اسانکي مليو

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

انهي ڪري چڪاس ٿي.

AB جو ضربی اُبتَر

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 18 + 49 & 24 + 63 \\ 12 + 35 & 16 + 45 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 67 & 87 \\ 47 & 61 \end{bmatrix}$$

$$|AB| = 4087 - 4089 = -2 \text{ هاڻي}$$

جيئن ته $|AB| \neq 0$

تنهنڪري $(AB)^{-1}$ وجود رکي ٿو

هاڻي

$$(AB)^{-1} = \frac{\text{adj } (AB)}{|AB|}$$

$$= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 61 & -87 \\ -47 & 67 \end{bmatrix} \dots (i)$$

A جو ضربی اُبتَر

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \text{ اسان وٽ آهي ته}$$

$$|A| = 15 - 14 = 1$$

جيئن ته $|A| \neq 0$

تنهنڪري A^{-1} وجود رکي ٿو

$$A^{-1} = \frac{\text{adj } A}{|A|} = \begin{bmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

19.7 هڪ درجي همزاد مساواتن جو حل (Solution of Simultaneous Linear Equations):

ٻن بدلجندڙن وارين ٻن هڪ درجي مساواتن جي مجموعي (System) تي غور ڪريو جيڪو هيٺ ڏنل آهي

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \dots (I)$$

هي مجموعو هن ريت لکي سگهجي ٿو

$$AX = B \dots (II)$$

$$B = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \text{ ۽ } X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \text{ جڏهن ته}$$

قالب A کي عددي منڍن جو قالب چئبو جڏهن ته قالب X کي بدلجندڙن جو ڪالمي قالب ۽ B کي مستقل مقدارن جو ڪالمي قالب چئبو آهي.

هڪ ترتيببي جوڙو (x, y) ڏنل مجموعي جو حل ڪوٺبو ۽ اهو مساواتن وارو مجموعو ٻنهي قيمتن سان صحيح ٿيندو. اهڙا سڀ حل ملي هڪ درجي همزاد مساواتن جي مجموعي جو حل سيٽ ٺاهن ٿا.



(i) 19.7. ٻن بدلدنڌڻن ۾ ٻن هڪ درجي مساواتن جي مجموعي کي حل ڪرڻ جيڪو عام زندگي جي مسئلن سان لاڳاپيل هجي ضربِي اُبتڙ قالب وارو طريقو

هڪ قالبن واري هڪ مساوات کڻو جيڪا سيڪشن 19.7 ۾ زير غور هئي.

$$AX = B, \quad \dots (i) \quad \text{يعني ته}$$

هتي A هڪ چورس ۽ غير نادر قالب آهي مساوات (i) جي ٻنهي پاسن کي A سان ضرب ڪندي، اسان کي مليو:

$$A^{-1}(AX) = A^{-1}B$$

$$\Rightarrow (A^{-1}A)X = A^{-1}B$$

$$\Rightarrow X = A^{-1}B \quad \dots (ii)$$

بدلدنڌڻن جي ڪالمي قالب کي لهڻ لاءِ اسين مساوات (ii) کي استعمال ڪنداسين ۽ ان طريقي کي ضربِي اُبتڙ وارو طريقو ڪوٺبو آهي

مثال 1: ضربِي اُبتڙ وارو طريقو استعمال ڪندي، هڪ درجي مساواتن جو هيٺيون مجموعو حل ڪريو

$$5x + 2y = 3$$

$$3x + 2y = 5$$

حل: ڏنل مجموعي کي قالبِي شڪل ۾ لکندي

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$AX = B \quad \text{يعني}$$

$$B = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ ۽ } X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{جڏهن ته}$$


اڻڊجوائنٽ جو استعمال ڪندي پهريان اسين A^{-1} لهنداسين

$$A^{-1} = \frac{Adj(A)}{|A|} = \frac{\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}}{10 - 6} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$$

هاڻي ضربِي اُبتڙ واري طريقي سان

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 6 - 10 \\ -9 + 25 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -4 \\ 16 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \text{يا} \end{aligned}$$

$$\{(-1, 4)\} = \text{حل آهي يعني حل سيٽ}$$



مثال 2: هڪ سول انجنيئر کي ڪنهن اڏاوتي منصوبي لاءِ 6000 ڪعب ميٽر واري ۽ 9000 ڪعب ميٽر ٿلهي ٿلهي پٿري ڪپي. ٻن ڪڏن مان اهي شيون حاصل ٿي سگهن ٿيون. جن جو تفصيل هيٺين جدول ۾ ڏيکاريل آهي.

	واري	ٿلهي پٿري
I - ڪڏ	3	8
II - ڪڏ	4	11

ضربي اُبتڙ وارو طريقو استعمال ڪندي انهن شين جي مقدار لھو جيڪي انجنيئر جي ضرورت پوري ڪرڻ لاءِ هر هڪ ڪڏ مان ڪٽي اچيون

حل: فرض ڪريو ته x واري ۽ y ٿلهي پٿري جي مقدار کي ظاهر ڪن ٿا.

ضربي اُبتڙ واري طريقي موجب: $X = A^{-1}B \quad \dots (i)$

ڏنل مواد کي قالبِي شڪل ۾ لکندي

$$AX = B$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 4 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6000 \\ 9000 \end{bmatrix} \quad \text{يا}$$

اسان کي اڳ ۾ ائڊجوائنٽ فارمولي ذريعي A^{-1} لھڻ جي ضرورت آهي.

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A)}{|A|} = \frac{\begin{bmatrix} 11 & -8 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}}{3(11) - 8(4)} = \begin{bmatrix} 11 & -8 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 11 & -8 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{تنهنڪري}$$

هاڻي مساوات (i) مان، اسان وٽ آهي

$$X = A^{-1}B$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & -8 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6000 \\ 9000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6000 \\ 3000 \end{bmatrix}$$

ڪاٿو نشاني کي نظر انداز ڪندي اسان وٽ آهي $x = 6000$ ۽ $y = 3000$

انهي ڪري 6000 ڪعب ميٽر واري ۽ 3000 ڪعب ميٽر ٿلهي پٿري ڪٽي اچي.

(ii) 19.2. Cramer's rule):

هڪ درجي مساواتن جي مجموعي کي حل ڪرڻ وارن طريقن مان هڪ طريقو ڪريمر جو قانون آهي اچو ته ٻن بدلجندڙن x ۽ y ۾ هڪ درجي مساواتن جي مجموعي تي غور ڪريون جيڪو هن ريت لکيل آهي:


$$a_1x + b_1y = c_1 \quad \dots (i)$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

مجموعي (i) کي قالبِي شڪل ۾ هيٺئن لکبو.

$$AX = B,$$

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$



جڏهن ته $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ ، $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ۽ $B = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$ مجموعي (i) کي فقط هڪ ئي حل هوندو جيڪڏهن $|A| \neq 0$

$$y = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} \quad \text{۽} \quad x = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

جيڪو هن ريت حاصل ڪري سگهجي ٿو

$$A_2 = \begin{bmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{bmatrix} \quad \text{۽} \quad A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{bmatrix}$$

جڏهن ته

مثال: ڪريمر جو قانون استعمال ڪندي ڏنل مجموعي کي حل ڪريو.

$$3x + 2y = 10$$

$$-6x + 4y = 4$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -6 & 4 \end{vmatrix} \quad \text{هتي}$$

$$12 + 12 = 24$$

$$\therefore |A| \neq 0 \quad \text{يعني ته}$$

هاڻي ڪريمر جي قانون مطابق

$$x = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 10 & 2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -6 & 4 \end{vmatrix}}$$

$$= \frac{40 - 8}{24}$$

$$= \frac{32}{24}$$

$$= \frac{4}{3}$$


$$y = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 10 \\ -6 & 4 \end{vmatrix}}{24}$$

$$= \frac{12 + 60}{24}$$

$$= \frac{72}{24}$$

$$y = 3$$

انهي ڪري حل سيٽ آهي $\left\{ \left(\frac{4}{3}, 3 \right) \right\}$



مشق 19.2

1. هيٺين مان هر هڪ قطعي مُلھ جي قيمت لھو

i) $\begin{vmatrix} -5 & -3 \\ 3 & -4 \end{vmatrix}$

ii) $\begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 1 & -3 \end{vmatrix}$

iii) $\begin{vmatrix} -1 & -5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$

iv) $\begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$

v) $\begin{vmatrix} 3 & -3 & -4 \\ 4 & 1 & -5 \\ 0 & -1 & -4 \end{vmatrix}$

vi) $\begin{vmatrix} -3 & 4 & -5 \\ 2 & -3 & -5 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix}$

vii) $\begin{vmatrix} 0 & 5 & -4 \\ -3 & 4 & -5 \\ 1 & 0 & -5 \end{vmatrix}$

viii) $\begin{vmatrix} 4 & 3 & -5 \\ -5 & -1 & -5 \\ 2 & 4 & 4 \end{vmatrix}$

ix) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 \\ -2 & 3 & -5 \\ 3 & 5 & 3 \end{vmatrix}$

x) $\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 0 & c & d \\ 0 & x & y \end{vmatrix}$

xi) $\begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -6 & x & 1 \\ -4 & 0 & -1 \end{vmatrix}$

2. جيڪڏهن $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ ته پوءِ A_{21} ۽ A_{22} ، A_{12} ، M_{21} ، M_{22} ، M_{12} جا مُلھ لھو.

3. x جي ڪهڙي قيمت لاءِ $\begin{bmatrix} 5-x & x+1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ نادر قالب ٿيندو

4. هيٺين چورس قالبن مان ڪهڙو نادر قالب ۽ ڪهڙو غير نادر قالب آهي

$B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ ۽ $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

5. هيٺين جا ائڊجوائنٽ لھو


$C = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 6 & 2 & -6 \\ -3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ ۽ $B = \begin{bmatrix} -3 & 2 & -5 \\ -1 & 0 & -2 \\ 3 & -4 & 1 \end{bmatrix}$ ، $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$

6. جڏهن ته $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -6 \end{bmatrix}$ تصديق ڪريو ته $A(\text{adj } A) = |A|I$

7. ائڊجوائنٽ واري طريقي سان هيٺين قالبن جا ضربِي اُبتَر لھو

i) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$

ii) $B = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 5 & 10 \end{bmatrix}$



$$\text{iii) } C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{iv) } D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & -1 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{v) } E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

8. ضربی اُبتَر واري طریقی ۽ کریمر جي قانون ذریعی ھینین جو حل لھو.

$$\begin{array}{ll} 1) & \begin{array}{l} 2x + 3y = 14 \\ -4x + y = 28 \end{array} \\ 2) & \begin{array}{l} 2x - 4y = -12 \\ 2y + 3x = 0 \end{array} \end{array}$$

جائزي واري مشق 19

1. صحيح جواب چونڊيو.

i. جيڪڏهن m قطارن جو تعداد ۽ n ڪالمن جو تعداد ظاهر ڪري ٿو ۽ $m = n$ ته پوءِ قالب کي _____ قالب چئبو.

(a) مستطيلي (b) برابر (c) چورس (d) بُڙي

ii. جيڪڏهن $A = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$ ته پوءِ $A^2 =$ _____

(a) I_2 (b) I_3 (c) $-I_2$ (d) 0

iii. جيڪڏهن A هڪ چورس قالب آهي اهڙي طرح جو $A^t = -A$ ته پوءِ A کي _____ چئبو.

(a) ارببي قالب (b) غير طرفي قالب
(c) همشڪلي قالب (d) اُبتو همشڪلي قالب

iv. جيڪڏهن A, B, C ٽي قالب آهن ته پوءِ $(ABC)^t =$ _____

(a) $A^t \cdot B^t \cdot C^t$ (b) $C^t B^t A^t$ (c) $C^t A^t B^t$ (d) $(B^t A^t) C^t$

v. جيڪڏهن $A = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & i^2 \\ -i^2 & 0 \end{bmatrix}$ ۽ $C = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}$ ته پوءِ

(a) $A^2 = -I$ (b) $B^2 = -I$
(c) $C^2 = -I$ (d) اهي سڀ

vi. ٻن قالبن A ۽ B لاءِ جيڪڏهن $A = \begin{bmatrix} \sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix}$ ۽ $B = \begin{bmatrix} \sin\theta & \cos\theta \\ -\cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix}$ ته پوءِ $AB =$ _____


(a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

vii. x, y, z جون قيمتون لھو جيڪڏهن $2 \begin{bmatrix} x \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} -1 \\ y \\ 0 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ z \end{bmatrix}$

(a) $\frac{3}{2}, \frac{10}{3}, 2$ (b) $\frac{3}{2}, 2, \frac{10}{3}$

(c) $\frac{3}{2}, \frac{10}{3}, 2$ (d) 1, 2, 3



$$(A^{-1})^{-1} = \text{---} \quad \text{viii.}$$

$$A^2 \text{ (d)} \quad A^{-1} \text{ (c)} \quad A \text{ (b)} \quad A^{-2} \text{ (a)}$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 2 & x \end{vmatrix} = x + 4 \quad \text{ix.}$$

$$\text{كوٻه نه (d)} \quad 0 \text{ (c)} \quad \frac{2}{3} \text{ (b)} \quad \frac{3}{2} \text{ (a)}$$

$$\text{جيڪڏهن} \quad \begin{bmatrix} \lambda & -3 & 4 \\ -3 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{غير نادر قالب آهي ته پوءِ } \lambda \neq \text{---} \quad \text{x.}$$

$$\text{كوٻه نه (d)} \quad -16 \text{ (c)} \quad -17 \text{ (b)} \quad -15 \text{ (a)}$$

قطاري ۽ ڪالمي قالب کي بيان ڪريو. 2.

هينين قالبن جي ترتيب لھو. 3.

$$\text{i)} \quad [1 \ 5 \ 8] \quad \text{ii)} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{iii)} \quad \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 9 & 3 \\ 8 & 1 \end{bmatrix}$$

هينين جي وصف بيان ڪريو. 4.

(I) چورس قالب (ii) مستطيلي قالب (iii) اريبي قالب (iv) غير طرفي قالب

(v) همشڪلي قالب (vi) اُبتو همشڪلي قالب

$$\text{جيڪڏهن} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 1 & 3 & 4 \\ 7 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{۽} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 8 & 9 \\ 2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 7 \end{bmatrix} \quad \text{تہ پوءِ هينيان لھو} \quad 5.$$

$$\text{i)} \quad A + B$$

$$\text{ii)} \quad A - B$$

$$\text{iii)} \quad AB$$

$$\text{iv)} \quad BA$$

$$\text{v)} \quad 5A$$

$$\text{vi)} \quad 7B$$

$$\text{vii)} \quad 8A - 9B$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 8 & 9 \\ 2 & 0 & -1 \\ -7 & 8 & -10 \end{vmatrix} \quad \text{جي قيمت لھو} \quad 6.$$

نادر ۽ غير نادر قالبن کي مثالن سان بيان ڪريو. 7.


$$\text{جيڪڏهن} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 7 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{تہ پوءِ } A^{-1} \text{ لھو.} \quad 8.$$

$$2x + 5y = 27$$

$$7x + y = 12$$

ڏنل مساواتن جي جوڙي کي هينين طريقن سان حل ڪريو. 9.

(i) ضربِي اُبتڙ وارو طريقو (ii) ڪريمر جو قانون



خلاصو

- رُڪنن جي مستطيلي ترتيب کي قالب چئبو آهي.
- قالب ۾ رڪمن جي افقي ليڪ کي قالب جي قطار چئبو آهي ۽ رڪمن جي عمودي ليڪ کي قالب جو ڪالم چئبو آهي.
- ٻن قالبن کي برابر قالب ڪوٺيو جيڪڏهن انهن جي ترتيب ساڳي هجي ۽ انهن جا واسطيدار رُڪن به ساڳيا هجن.
- هڪ قطار واري قالب کي قطاري قالب ۽ هڪ ڪالم واري قالب کي ڪالمي قالب چئبو آهي.
- هڪ قالب جنهن ۾ قطارن جو تعداد ۽ ڪالمن جو تعداد برابر هجي ته ان قالب کي چورس قالب ڪوٺيو نه ته پوءِ ان کي مستطيلي قالب چئبو.
- هڪ چورس قالب کي اريبي قالب چئبو. جيڪڏهن گهٽ ۾ گهٽ هڪ اريبي رڪن کانسواءِ سمورا رُڪن ٻُڙي هجن
- هڪ اريبي قالب جنهن ۾ اريبي رُڪن ساڳيا هجن، ان کي غير طرفي قالب چئبو آهي.
- هڪ اريبي قالب جنهن جو هر هڪ اريبي رُڪن 1 هجي، ان کي وحداني قالب چئبو آهي.
- هڪ چورس قالب کي همشڪلي قالب ڪوٺيو جيڪڏهن ان جو مٿا سٽا ٿيل قالب به ان ڏنل قالب جي برابر هجي.
- هڪ چورس قالب کي اُبتوهمشڪلي قالب ڪوٺيو جيڪڏهن ان جو مٿا سٽا ٿيل قالب ان جو منفي هجي.
- ٻن قالبن جي جوڙيا ڪٽ ڪرڻ لاءِ انهن جا واسطيدار رُڪن جوڙ يا ڪٽ ڪبا آهن.
- جيڪڏهن A ۽ B ساڳي ترتيب وارا ٻه قالب آهن ته پوءِ جوڙ جي لحاظ کان مٿا وارو قانون آهي:

$$A + B = B + A$$
- جيڪڏهن A, B ۽ C تي ساڳي ترتيب وارا قالب آهن ته پوءِ جوڙ جي لحاظ کان سنگت واري خاصيت آهي:

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$
- ٻه قالب A ۽ B ضرب لاءِ موافق ڪوٺبا جيڪڏهن پهرين قالب جي ڪالمن جو تعداد ٻئي قالب جي قطارن جي تعداد جي برابر هجي.
- R تي ڪنهن چورس قالب A لاءِ هڪ عدد |A| کي قالب A جو قطعي ملهه ڪوٺبو آهي.
- جيڪڏهن A ۽ B, $n \times n$ ترتيب جا ٻه قالب آهن اهڙي طرح جو $AB=BA=I$ ته پوءِ A ۽ B هڪ ٻئي جا ضربِي اُبتڙ ڪوٺبا.
- هڪ درجي مساواتن جي مجموعي (System) کي ضربِي اُبتڙ واري طريقي ۽ ڪريمر جي قانون ذريعي حل ڪري سگهجي ٿو.



شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هن يونٽ جي پڙهڻ کانپوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته

- ◀ ڏنل اصلن جي ٻه درجي مساوات لاءِ فارمولو:
 - ◀ ٻه درجي اظهار $ax^2 + bx + c$ جو شناختي فرق $b^2 - 4ac$ بيان ڪن
 - ◀ ڏنل ٻه درجي اظهار جو شناختي فرق لهن
 - ◀ شناختي فرق ذريعي ٻه درجي مساوات جي اصلن جو قسم (Nature of roots) تي بحث ڪن
 - ◀ ڏنل ٻه درجي مساوات جي اصلن جو قسم لهن ۽ مساوات کي حل ڪندي تصديق ڪن
 - ◀ ڏنل ٻه درجي مساوات ۾ شامل اڻڄاتل مقدارن جو ملهه لهن جڏهن ان جي اصلن جو قسم مليل هجي.
 - ◀ ايڪي جا ٽيان مول لهن
 - ◀ ايڪي جي منجهيل ٽئين مولن کي ω ۽ ω^2 طور سڃاڻپ ڪن
 - ◀ ايڪي جي ٽئين مولن جي خاصيتن جي تصديق ڪن
 - ◀ ايڪي جي ٽئين مولن جي خاصيتن جو استعمال ڪندي واسطو رکندڙ مسئلن کي حل ڪن
 - ◀ ٻه درجي مساوات جي اصلن ۽ عددي مُنڊن جي وچ ۾ تعلق لهن
 - ◀ حل ڪرڻ کانسواءِ، ڏنل ٻه درجي مساوات جي اصلن جي جوڙو اُپت ۽ ضرب اُپت لهن
 - ◀ ڏنل ٻه درجي مساوات ۾ شامل نامعلوم عددن جو ملهه لهن جڏهن
 - ❖ اصلن جي جوڙو اُپت ۽ اصلن جي ضرب اُپت جي ڀڃ اُپت پاڻ ۾ برابر هجي
 - ❖ اصلن جي چورس جي جوڙو اُپت، ڏنل عدد جي برابر هجي
 - ❖ اصل پاڻ ۾ ڏنل عدد جو فرق رکن
 - ❖ اصل ڏنل تعلق کي پورو ڪن (مثال طور تعلق $2\alpha + 5\beta = 7$ جڏهن ته α ۽ β مساوات جا اصل آهن)
 - ❖ اصلن جي جوڙو اُپت ۽ ضرب اُپت ٻئي هڪ ڏنل عدد جي برابر هجن
 - ◀ هڪ ٻه درجي مساوات جي اصلن جو همشڪلي عمل بيان ڪن
 - ◀ همشڪلي عمل کي گراف وسيلي ظاهر ڪن
 - ◀ ٻه درجي مساوات جي اصلن جو همشڪلي عمل ان جي عددي منڊن جي صورت ۾ لهن
- ◀ ڏنل اصلن جي ٻه درجي مساوات لاءِ فارمولو:
 - ◀ $0 = x +$ اصلن جي ضرب اُپت (اصلن جي جوڙو اُپت) $- x^2$ ٺاهڻ:
 - ◀ ٻه درجي اُپت مساوات ٺاهڻ جنهن جا اصل هيٺيان آهن.
 - ❖ $2\alpha + 1, 2\beta + 1$
 - ❖ α^2, β^2
 - ❖ $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$
 - ❖ $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$
 - ❖ $\alpha + \beta, \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$
 - ◀ جڏهن ته α, β هڪ ٻه درجي مساوات جا اصل آهن.
 - ◀ α, β جون قيمتون لهن جڏهن هڪ مساوات جا اصل
 - ◀ $\frac{1}{\alpha}$ ۽ $\frac{1}{\beta}$ آهن.
 - ◀ ڪعبي يا ٽي درجي مساوات جو حل ڪن جڏهن مساوات جو هڪ اصل مليل هجي.
 - ◀ چو درجي مساوات کي حل ڪن جيڪڏهن مساوات جا ٻه حقيقي اصل مليل هجن.
 - ◀ ٻن بدليجنڊڙن ۾ ٻن مساواتن جي مجموعي کي حل ڪرڻ جڏهن
 - ❖ هڪ مساوات هڪ درجي ۽ ٻي مساوات ٻه درجي هجي.
 - ❖ جڏهن ٻئي مساواتون ٻه درجي هجن
 - ❖ ٻه درجي مساوات سان حل ٿيندڙ عام زندگي جا مسئلا حل ڪن.



20.1 به درجي مساوات جي اصلن جو قسم (Nature of the Roots of a Quadratic Expression):

20.1. (i) به درجي اظهار $ax^2 + bx + c, a \neq 0$ جو شناختي فرق $(b^2 - 4ac)$ بيان ڪرڻ اسانکي خبر آهي ته ٻن درجن واري گهڻ رقيقي اظهار کي به درجي اظهار چئبو آهي به درجي اظهار جي معياري صورت $ax^2 + bx + c, (a \neq 0)$ آهي جڏهن ته a, b, c ترتيبوار x^2 جو عددي منڍ، x جو عددي منڍ ۽ مستقل رقم (Constant Term) آهن.

به درجي اظهار جو شناختي فرق (Discriminant):

به درجي اظهار $ax^2 + bx + c, (a \neq 0)$ لاءِ، اظهار $b^2 - 4ac$ کي ان جو شناختي فرق چئبو آهي ۽ ان کي Δ يا D سان ظاهر هر ڪبو آهي يعني $\Delta = b^2 - 4ac$

20.1. (ii) ڏنل به درجي مساوات جو شناختي فرق ٺهڻ

اسين اڳيئي ڄاڻون ٿا ته به درجي مساوات $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ جو حل $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ آهي ۽ $b^2 - 4ac$ شناختي فرق آهي

مثال $2x^2 + 5x - 4 = 0$ جو شناختي فرق لهو.

حل: اسان وٽ آهي $2x^2 + 5x - 4 = 0$

هتي $a = 2, b = 5, c = -4$

هاڻي

$$\Delta = b^2 - 4ac = (5)^2 - 4(2)(-4) = 25 + 32 = 57$$

20.1. (iii) شناختي فرق ذريعي به درجي مساوات جي اصلن جو قسم (Nature of roots):

اسان شناختي فرق يعني $\Delta = b^2 - 4ac$ جو استعمال ڪندي به درجي مساوات $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ جي اصلن جو قسم لهي سگهون ٿا

به درجي مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ جا اصل $\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ۽ $\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ آهن ۽ اصلن جو قسم

$b^2 - 4ac$ جي قيمت تي منحصر ڪري ٿو جڏهن ته a, b, c حقيقي عدد آهن

i. جيڪڏهن $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ ته پوءِ اصل حقيقي ۽ غير مساوي هوندا

ii. جيڪڏهن $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ ته پوءِ اصل غير حقيقي (منجهيل يا خيالي) هوندا.

iii. جيڪڏهن $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ ته پوءِ اصل ناطق ۽ برابر هوندا ۽ هر هڪ اصل $-\frac{b}{2a}$ جي برابر هوندو

iv. جيڪڏهن a, b, c ناطق عدد آهن ۽ $\Delta = b^2 - 4ac$ هڪ مڪمل چورس هجي ته پوءِ اصل ناطق ۽ غير مساوي هوندا. ٻي صورت ۾ اصل غير ناطق هوندا.


20.1. (iv) ڏنل به درجي مساوات جي اصلن جو قسم ٺهڻ ۽ مساوات کي حل ڪندي تصديق ڪرڻ:

مثال 1:

هيٺين مساواتن جي اصلن جو قسم لهڻ لاءِ شناختي فرق استعمال ڪريو ۽ مساوات کي حل ڪندي تصديق ڪريو

$$5x^2 + 3x + 1 = 0 \quad \text{(ii)} \quad x^2 + 5x - 14 = 0 \quad \text{(i)}$$

$$9x^2 = 6x - 1 \quad \text{(iv)} \quad x^2 - 9x + 5 = 0 \quad \text{(iii)}$$



تصديق:

$$\begin{aligned}
 x^2 + 5x - 14 &= 0 \\
 x^2 + 7x - 2x - 14 &= 0 \\
 x(x+7) - 2(x+7) &= 0 \\
 (x-2)(x+7) &= 0 \\
 x+7=0 &\quad \text{يا} \quad (x-2)=0 \\
 \Rightarrow x=-7 &\quad \text{يا} \quad x=2
 \end{aligned}$$

هتي مساوات جا اصل حقيقي غير ناطق ۽ غير مساوي آهن تصديق ٿي

تصديق:

ٻه درجي فارمولي جو استعمال ڪندي

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{-3 \pm \sqrt{9-20}}{2} \\
 x &= \frac{-3 \pm \sqrt{11}i}{2} \quad (\because i^2 = -1)
 \end{aligned}$$

هتي مساوات جا اصل، منجهيل آهن تصديق ٿي.

تصديق:

$$\begin{aligned}
 x^2 - 9x + 5 &= 0, \\
 \text{ٻه درجي فارمولي جو استعمال ڪندي} \\
 x &= \frac{9 \pm \sqrt{81-20}}{2} \\
 x &= \frac{-3 \pm \sqrt{61}}{2}
 \end{aligned}$$

هتي مساوات جا اصل حقيقي غير ناطق ۽ غير مساوي آهن تصديق ٿي

تصديق:

$$\begin{aligned}
 9x^2 - 6x + 1 &= 0 \\
 (3x)^2 - 2(3x)(1) + (1)^2 &= 0 \\
 (3x-1)^2 &= 0 \\
 \Rightarrow 3x-1=0 &\quad \text{يا} \quad 3x-1=0 \\
 \Rightarrow x=\frac{1}{3} &\quad \text{يا} \quad x=\frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

هتي مساوات جا اصل حقيقي، ناطق ۽ برابر آهن تصديق ٿي.

حل:

$$\begin{aligned}
 x^2 + 5x - 14 &= 0 \quad (i) \\
 c &= -14, b = 5, a = 1 \quad \text{هتي} \\
 \Delta &= b^2 - 4ac \\
 \therefore \Delta &= (5)^2 - 4(1)(-14) \\
 \Rightarrow \Delta &= 25 + 56 \\
 \Rightarrow \Delta &= 81 = (9)^2 > 0, \\
 \text{جيئن ته شناختي فرق مڪمل چورس ۽ مثبت آهي} \\
 \text{تنهنڪري مساوات جا اصل، حقيقي، ناطق ۽ غير مساوي آهن.}
 \end{aligned}$$

حل:


$$\begin{aligned}
 5x^2 + 3x + 1 &= 0, \quad (ii) \\
 c &= 1, b = 3, a = 5 \quad \text{هتي} \\
 \Delta &= b^2 - 4ac \\
 \therefore \Delta &= (3)^2 - 4(5)(1) \\
 \Rightarrow \Delta &= 9 - 20 \\
 \Rightarrow \Delta &= -11 < 0, \quad (\text{يعني منفي}) \\
 \text{جيئن ته شناختي فرق منفي آهي. تنهنڪري مساوات} \\
 \text{جا اصل منجهيل آهن}
 \end{aligned}$$

حل:

$$\begin{aligned}
 x^2 - 9x + 5 &= 0, \quad (iii) \\
 c &= 5, b = -9, a = 1 \quad \text{هتي} \\
 \Delta &= b^2 - 4ac \\
 \therefore \Delta &= (-9)^2 - 4(1)(5) \\
 \Rightarrow \Delta &= 81 - 20 \\
 \Rightarrow \Delta &= 61 > 0, \\
 \text{جيئن ته شناختي فرق مثبت ۽ غير مڪمل چورس آهي} \\
 \text{تنهنڪري مساوات جا اصل حقيقي ۽ غير ناطق مساوي آهن}
 \end{aligned}$$

حل:

$$\begin{aligned}
 9x^2 &= 6x - 1 \quad (iv) \\
 \Rightarrow 9x^2 - 6x + 1 &= 0 \\
 c &= 1, b = -6, a = 9, \quad \text{هتي} \\
 \therefore \Delta &= b^2 - 4ac \\
 \therefore \Delta &= (6)^2 - 4(9)(1) \\
 \Rightarrow \Delta &= 36 - 36 \\
 \Rightarrow \Delta &= 0, \\
 \text{جيئن ته شناختي فرق پورو چورس ۽ ٻڙي آهي} \\
 \text{تنهنڪري مساوات جا اصل حقيقي، ناطق ۽ برابر آهن}
 \end{aligned}$$



مثال 2:

ثابت ڪري ڏيکاريو ته مساوات $abc^2x^2 + c(3a^2 + b^2)x + 3a^2 + b^2 - ab = 0$ جا اصل ناطق عدد آهن

حل:

$$\begin{aligned}
 abc^2x^2 + c(3a^2 + b^2)x + 3a^2 + b^2 - ab &= 0 \\
 C = 3a^2 + b^2 - ab \quad \& \quad B = c(3a^2 + b^2) \quad A = abc^2, \quad \text{هتي} \\
 \Delta &= B^2 - 4AC \quad \text{هاڻي} \\
 \Delta &= [c(3a^2 + b^2)]^2 - 4(abc^2)(3a^2 + b^2 - ab) \\
 &= c^2(3a^2 + b^2)^2 - 4abc^2(3a^2 + b^2 - ab) \\
 &= c^2[(3a^2 + b^2)^2 - 4ab(3a^2 + b^2) + 4a^2b^2] \\
 &= c^2[(3a^2 + b^2)^2 - 2(3a^2 + b^2)(2ab) + (2ab)^2] \quad [\because 4ab = 2(2ab)] \\
 &= c^2[(3a^2 + b^2 - 2ab)^2] \\
 &= [c(3a^2 + b^2 - 2ab)]^2
 \end{aligned}$$

جيئن ته Δ جو ملهه مڪمل چورس آهي
تنهنڪري مساوات جا اصل، ناطق عدد آهن

(v) 20.1 ڏنل ٻه درجي مساوات ۾ شامل اڻڄاتل مقدارن جو ملهه لهڻ جڏهن ان جي اصلن جو قسم مليل هجي.
ڏنل ٻه درجي مساوات ۾ شامل اڻڄاتل مقدار جو ملهه لهڻ لاءِ هيٺيون مثالون اسانجي مدد ڪنديون
جڏهن ته مساوات جي اصلن جو قسم مليل هجي.

مثال 1:

p جي ڪهڙي قيمت لاءِ مساوات $3x^2 + 5x + p = 0$ مساوي اصل هوندا.


(i) مساوي اصل هوندا.

(ii) ناطق اصل هوندا.

(iii) منجهيل اصل هوندا.

حل:

$$\begin{aligned}
 3x^2 + 5x + p &= 0 \\
 c = p \quad \& \quad b = 5, a = 3 \quad \text{هتي} \\
 \therefore \Delta &= b^2 - 4ac \\
 \therefore \Delta &= (5)^2 - 4(3)(p) = 25 - 12p, \\
 &\text{مساوي اصلن لاءِ}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \Delta &= 0 \\ 25 - 12p &= 0 \quad \text{يعني} \\ \Rightarrow -12p &= -25, \\ \Rightarrow p &= \frac{25}{12}, \end{aligned}$$

انهيءَ ڪري $p = \frac{25}{12}$ تي ڏنل مساوات کي ٻه مساوي اصل هوندا
(ii) ناطق اصلن لاءِ

Δ کي پورو چورس هجڻ گهرجي
يعني $25 - 12p$ کي ضرور پورو چورس ٿيڻ گهرجي جيڪو هيٺين قيمتن تي ٿيندو
 $p = 0, 2, -2$ ۽ $p = -2$ وغيره
اهڙي طرح $p = 0, 2, -2$ ۽ ٻين قيمتن تي شناختي فرق پورو چورس ٿيندو
(iii) منجهيل اصلن لاءِ

$$\begin{aligned} 25 - 12p &< 0 \quad \text{يعني} \\ \Rightarrow 12p &> 25 \\ \Rightarrow p &> \frac{25}{12} \\ \text{اهڙي طرح ڏنل مساوات کي مساوي اصل هوندا} \\ p &> \frac{25}{12}, \quad \text{جڏهن} \end{aligned}$$

جيڪڏهن مساوات $x^2 - 15 - k(2x - 8) = 0$ کي مساوي اصل هجڻ ته پوءِ P جي قيمت لھو

مثال 2:

اسان وٽ آهي $x^2 - 15 - k(2x - 8) = 0$ ان کي معياري صورت ۾ لکندي
اسان کي مليو $x^2 - 2kx + 8k - 15 = 0$


حل:

$$\begin{aligned} \text{هتي } a &= 1, b = -2k, c = 8k - 15 \\ \Delta &= b^2 - 4ac \\ \therefore \Delta &= (-2k)^2 - 4(1)(8k - 15) \\ \Rightarrow \Delta &= 4k^2 - 4(8k - 15) \\ &\text{مساوي اصلن لاءِ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta &= 0 \\ \therefore 4k^2 - 4(8k - 15) &= 0 \\ \Rightarrow k^2 - 8k + 15 &= 0 \quad (\text{ٻنهي پاسن کي 4 سان ونڊيندي}) \\ \Rightarrow k^2 - 5k - 3k + 15 &= 0 \\ \Rightarrow k(k - 5) - 3(k - 5) &= 0 \\ \Rightarrow (k - 5)(k - 3) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k - 3 &= 0 \quad \text{يا} \quad k - 5 = 0 \quad \text{يعني} \\ \Rightarrow k &= 3 \quad \quad \quad k = 5 \end{aligned}$$

اهڙي طرح k جون قيمتون 3 ۽ 5 آهن



مثال 3:

p جي ڪهڙي قيمت لاءِ، مساوات $2x^2 - px + 18 = 0$ کي حقيقي ۽ غير مساوي اصل هوندا

حل:

$$2x^2 - px + 18 = 0, \quad \text{هتي}$$

$$c = 18 \text{ ۽ } b = -p \text{ } a = 2,$$

$$\therefore \Delta = b^2 - 4ac$$

$$\therefore \Delta = (-p)^2 - 4(2)(18) = p^2 - 144$$

حقيقي ۽ غير مساوي اصلن لاءِ

$$\therefore \Delta > 0$$

$$\therefore p^2 - 144 > 0$$

$$\Rightarrow p^2 > 144$$

$$\Rightarrow p > 12 \text{ يا } p < -12$$

اهڙي طرح ڏنل مساوات کي مساوي اصل هوندا جيڪڏهن $p > 12$ يا $p < -12$

مشق 20.1

1. شناختي فرق جو استعمال ڪندي، هيٺين مساواتن جي اصلن جو قسم لھو

$$2x^2 + 8 = 6x \quad \text{(iii)} \quad x^2 = 6x \quad \text{(ii)} \quad x^2 + 5x - 6 = 0 \quad \text{(i)}$$

$$x = x^2 + 1 \quad \text{(vi)} \quad 24x^2 + 12x + 36 = 0 \quad \text{(v)} \quad 1 + 6x + 9x^2 = 0 \quad \text{(iv)}$$

$$3x^2 + 9 = 0 \quad \text{(viii)} \quad 3x^2 + 6 = 5x \quad \text{(vii)}$$

2. k جي اها حقيقي قيمت لھو جنھن تي هيٺين ٻه درجي مساواتن کي (i) ساڳيو حقيقي اصل هجي (ii) مختلف اصل هجي (اشارو: ساڳي حقيقي حل لاءِ $\Delta = 0$ ۽ مختلف حقيقي حل لاءِ $\Delta > 0$)

$$x^2 + k = 4 \quad \text{(ii)} \quad x^2 - 3x + k = 0 \quad \text{(i)}$$

$$(k-1)x^2 - 4x + 2 = 0 \quad \text{(iv)} \quad x^2 + kx + 2 = 0 \quad \text{(iii)}$$

$$9x^2 + kx = -16 \quad \text{(vi)} \quad x^2 + kx + 4 = 0 \quad \text{(v)}$$

$$x^2 + 1 = kx \quad \text{(viii)} \quad (k-2)x^2 = 4x + (k+2) \quad \text{(vii)}$$

3. هيٺ ڏنل هر هڪ ٻه درجي مساوات ۾ m جو مُل لھو جيڪو اصلن کي برابر ڪري

$$m \neq -1 \quad \text{بشرطيڪ } (m+1)x^2 + 2(m+3)x + (2m+3) = 0, \quad \text{(i)}$$

$$9x^2 + mx + 16 = 0 \quad \text{(ii)}$$

4. ثابت ڪري ڏيکاريو ته هيٺين ٻه درجي مساواتن جا اصل حقيقي عدد آهن


$$x^2 - 2x \left(k + \frac{1}{k} \right) x + 3 = 0, \quad \forall k \in \mathbb{R} - \{0\} \quad \text{(i)}$$

$$2nx^2 + 2(l+m+n)x + (l+m) = 0, \quad \forall l, m, n \in \mathbb{R} \text{ ۽ } m \neq 0 \quad \text{(ii)}$$

5. ثابت ڪري ڏيکاريو ته هيٺين ٻه درجي مساواتن جا اصل ناطق عدد آهن.

$$(l-m)x^2 + (m+n-l)x - n = 0, \quad \forall l, m, n \in \mathbb{R} \text{ ۽ } l \neq m \quad \text{(i)}$$

$$(a+c-b)x^2 + 2cx + (b+c-a) = 0, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad \text{(ii)}$$



6. p ۽ q جي ڪهڙين قيمتن تي ٻه درجي مساوات $x^2 + (2p-4)x - (3q+5) = 0$ کي مساوي اصل هوندا
7. ثابت ڪري ڏيکاريو ته ڏنل ٻه درجي مساوات $(x-a)(x-b) + (x-b)(x-c) + (x-c)(x-a) = 0$ جا اصل حقيقي آهن ۽ اهي مساوي ٿيندا جيڪڏهن $a=b=c$.

20.2 ايڪي يا هڪ جا ٽيان مول ۽ ان جون خاصيتون (Cube Roots of Unity and their properties):

20.2. (i) ايڪي جا ٽيان مول ٺهڻ.

فرض ڪريو ته x ايڪي جو ٽيون مول آهي ته پوءِ

$$x^3 = 1$$

$$\Rightarrow x^3 - 1^3 = 0$$

$$\Rightarrow (x-1)(x^2+x+1) = 0, \quad \left[\because a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2) \right]$$

$$x-1=0 \quad \text{يعني}$$

$$\Rightarrow x=1$$

$$x^2+x+1=0, \quad \text{يا}$$

$$a=b=c=1, \quad \text{هتي}$$

ٻه درجي فارمولي جو استعمال ڪندي اسان وٽ آهي

$$\therefore x = \frac{-1 \pm \sqrt{(1)^2 - 4(1)(1)}}{2(1)} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{-1 \times 3}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}, \quad (\because i^2 = -1)$$

$$\Rightarrow x = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \text{ ۽ } x = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$$

اهڙي طرح ايڪي جا ٽيان مول

آهن $\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$, $\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ ۽ 1

20.2. (ii) ايڪي جي منجهيل ٽئين مولن کي ω ۽ ω^2 طور سڃاڻپ ڪرڻ:

ايڪي جا ٻه منجهيل ٽيان مول

$$\frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \text{ ۽ } \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$$

آهن انهن ٻنهي منجهيل ٽئين مولن لاءِ اسين يوناني حرف ” ω “ جو استعمال ڪنداسين جنهن کي اوميگا ”omega“ پڙهيو آهي.

فرض ڪريو ته $\omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ ته پوءِ $\omega^2 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$ انهي ڪري هاڻي ايڪي جا ٽيٿان مول 1, ω ۽ ω^2 آهن.


20.2. (iii) ايڪي جي ٽئين مولن جي خاصيتن جي تصديق ڪرڻ:

ايڪي جي ٽئين مولن جون خاصيتون آهن:

(i) ايڪي جو هر هڪ منجهيل ٽيئون مول ٻيئي جو چورس آهي:

تصديق:

ايڪي جو هڪ منجهيل ٽيئون مول $\omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ آهي



$$\therefore \omega^2 = \left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{1-2i\sqrt{3}+3i^2}{4} = \frac{1-2i\sqrt{3}+3(-1)}{4} \quad (\because i^2 = -1)$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{-2-2i\sqrt{3}}{4} = \frac{2(-1-i\sqrt{3})}{4}$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Now } (\omega^2)^2 = \left(\frac{1-i\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{-1+2i\sqrt{3}+3i^2}{4} = \frac{1+2i\sqrt{3}+3(-1)}{4} \quad (\because i^2 = -1)$$

$$\Rightarrow (\omega^2)^2 = \frac{-2+2i\sqrt{3}}{4} = \frac{2(-1+i\sqrt{3})}{4} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow (\omega^2)^2 = \omega.$$

انهي ڪري اڪي جو هر هڪ منجهيل ٿيئون مول ٻيئي جو چورس آهي.
تصديق ٿي.

(ii) اڪي جي سڀني ٽينن مولن جو جوڙ پڙي. يعني $1+\omega+\omega^2=0$

L.H.S $1+\omega+\omega^2$

تصديق:

$$= 1 + \left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \right) + \left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \right), \quad \left(\omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \text{ ۽ } \omega^2 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \right) \text{ ته جڏهن ته}$$

$$= \frac{2-1+i\sqrt{3}-1-i\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{2-2}{2} = \frac{0}{2} = 0 = \text{R.H.S.}$$

تصديق ٿي.

(iii) اڪي جي سڀني ٽينن مولن جي ضرب اپت 1 آهي يعني $\omega \cdot \omega^2 \cdot 1 = 1$

L.H.S $\omega \cdot \omega^2 \cdot 1$

تصديق:

$$= 1 \left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \right) \left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= \frac{1-i^2 3}{4}$$

$$= \frac{1-(-1)(3)}{4}, \quad (\because i^2 = -1)$$

$$= \frac{1+3}{4} = \frac{4}{4} = 1$$


$$= \text{R.H.S}$$

$$1 \cdot \omega \cdot \omega^2 = 1$$

$$\omega^3 = 1$$

يعني
يا

تصديق ٿي.



(iv) ايڪي جو هر هڪ منجهيل ٽيون مول ٻيئي جو اُبتڙ آهي

تصديق اسان کي خبر آهي ته $\omega^3 = 1$

$$\Rightarrow \omega \cdot \omega^2 = 1,$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{1}{\omega^2} \text{ يا } \omega^2 = \frac{1}{\omega}$$

اهڙي طرح ايڪي جو هر هڪ منجهيل ٽيون مول ٻيئي جو اُبتڙ آهي.

(v) ω^3 جي هر هڪ سڄي سگهه، هڪ جي برابر ٿيندي.

$$\therefore \omega^3 = 1,$$

$$\therefore (\omega^3)^m = (1)^m = 1 \quad \forall m \in \mathbb{Z}.$$

$$\omega^{3m} = 1.$$

اهڙي طرح تصديق ٿي ته ω^3 جي هر هڪ سڄي سگهه، هڪ جي برابر ٿيندي.

20.2. (iv) ايڪي جي ٽين مول جي خاصيتن جو استعمال ڪندي واسطو رکندڙ مسئلن کي حل ڪرڻ:

مثال 1: -27 جا سمورا ٽيٺان مول لهو

حل: فرض ڪريو ته -27 جو ٽيون مول x آهي

$$\therefore x = (-27)^{\frac{1}{3}} \text{ يعني}$$

$$x^3 = -27$$

$$\Rightarrow x^3 + 27 = 0$$

$$\Rightarrow (x)^3 + (3)^3 = 0$$

$$\Rightarrow (x+3)(x^2 - 3x + 9) = 0, \quad [a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^3)]$$

$$x+3=0 \Rightarrow x=-3,$$

$$x^2 - 3x + 9 = 0$$

$$c = 9, b = -3, a = 1$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$


$$\therefore x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(1)(9)}}{2(1)}$$

$$\Rightarrow x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{9 - 36}}{2}$$

$$\Rightarrow x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{-27}}{2}$$

$$\Rightarrow x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{-1 \times 27}}{2}$$

$$\Rightarrow x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{i^2 \times 27}}{2} \quad (\because i^2 = -1)$$



$$\begin{aligned} \Rightarrow x &= \frac{-(-3) \pm i3\sqrt{3}}{2} \\ \Rightarrow x &= \frac{-3(-1 \pm i\sqrt{3})}{2} \\ \Rightarrow x &= \frac{-3(-1 + i\sqrt{3})}{2} \quad \& \quad x = \frac{-3(-1 - i\sqrt{3})}{2} \\ \Rightarrow x &= -3\omega^2 \quad \& \quad x = -3\omega \\ \text{انهي ڪري 27- جا سمورا ٽيٿان مول } -3\omega \text{ ۽ } -3\omega^2 \text{ آهن} \end{aligned}$$

مثال 2: ثابت ڪري ڏيکاريو ته

$$2 + \omega = \frac{3}{2 + \omega^2} \quad (a)$$


$$n \in \mathbb{N} \quad 2n=1 \text{ جزن تائين } (1+\omega)(1+\omega^2)(1+\omega^4)(1+\omega^8)\dots \text{ جڏهن ته } (b)$$

(a) حل:

$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= 2 + \omega \\ &= \frac{(2 + \omega)(2 + \omega^2)}{(2 + \omega^2)} \quad (2 + \omega^2) \text{ سان ضرب ۽ ونڊ ڪندي} \\ &= \frac{4 + 2\omega + 2\omega^2 + \omega^3}{2 + \omega^2} \\ &= \frac{4 + 2(\omega + \omega^2) + 1}{2 + \omega^2} \quad (\because \omega^3 = 1) \\ &= \frac{5 + (-1)}{2 + \omega^2} \quad (\because \omega + \omega^2 = -1) \\ &= \frac{5 - 1}{2 + \omega^2} = \frac{4}{2 + \omega^2} \\ &\quad \text{ثابت ٿيو} \end{aligned}$$

$$\text{L.H.S} = (1 + \omega)(1 + \omega^2)(1 + \omega^4)(1 + \omega^8)\dots \text{ جزن تائين } 2n \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (b)$$

$$\begin{aligned} &= [(-\omega^2)(-\omega)] [(1 + \omega^3 \cdot \omega)(1 + \omega^6 \cdot \omega^2)] \dots \text{ جزن تائين } n \quad \left(\begin{array}{l} \because 1 + \omega = -\omega^2 \\ 1 + \omega^2 = -\omega \\ \omega^3 = \omega^6 = 1 \end{array} \right) \\ &= (\omega^3) [(1 + \omega)(1 + \omega^2)] \dots \text{ جزن تائين } n \\ &= (\omega^3) [(-\omega^2)(-\omega)] \dots \text{ جزن تائين } n \\ &= (\omega^3) (\omega^3) \dots \text{ جزن تائين } n \\ &= (1)(1) \dots \text{ جزن تائين } n \\ &= (1)^n = 1. \\ &\text{انهي ڪري ثابت ٿيو} \end{aligned}$$



مثال 3: ثابت ڪريو ته **ثابتي:**
 $(x + y + z)(x + y\omega + z\omega^2)(x + y\omega^2 + z\omega) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz,$
 جڏهن ته ω ۽ ω^2 ايڪي جا منجهيل تئين مول آهن.

$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= (x + y + z)(x + y\omega + z\omega^2)(x + y\omega^2 + z\omega) \\ &= (x + y + z) \left[(x + y\omega + z\omega^2)(x + y\omega^2 + z\omega) \right] \\ &= (x + y + z) \left[x^2 + xy\omega^2 + xz\omega + xy\omega + y^2\omega^3 + yz\omega^2 + xz\omega^2 + yz\omega^4 + z^2\omega^3 \right] \\ &= (x + y + z) \left[x^2 + y^2(1) + z^2(1) + xy(\omega^2 + \omega) + yz(\omega^2 + \omega^4) + zx(\omega + \omega^2) \right] \\ &= (x + y + z) \left[x^2 + y^2 + z^2 + xy(-1) + yz(-1) + zx(-1) \right], \\ &= (x + y + z) \left[x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx \right] \quad \left(\because \omega^3 = 1, \omega^2 + \omega = -1 \right. \\ & \quad \left. \text{۽ } \omega^2 + \omega^4 = \omega + \omega^2 = -1 \right) \\ &= x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz. \\ &= \text{R.H.S} \end{aligned}$$

انهي ڪري ثابت ٿيو

مشق 20.2

1. هيٺين جا سمورا تئين مول لهو

$$216 \quad \text{(iii)} \quad -125 \quad \text{(ii)} \quad 64 \quad \text{(i)}$$

2. هيٺيان لهو

$$\begin{aligned} (1 - \omega + \omega^2)(1 + \omega - \omega^2) & \quad \text{(ii)} & (1 + \omega^2)^4 & \quad \text{(i)} \\ (-1 + \sqrt{-3})^4 + (-1 - \sqrt{-3})^4 & \quad \text{(iv)} & (2 + 5\omega + 2\omega^2)^6 & \quad \text{(iii)} \end{aligned}$$

3. ثابت ڪري ڏيکاريو ته


$$\begin{aligned} (1 + \omega)(1 + \omega^2)(1 + \omega^4)(1 + \omega^8) &= (\omega + \omega^2)^4 & \text{(i)} \\ (a + b)(a\omega + b\omega^2)(a\omega^2 + b\omega) &= a^3 + b^3 & \text{(ii)} \\ (a + \omega b + \omega^2 c)(a + \omega^2 b + \omega c) &= a^2 + b^2 + c^2 - ab - ba - ca & \text{(iii)} \\ \left(\frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} \right)^9 + \left(\frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} \right)^9 - 2 &= 0 & \text{(iv)} \\ (1 + \omega - \omega^2)^3 - (1 - \omega + \omega^2)^3 &= 0 & \text{(v)} \end{aligned}$$

20.3. به درجي مساوات جا اصل ۽ عددي مُنڊ

20.3. (i) به درجي مساوات جي اصلن ۽ عددي مُنڊن جي وچ ۾ تعلق ٺهڻ

فرض ڪريو ته مساوات $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ جا اصل α ۽ β سان ظاهر ڪجن ٿا

$$\text{ته پوءِ} \quad \alpha = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{۽} \quad \beta = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



$$\therefore \alpha + \beta = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac} - b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = \frac{-b}{a} \quad (1)$$

$$\alpha\beta = \left(\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \quad \text{۽}$$

$$\Rightarrow \alpha\beta = \frac{(-b)^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a} \quad (2)$$

تنهنڪري (1) ۽ (2) مان اسان کي هيٺيان مڪيه تعلق مليا

$$x \text{ جو عددي مُندڙ} = - \frac{x \text{ جو عددي منڍ}}{x^2}$$

$$\text{مستقل رقم} = \frac{x^2 \text{ جو عددي منڍ}}{x^2}$$

جيڪڏهن α ۽ β مساوات جا اصل آهن، $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ ، ته پوءِ

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} \quad \text{۽} \quad \alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

20.3. (ii) حل ڪرڻ کان سواءِ، ڏنل ٻه درجي مساوات جي اصلن جي جوڙايت ۽ ضرب ايت لھڻ.

مثال حل ڪرڻ کان سواءِ، هيٺين مساواتن مان هر هڪ جي اصلن جي جوڙايت ۽ ضرب ايت لھو

$$3(5x^2 + 1) = 17x \quad (ii) \quad 4x^2 + 6x + 1 = 0 \quad (i)$$

$$3(5x^2 + 1) = 17x \quad \text{حل: (ii)}$$

$$15x^2 - 17x + 3 = 0 \quad \text{هتي}$$

$$c = 3 \quad \text{۽} \quad b = -17, a = 15$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} \quad \text{۽} \quad \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \quad \text{جيئن ته}$$

$$\alpha\beta = \frac{3}{15} = \frac{1}{5} \quad \text{۽} \quad \alpha + \beta = -\left(\frac{-17}{15}\right)$$

$$\alpha\beta = \frac{1}{5} \quad \text{۽} \quad \alpha + \beta = \frac{17}{15}$$

حل: (i)

$$4x^2 + 6x + 1 = 0$$

$$c = 1 \quad \text{۽} \quad b = 6, a = 4 \quad \text{هتي}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} \quad \text{۽} \quad \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \quad \text{جيئن ته}$$

$$\alpha\beta = \frac{1}{4} \quad \text{۽} \quad \alpha + \beta = -\frac{6}{4} \quad \text{تنهنڪري}$$


$$\Rightarrow \alpha\beta = \frac{1}{4} \quad \text{۽} \quad \alpha + \beta = -\frac{3}{2}$$

20.3. (iii) ڏنل ٻه درجي مساوات ۾ شامل نامعلوم عددن جو ملهه لھڻ جڏهن

(a) اصلن جي جوڙايت ۽ اصلن جي ضرب ايت جي ڀڃ ايت پاڻ ۾ برابر هجن.

(b) اصلن جي چورس جي جوڙايت، ڏنل عدد جي برابر هجي.

(c) اصل پاڻ ۾ ڏنل عدد جو فرق رکن.



(d) اصل ڏنل تعلق کي پورو ڪن (مثال طور تعلق $2\alpha + 5\beta = 7$ جڏهن ته α ۽ β مساوات جا اصل آهن)

(e) اصلن جي جوڙايت ۽ ضرب ايت هڪ ڏنل عدد جي برابر هجن

(a) جڏهن اصلن جي جوڙايت ۽ اصلن جي ضرب ايت جي ڀيڄ ايت پاڻ ۾ برابر هجن

مثال: k جي قيمت لھو جيڪڏهن مساوات $6x^2 - 3kx + 5 = 0$ جي اصلن جي جوڙايت ۽ اصلن جي ضرب ايت پاڻ ۾ برابر آهن

حل: فرض ڪريو ته مساوات $6x^2 - 3kx + 5 = 0$ جا اصل α ۽ β آهن

$$\text{هتي } a = 6, b = -3, c = 5$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{5}{6} \quad \text{۽} \quad \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-3k)}{6} = \frac{3k}{6} \quad \text{هاڻي}$$

اسان کي مليل آهي ته

اصلن جي ضرب ايت = اصلن جي جوڙايت

$$\alpha\beta = \alpha + \beta \quad \text{يعني}$$

$$\therefore \frac{3k}{6} = \frac{5}{6} \quad \Rightarrow \quad k = \frac{5}{3}$$

مثال: p جي قيمت لھو جيڪڏهن مساوات $2x^2 + (8-4p)x + 3p = 0$ جي اصلن جي جوڙايت، اصلن جي ضرب

ايت جي ڀيڄ جي برابر آهي.

حل: فرض ڪريو ته مساوات $2x^2 + (8-4p)x + 3p = 0$ جا اصل α ۽ β آهن

$$\text{هتي } a = 2, b = 8-4p, c = 3p$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{3p}{2} \quad \text{۽} \quad \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(8-4p)}{2} = 2p-4$$

سوال ۾ ڏنل شرط موجب، اسان وٽ آهي

$$\alpha + \beta = 2(\alpha\beta)$$

$$2p-4 = 2\left(\frac{3p}{2}\right) = 3p \quad \text{يعني}$$

$$\Rightarrow p = -4.$$

(b) جڏهن اصلن جي چورس جي جوڙايت ڏنل عدد جي برابر هجي:

مثال: k جو ملھ لھو جيڪڏهن مساوات، $2x^2 + 3kx + k^2 = 0$ جي اصلن جي چورس جي جوڙايت 5 جي برابر آهي


حل: فرض ڪريو ته مساوات $2x^2 + 3kx + k^2 = 0$ جا اصل α ۽ β آهن

$$\text{هتي } a = 2, b = 3k, c = k^2$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{k^2}{2} \quad \text{۽} \quad \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{3k}{2} \quad \text{هاڻي}$$

ڏنل شرط موجب

$$\alpha^2 + \beta^2 = 5$$



$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 5 \quad \because [a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab] \\
 &\Rightarrow \left(\frac{-3k}{2}\right)^2 - 2\left(\frac{k^2}{2}\right) = 5 \\
 &\Rightarrow \frac{9k^2}{4} - k^2 = 5 \\
 &\Rightarrow \frac{9k^2 - 4k^2}{4} = 5 \\
 &\Rightarrow 5k^2 = 5 \times 4 \\
 &\Rightarrow k^2 = 4 \\
 &\Rightarrow k = \pm 2
 \end{aligned}$$

(c) جڏهن اصل ڏنل عدد جو فرق رکن:

مثال: p جو ملهه لھو جيڪڏھن مساوات $x^2 - px + 8 = 0$ جا اصل 2 جو فرق رکن ٿا.

حل: فرض ڪريو ته مساوات $x^2 - px + 8 = 0$ جا اصل α ۽ β آھن.

$$\text{هتي } c = 8 \text{ ۽ } b = -p, a = 1$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{8}{1} = 8 \text{ ۽ } \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-p)}{1} = p \text{ هاڻي}$$

ڏنل شرط موجب

$$\alpha - \beta = 2$$

ٻنهي پاسن جو چورس ڪرڻ سان اسان کي مليو

$$(\alpha - \beta)^2 = 4$$

$$\Rightarrow (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 4 \quad [\because (a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab]$$

$$\Rightarrow p^2 - 4(8) = 4$$

$$\Rightarrow p^2 - 32 = 4$$

$$\Rightarrow p^2 = 36$$

$$\Rightarrow p = \pm 6$$

(d) جڏهن اصل ڏنل تعلق کي پورو ڪن (مثال طور تعلق $2\alpha + 5\beta = 7$ جڏهن α ۽ β مساوات جا اصل آهن)

مثال: k جو ملهه لھو جيڪڏھن مساوات $x^2 - 5x + k = 0$ جا اصل α ۽ β تعلق $2\alpha + 5\beta = 7$ کي پورو ڪن ٿا.

حل: ڏنل مساوات $x^2 - 5x + k = 0$ ۾

$$\text{هتي } c = k \text{ ۽ } b = -5, a = 1$$


فرض ڪريو ته ڏنل مساوات جا اصل α ۽ β آھن

$$\therefore \alpha\beta = \frac{c}{a} \text{ ۽ } \alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

$$\therefore \alpha + \beta = -\frac{(-5)}{1} = 5 \quad \text{تنهنڪري}$$

$$\Rightarrow \alpha = 5 - \beta \quad \dots (i)$$

$$\alpha\beta = \frac{k}{1} = k$$



$$\Rightarrow \alpha\beta = k \quad \dots (ii)$$

۽ اسان کي مليل آهي ته

$$\therefore 2\alpha + 5\beta = 7$$

$$\therefore 2(5 - \beta) + 5\beta = 7 \quad \text{يعني ته}$$

$$\Rightarrow 10 - 2\beta + 5\beta = 7$$

$$\Rightarrow 3\beta = -3$$

$$\Rightarrow \beta = -1$$

$\therefore$ مساوات (i) مان اسان وٽ آهي

$$\alpha = 5 - (-1) = 5 + 1 = 6,$$

k جي قيمت لھڻ لاءِ، اسين مساوات (ii) ۾ α ۽ β جون قيمتون رکنداسين ۽ اسان کي مليو:

$$k = 6(-1) = -6$$

$$\Rightarrow k = -6$$

(e) جيڪڏهن اصلن جي جوڙ اُپت ۽ ضرب اُپت ٻئي هڪ ڏنل عدد جي برابر هجن:

مثال: k جو ملهه لھو جيڪڏهن مساوات $6x^2 - 3kx + 5 = 0$ ۾ اصلن جي جوڙ اُپت ۽ ضرب اُپت ٻئي $\frac{5}{6}$ جي برابر آهن

حل: فرض ڪريو ته مساوات $6x^2 - 3kx + 5 = 0$ جا اصل α ۽ β آهن ته پوءِ

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-3k)}{6} = \frac{k}{2} \quad \dots (i)$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{5}{6} \quad \dots (ii)$$


ڏنل شرط موجب، اصلن جي جوڙ اُپت ۽ ضرب اُپت $\frac{5}{6}$ جي برابر آهن

$$\alpha + \beta = \alpha\beta = \frac{5}{6} \quad \text{يعني ته}$$

$$\Rightarrow \frac{k}{2} = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow k = \frac{5}{3}$$

انهي ڪري $k = \frac{5}{3}$ تي ڏنل مساوات جي اصلن جي جوڙ اُپت ۽ ضرب اُپت ٻئي $\frac{5}{6}$ جي برابر آهن.



مشق 20.3

1. حل ڪرڻ کانسواءِ، هيٺ ڏنل هر هڪ ٻه درجي مساوات جي اصلن جي جوڙ اُپت ۽ ضرب اُپت لھو.

$$2x^2 - 3x - 4 = 0 \quad (\text{ii})$$

$$x^2 - x - 1 = 0 \quad (\text{i})$$

$$7x^2 - 5kx + 7k = 0 \quad (\text{iv})$$

$$x^2 - \frac{3}{4}a^2 = ax \quad (\text{iii})$$

2. m جو ملھ لھو جيڪڏھن

(i) مساوات $x^2 + (3m - 7)x + 5m = 0$ جي اصلن جي جوڙ اُپت ان جي ضرب اُپت جو $\frac{3}{2}$ پيرا آھي

(ii) مساوات $2x^2 - 3x + 4m = 0$ جي اصلن جي جوڙ اُپت ان جي ضرب اُپت جو 6 پيرا آھي.

3. p جي قيمت لھو جيڪڏھن

(i) مساوات $x^2 - px + 6 = 0$ جي اصلن جي چورس جي جوڙ اُپت 13 جي برابر آھي.

(ii) مساوات $x^2 - 2px + (2p - 3) = 0$ جي اصلن جي چورس جي جوڙ اُپت 6 آھي

4. m جو ملھ لھو جيڪڏھن

(i) مساوات $x^2 - 5x + 2m = 0$ جا اصل پاڻ ۾ 1 جو فرق رکن ٿا.

(ii) مساوات $x^2 - 8x + m + 2 = 0$ جا اصل پاڻ ۾ 2 جو فرق رکن ٿا.

5. k جو ملھ لھو جيڪڏھن

(i) مساوات $5x^2 - 7x + k - 2 = 0$ جا اصل تعلق $2\alpha + 5\beta = 1$ کي پورو ڪن ٿا.

(ii) مساوات $3x^2 - 2x + 7k + 2 = 0$ جا اصل تعلق $7\alpha - 3\beta = 18$ کي پورو ڪن ٿا.

6. p جو ملھ لھو جيڪڏھن هيٺين ٻه درجي مساواتن جي اصلن جي جوڙ اُپت ۽ ضرب اُپت ٻئي ڏنل عدد 4 جي برابر آھن.

$$(2p + 3)x^2 + (7p - 5)x + (3p - 10) = 0 \quad (\text{i})$$

$$4x^2 - (5p + 3)x + 17 - 9p = 0 \quad (\text{ii})$$

20.4 هڪ ٻه درجي مساوات جي اصلن جو همشڪلي عمل

(Symmetric function of roots of quadratic equation)

20.4 (i) هڪ ٻه درجي مساوات جي اصلن جو همشڪلي عمل بيان ڪرڻ:


فرض ڪريو ته α ۽ β هڪ ٻه درجي مساوات جا اصل آهن ته پوءِ α ۽ β ۾ هڪ عمل f کي همشڪلي عمل (Symmetric Function) ڪوٺيو جيڪڏهن α ۽ β کي بدلائڻ سان اهو عمل ساڳيو رهي. يعني ته $f(\alpha, \beta) = f(\beta, \alpha)$ ۽ $\alpha + \beta$ ۽ $\alpha\beta$ کي α ۽ β جا بنيادي همشڪلي عمل چئبو آهي.

اها ڳالهه ڌيان ۾ رکجي ته $\alpha - \beta \neq \beta - \alpha$ ، انهيءَ لاءِ $\alpha - \beta$ اصلن جو همشڪلي عمل نه آهي.

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} \quad \text{۽} \quad \alpha\beta = \frac{c}{a} \quad \text{جو استعمال ڪندي، اسين ٻه درجي مساوات جي اصلن جو همشڪلي عمل لھي}$$

سگھون ٿا جيڪو مساوات جي عددي منڍن جي صورت ۾ هوندو

همشڪلي عمل $\alpha + \beta$ ۽ $\alpha\beta$ جي صورت ۾ ظاهر ڪري سگھجن ٿا.



همشڪلي عمل جو ملهه لهڻ لاءِ اسين ان عمل کي $\alpha + \beta$ ۽ $\alpha\beta$ جي صورت ۾ ظاهر ڪنداسين.

همشڪلي عملن جون مثالون هيٺين ريت آهن

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \quad \text{➤}$$

$$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) \quad \text{➤}$$

$$\alpha^4 + \beta^4 = (\alpha^2 + \beta^2)^2 - 2\alpha^2\beta^2 = [(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta]^2 - 2(\alpha\beta)^2 \quad \text{➤}$$

مثال: $\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta$ جو ملهه لهو جيڪڏهن $\alpha = 2$ ۽ $\beta = 3$ ۽ ثابت ڪري ڏيکاريو ته اهو α ۽ β جو همشڪلي عمل آهي. جڏهن ته β ۽ α ٻه درجي مساوات جا اصل آهن.

حل: فرض ڪريو ته $f(\alpha, \beta) = \alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta$,

ڏنل آهي ته $\alpha = 2$ ۽ $\beta = 3$

$$\therefore f(2, 3) = 2^2 + 3^2 + (2)(3) = 4 + 9 + 6 = 19$$

هاڻي

$$f(\beta, \alpha) = \beta^2 + \alpha^2 + \beta\alpha = \alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta = f(\alpha, \beta)$$

$\therefore f(\alpha, \beta) = f(\beta, \alpha)$ جيئن ته

$\therefore$ تنهنڪري f همشڪلي عمل آهي

انهيءَ ڪري ڏنل اظهار اصلن α ۽ β جو همشڪلي عمل آهي.
ثابت ٿيو

20.4 (ii) هشڪلي عمل کي گراف وسيلي ظاهر ڪرڻ:

آرٽيڪل 20.4.1 ۾ اسين اڳيئي ٻه درجي مساوات جي اصلن جا همشڪلي عمل بيان ڪري چڪا آهيون،

مثال طور $\alpha + \beta$, $\alpha\beta$, $\alpha^3 + \beta^3$, $2\alpha\beta$, $\alpha^2 + \beta^2$, $\alpha^3 + \beta^3$ وغيره.

جڏهن ڪو همشڪلي عمل (اظهار) کي مستقل $c \in \mathbb{R}$ جي برابر ڪيو وڃي ته اسان کي همشڪلي مساوات ملندي جيڪا اسان هن ريت لکنداسين $f(\alpha, \beta) = c$. هر مساوات کي گراف ۾ ٽپڪن جي سڀيت طور ظاهر ڪري سگهجي ٿو، جنهن کي $G(f)$ سان ظاهر ڪيو آهي ۽ هن ريت بيان ڪبو

$$G(f) = \{(\alpha, \beta) \mid f(\alpha, \beta) = c \wedge \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$


مثال 1: مساوات $\alpha^2 + \beta^2 = 9$ کي گراف واري صورت ۾ ظاهر ڪريو ۽ ان جو گراف ٺاهيو

حل: ڏنل آهي ته $\alpha^2 + \beta^2 = 9$

$$\Rightarrow \beta = \pm\sqrt{9 - \alpha^2}$$

گراف ڪرڻ لاءِ اسين ڪجهه ٽپڪا ڪٽنداسين. α جون مختلف

قيمتون لڳائيندي. اسان کي β جون واسطيدار قيمتون ملن ٿيون.



α	0	1	2	3	-1	-2	-3
β	± 3	± 2.828	± 2.2360	0	± 2.828	± 2.2360	0

اهڙي طرح همشڪلي عمل $\alpha^2 + \beta^2$ هڪ گول کي ظاهر ڪري ٿو

جڏهن اهو مستقل $c = 9$ جي برابر ڪيو ويو



20.4. (iii) به درجي مساوات جي اصلن جو همشكلي عمل ان جي عددي مندين جي صورت ۾ لھڻ

فرض ڪريو ته مساوات

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0 \quad (i)$$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} \quad \dots \quad (ii) \quad \text{جا اصل } \alpha \text{ ۽ } \beta \text{ آھن ته پوءِ}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} \quad \dots \quad (iii) \quad \text{۽}$$

مٿيون مساواتون (ii) ۽ (iv) به درجي مساوات (i) جي اصلن جا بنيادي همشكلي عمل ظاهر ڪن ٿيون

مثال: جيڪڏهن مساوات $x^2 - px + q = 0$ جا اصل α ۽ β آھن ته پوءِ هيٺين جو ملھ لھو

$$\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} \quad (ii) \quad \alpha^2 + \beta^2 \quad (i)$$

حل: ڏنل آهي ته مساوات $x^2 - px + q = 0$ جا اصل α ۽ β آھن.

$$c = q \text{ ۽ } b = -p, a = 1 \quad \text{هتي}$$

$$\therefore \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-p)}{1} = p$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{q}{1} = q \quad \text{۽}$$

هاڻي

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \quad \dots \quad (i)$$

$$= (p)^2 - 2q \quad (\because \alpha\beta = q \text{ ۽ } \alpha + \beta = p)$$


$$= p^2 - 2q$$

$$\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} \quad \dots \quad (ii)$$

$$= \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta}$$

$$= \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{\alpha\beta}$$

$$= \frac{p^2 - 2q}{q} \quad (\because \alpha\beta = q \text{ ۽ } \alpha + \beta = p)$$



مشق 20.4

1. جيڪڏهن α ۽ β هڪ ٻه درجي مساوات جا اصل آهن ته پوءِ هيٺين همشڪلي عملن کي $\alpha + \beta$ ۽ $\alpha\beta$ جي صورت ۾ لکو

$$\begin{array}{lll} \alpha^2\beta^{-1} + \beta^2\alpha^{-1} & \text{(iii)} & (\alpha + \beta)^3 \quad \text{(ii)} \quad (\alpha - \beta)^2 \quad \text{(i)} \\ \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta}\right)^2 & \text{(vi)} & \frac{1}{\alpha^3} + \frac{1}{\beta^3} \quad \text{(v)} \quad \alpha^3\beta + \alpha\beta^3 \quad \text{(iv)} \end{array}$$

2. جيڪڏهن مساوات $2x^2 - 3x + 7 = 0$ جا اصل α ۽ β آهن ته پوءِ هيٺين همشڪلي عملن جون قيمتون لھو.

$$\begin{array}{lll} \frac{1}{\alpha\alpha+1} + \frac{1}{\alpha\beta+1} & \text{(iii)} & \frac{\alpha}{\beta^2} + \frac{\beta}{\alpha^2} \quad \text{(ii)} \quad \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right)^2 \quad \text{(i)} \end{array}$$

3. جيڪڏهن مساوات $px^2 + qx + q = 0, p \neq 0$ جا اصل α ۽ β آهن ته پوءِ $\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} + \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}$ جو ملھ لھو.

4. همشڪلي مساوات $\alpha + \beta = 8$ کي گراف وسيلي ظاهر ڪريو جڏهن ته α ۽ β ٻه درجي مساوات جا اصل آهن ۽ گراف پڻ ٺاھيو.

20.5 ٻه درجي مساواتن جي جوڙجڪ.

(i) 20.5. ڏنل اصلن جي ٻه درجي مساوات لاءِ فارمولا.

$$0 = (x + (\text{اصلن جي ضرب اُپت})) + (x^2 - (\text{اصلن جي جوڙ اُپت}))$$

فرض ڪريو ته مساوات $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ جا اصل α ۽ β آهن

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} \quad \text{۽} \quad \alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

هاڻي مساوات (i) کي هيٺين ريت ٻيهر لکو

$$a \neq 0 \quad \text{بشرطيڪ} \quad x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - \left(-\frac{b}{a}\right)x + \frac{c}{a} = 0$$

$$\Rightarrow 0 = (x + (\text{اصلن جي ضرب اُپت})) + (x^2 - (\text{اصلن جي جوڙ اُپت}))$$


جڏهن ته $\frac{-b}{a}$ ۽ $\frac{c}{a}$ ترتيبوار اصلن جي جوڙ اُپت ۽ ضرب اُپت کي ظاهر ڪن ٿا.

هاڻي ان کي نيڪ هيٺين ريت لکي سگهون ٿا

$x^2 - Sx + P = 0$ جڏهن ته S ۽ P ڏنل ٻه درجي مساوات جي اصلن جي ترتيب وار جوڙ اُپت ۽ ضرب اُپت کي ظاهر ڪن ٿا.

مثال: ٻه درجي مساوات ٺاھيو جنهن جا اصل آهن:

$$(i) \quad -\frac{4}{5}, \frac{3}{7} \quad (ii) \quad 7 \pm 2\sqrt{5}$$



حل (i): فرض ڪريو ته $\alpha = -\frac{4}{5}$ ۽ $\beta = \frac{3}{7}$

$$\therefore S = \alpha + \beta = -\frac{4}{5} + \frac{3}{7} = \frac{-28+15}{35} = \frac{-13}{35}$$

$$P = \alpha\beta = \left(-\frac{4}{5}\right)\left(\frac{3}{7}\right) = \frac{-12}{35} \quad \text{۽}$$

جڏهن اصل مليل هجن ته مساوات ٿيندي:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

$$\text{i.e., } x^2 - \left(\frac{-13}{35}\right)x + \left(\frac{-12}{35}\right) = 0 \quad \text{يعني ته}$$

$$\Rightarrow 35x^2 + 13x - 12 = 0.$$

اها گهربل مساوات آهي.

حل (ii): فرض ڪريو ته $\alpha = 7 + 2\sqrt{5}$ ۽ $\beta = 7 - 2\sqrt{5}$

$$\therefore S = \alpha + \beta = 7 + 2\sqrt{5} + 7 - 2\sqrt{5} = 14$$

$$P = \alpha\beta = (7 + 2\sqrt{5})(7 - 2\sqrt{5}) = 49 - 20 = 29 \quad \text{۽}$$

جڏهن اصل مليل هجن ته مساوات ٿيندي:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 14x + 29 = 0$$

اها گهربل مساوات آهي.

(ii). 20.5. ٻه درجي مساوات ٺاهيو جنهن جا اصل هيٺيان آهن:

(a) $2\alpha + 1, 2\beta + 1$ (b) α^2, β^2 (c) $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ (d) $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$ (e) $\alpha + \beta, \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$,

جڏهن ته α, β هڪ ٻه درجي مساوات جا اصل آهن.

مثال: جيڪڏهن مساوات $x^2 - 5x + 6 = 0$ جا اصل α, β آهن ته پوءِ هڪ مساوات ٺاهيو جنهن جا اصل هيٺ ڏنل آهن.

(i) $2\alpha + 1, 2\beta + 1$ (ii) α^2, β^2 (iii) $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$

(iv) $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$ (v) $\alpha + \beta, \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$


حل (i): جيئن ته مساوات $x^2 - 5x + 6 = 0$ جا اصل α, β آهن ۽ هتي $a = 1, b = -5, c = 6$

تنهنڪري

$$\therefore \alpha\beta = -\frac{c}{a} = \frac{6}{1} = 6, \text{ ۽ } \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-5)}{1} = 5$$

گهربل مساوات جا اصل $2\alpha + 1$ ۽ $2\beta + 1$ آهن.

هاڻي اسين انهن جي جوڙ اُپت ۽ ضرب اُپت لهنداسين.



$$S = (2\alpha + 1) + (2\beta + 1)$$

$$\Rightarrow S = 2(\alpha + \beta) + 2$$

$$\Rightarrow S = 2(5) + 2 \quad (\because \alpha + \beta = 5)$$

$$\Rightarrow S = 10 + 2 = 12$$

$$P = (2\alpha + 1)(2\beta + 1) \quad \text{هاڻي}$$

$$P = 4\alpha\beta + 2(\alpha + \beta) + 1$$

$$\Rightarrow P = 4(6) + 2(5) + 1 \quad (\because \alpha\beta = 6 \text{ ۽ } \alpha + \beta = 5)$$

$$\Rightarrow P = 24 + 10 + 1 = 35$$

$$x^2 + 12x + 35 = 0 \quad \text{گهريل مساوات آهي.}$$

حل (ii): گهريل مساوات جا اصل α^2 ۽ β^2 آهن.

$$S = \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = (5)^2 - 2(6) = 25 - 12 = 13, (\because \alpha\beta = 6 \text{ ۽ } \alpha + \beta = 5)$$

$$P = \alpha^2\beta^2 = (\alpha\beta)^2 = (6)^2 = 36 \quad \text{۽}$$

$$\therefore x^2 - Sx + P = 0$$

$$\therefore x^2 - 13x + 36 = 0,$$

اها گهريل مساوات آهي

حل (iii): گهريل مساوات جا اصل $\frac{1}{\alpha}$ ۽ $\frac{1}{\beta}$ آهن.

$$S = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{5}{6}, \quad (\because \alpha\beta = 6 \text{ ۽ } \alpha + \beta = 5)$$

$$P = \left(\frac{1}{\alpha}\right)\left(\frac{1}{\beta}\right) = \frac{1}{\alpha\beta} = \frac{1}{6} \quad \text{۽}$$

$$x^2 - Sx + P = 0$$

$$\therefore x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{1}{6} = 0$$

$$\Rightarrow 6x^2 - 5x + 1 = 0,$$

اها گهريل مساوات آهي.

حل (iv): گهريل مساوات جا اصل $\frac{\alpha}{\beta}$ ۽ $\frac{\beta}{\alpha}$ آهن.

$$S = \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta} = \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{\alpha\beta} \quad (\because \alpha\beta = 6 \text{ ۽ } \alpha + \beta = 5)$$

$$= \frac{25 - 2(6)}{6} = \frac{25 - 12}{6} = \frac{13}{6},$$


$$P = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) = \frac{\alpha\beta}{\alpha\beta} = \frac{6}{6} = 1 \quad \text{۽}$$

$$x^2 - Sx + P = 0$$

$$\therefore x^2 - \frac{13}{6}x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 6x^2 - 13x + 6 = 0,$$

اها گهريل مساوات آهي.



حل (V): گهريل مساوات جا اصل $\alpha + \beta$ ۽ $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ آھن.

$$\begin{aligned} S &= (\alpha + \beta) + \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \\ &= (\alpha + \beta) + \left(\frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} \right) \\ &= (\alpha + \beta) \left(1 + \frac{1}{\alpha\beta} \right) \\ &= 5 \left(1 + \frac{1}{6} \right) = 5 \left(\frac{7}{6} \right) = \frac{35}{6} \end{aligned}$$

$$(\because \alpha\beta = 6 \text{ ۽ } \alpha + \beta = 5)$$

$$\begin{aligned} P &= (\alpha + \beta) \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \\ &= (\alpha + \beta) \left(\frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} \right) = \frac{(\alpha + \beta)^2}{\alpha\beta} = \frac{25}{6} \end{aligned}$$

$$(\because \alpha\beta = 6 \text{ ۽ } \alpha + \beta = 5)$$

$$x^2 - Sx + P = 0$$

$$\therefore x^2 - \frac{35}{6}x + \frac{25}{6} = 0$$

$$\Rightarrow 6x^2 - 35x + 25 = 0,$$

اھا گهريل مساوات آھي.

(iii). 20.5. α, β جون قيمتون لھڻ جڏھن هڪ مساوات جا اصل $\frac{1}{\alpha}$ ۽ $\frac{1}{\beta}$ آھن.

مثال: جيڪڏھن مساوات $x^2 - 6x + 8 = 0$ جا اصل $\frac{1}{\alpha}$ ۽ $\frac{1}{\beta}$ آھن ته پوءِ α ۽ β جون قيمتون لھو.

حل: جيئن ته مساوات $x^2 - 6x + 8 = 0$ جا اصل $\frac{1}{\alpha}$ ۽ $\frac{1}{\beta}$ آھن.

$$\text{هتي } a = 1, b = -6, c = 8$$

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = -\frac{b}{a} = -\left(\frac{-6}{1} \right) = 6,$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = 6$$


$$\Rightarrow \alpha + \beta = 6\alpha\beta \quad \dots (i)$$

$$\frac{1}{\alpha} \times \frac{1}{\beta} = \frac{c}{a} = \frac{8}{1} = 8$$

$$\Rightarrow \alpha\beta = \frac{1}{8} \quad \dots (ii)$$

مساوات (i) مان، اسان کي مليو.

$$\beta = 6 \left(\frac{1}{8} \right) - \alpha = \frac{3 - 4\alpha}{4} \quad \dots (iii)$$



مساوات (ii) ۾ β جي قيمت رکڻ سان اسان کي مليو.

$$\begin{aligned} \alpha \left(\frac{3-4\alpha}{4} \right) &= \frac{1}{8} \\ \Rightarrow \frac{8\alpha}{4} (3-4\alpha) - 1 &= 0 \\ \Rightarrow 2\alpha(3-4\alpha) - 1 &= 0 \\ \Rightarrow 6\alpha - 8\alpha^2 - 1 &= 0 \\ \Rightarrow 8\alpha^2 - 6\alpha + 1 &= 0 \\ \Rightarrow 8\alpha^2 - 4\alpha - 2\alpha + 1 &= 0 \\ \Rightarrow 4\alpha(2\alpha-1) - 1(2\alpha-1) &= 0 \\ \Rightarrow (2\alpha-1)(4\alpha-1) &= 0 \\ 2\alpha-1 &= 0 \quad \text{يا} \quad 4\alpha-1 = 0 \\ \Rightarrow \alpha &= \frac{1}{2} \quad \text{يا} \quad \alpha = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

تہ پوءِ مساوات (iii) مان اسان کي مليو:

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{3-4\left(\frac{1}{2}\right)}{4} = \frac{1}{4} \quad \text{يا} \quad \beta = \frac{3-4\left(\frac{1}{4}\right)}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \\ \beta &= \frac{1}{2} \text{ ۽ } \alpha = \frac{1}{4} \quad \text{يا} \quad \beta = \frac{1}{4} \text{ ۽ } \alpha = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

مشق 20.5

1. مساواتون ٺاهيو جن جا اصل آهن:

(i) $2, -3$ (ii) ω, ω^2 (iii) $2+i, 2-i$ (iv) $2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}$

2. جيڪڏهن مساوات $6x^2 - 3x + 1 = 0$ جا اصل α ۽ β آهن ته پوءِ اهي مساواتون ٺاهيو جن جا اصل هيٺ ڏنل آهن.

(i) $2\alpha+1, 2\beta+1$ (ii) α^2, β^2 (iii) $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$

(iv) $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$ (v) $\alpha+\beta, \frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$

3. اها مساوات لھو جنھن جا اصل ڏنل مساوات $px^2 - qx + r = 0, p \neq 0$ جي اصلن جا اُبتڙ هجن.

4. اها مساوات لھو جنھن جا اصل ڏنل مساوات $x^2 - px + q = 0$ جي اصلن جي ٻيٽ جي برابر هجن.

5. اها مساوات لھو جنھن جا اصل ڏنل مساوات $px^2 + qx + r = 0$ جي اصلن کان 2 وڌيڪ هجن.

6. اها شرط لھو جڏھن مساوات $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ جو هڪ اصل

(i) ٻيئي جو ٽيڻو هجي. (iii) ٻيئي جو جمعي اُبتڙ هجي.

(ii) ٻيئي جو چورس هجي. (iv) ٻيئي جو ضربِي اُبتڙ هجي.



20.6 به درجي صورت ۾ ايندڙ وڌڻ درجن واريون مساواتون:

(a) 20.6. کعبی یا ٽي درجي مساوات حل ڪرڻ جڏهن مساوات جو هڪ اصل مليل هجي.

فرض ڪريو ته $a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$ هڪ کعبی مساوات آهي، جنهن جو هڪ اصل α آهي.

فرض ڪريو ته $f(x) = a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$

۽ فرض ڪريو ته $f(x) = 0$ جو هڪ اصل α آهي ته پوءِ

$f(x) = (x - \alpha) \cdot f_1(x)$ جڏهن ته هڪ $f_1(x)$ هڪ به درجي اظهار آهي.

مثال: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ کي حل ڪريو جيڪڏهن ان مساوات جو هڪ اصل 1 آهي.

اهڙي طرح اسان وٽ هڪ به درجي مساوات هيٺين

$$\begin{aligned} & \text{ریت آهي.} \\ & \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \\ & \Rightarrow x^2 - 2x - 3x + 6 = 0 \\ & \Rightarrow x(x - 2) - 3(x - 2) = 0 \\ & \Rightarrow (x - 2)(x - 3) = 0 \\ & \text{i.e., } x - 2 = 0 \quad \text{يا} \quad x - 3 = 0 \\ & \Rightarrow x = 2 \quad \text{يا} \quad x = 3 \\ & \text{تنهنڪري حل سيٽ } \{1, 2, 3\} \end{aligned}$$

حل: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$
اهو ٻڌايل آهي ته هڪ اصل 1 آهي.
يعني $x = 1$ هڪ ضرب ڏيندڙ جزو آهي.
مصنوعي ورهاست واري طريقي موجب

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -6 & 11 & -6 \\ & \downarrow & 1 & -5 & 6 \\ \hline & 1 & -5 & 6 & 0 \end{array} \quad \text{پاڇي}$$

(b) 20.6. چو درجي مساوات کي حل ڪرڻ جيڪڏهن مساوات جا ٻه حقيقي اصل مليل هجن.

فرض ڪريو ته $a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 = 0, a_0 \neq 0$ هڪ چو درجي مساوات آهي ۽ ان جا ٻه

حقيقي اصل α ۽ β آهن.

جيڪڏهن α ۽ β جا به اصل آهن ته پوءِ

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta) \cdot f_1(x)$$

جڏهن ته $f_1(x)$ به درجي اظهار آهي.

مثال: چو درجي مساوات $x^4 - 9x^3 + 19x^2 + 9x - 20 = 0$ جا باقي رهيل اصل لهو جيڪڏهن به اصل 5 ۽

1 آهن.

حل: ڏنل مساوات $x^4 - 9x^3 + 19x^2 + 9x - 20 = 0$ آهي، جنهن جا ڏنل اصل 1 ۽ 5 آهن يعني ته ضرب ڏيندڙ


جزا 5 ۽ 1 آهن.

اهڙي طرح اسان وٽ به درجي مساوات هيٺين

$$\begin{aligned} & \text{ریت آهي.} \\ & \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \\ & \Rightarrow x^2 - 4x + x - 4 = 0 \\ & \Rightarrow x(x - 4) + 1(x - 4) = 0 \\ & \Rightarrow (x - 4)(x + 1) = 0 \\ & \text{يعني ته } x - 4 = 0 \quad \text{يا} \quad x + 1 = 0 \\ & \Rightarrow x = 4 \quad \Rightarrow x = -1 \\ & \text{تنهنڪري باقي رهيل اصل 4 ۽ -1 آهن.} \end{aligned}$$

مصنوعي ورهاست واري طريقي موجب
اسان وٽ آهي.

$$\begin{array}{r|rrrr} 5 & 1 & -9 & 19 & 9 & -20 \\ & \downarrow & 5 & -20 & -5 & 20 \\ \hline & 1 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ & \downarrow & 1 & -3 & -4 & \\ \hline & 1 & -3 & -4 & 0 \end{array} \quad \text{پاڇي}$$



مشق 20.6

1. هيٺين ڪعبي مساواتن جا باقي رهيل ٻه اصل لهو جيڪڏهن هڪ اصل مليل آهي.

$$x = 1 \text{ ۽ } 2x^3 - x^2 - 2x + 1 = 0 \quad (i)$$

$$x = 3 \text{ ۽ } x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0 \quad (ii)$$

$$x = 2 \text{ ۽ } x^3 - 28x + 48 = 0 \quad (iii)$$

2. هيٺين چو درجي مساواتن جا باقي رهيل اصل لهو جيڪڏهن ان جا ٻه اصل ڏنل آهن.

$$x = 1, -\frac{1}{2} \text{ ۽ } 12x^4 - 8x^3 - 7x^2 + 2x + 1 = 0 \quad (i)$$

$$x = 1, -1 \text{ ۽ } x^4 + 4x^2 - 5 = 0 \quad (ii)$$

$$x = 3, -4 \text{ ۽ } x^4 + 2x^3 - 13x^2 - 14x + 24 = 0 \quad (iii)$$

3. m جو ملهه لهو ۽ مساوات $2x^3 - 3mx^2 + 9 = 0$ جا باقي رهيل اصل ٻه لهو جيڪڏهن ان جو هڪ اصل 3 آهي.

4. جيڪڏهن مساوات $x^3 - 3ax^2 - x + 6 = 0$ جو هڪ اصل 1 آهي ته پوءِ a جي قيمت لهو. ان جا باقي رهيل اصل پڻ لهو.

5. a ۽ b جون قيمتون لهو جيڪڏهن مساوات $x^4 - ax^2 + bx + 252 = 0$ جا اصل 6 ۽ -2 آهن، ان جا باقي رهيل اصل پڻ لهو.

20.7 همزاد مساواتون (Simultaneous Equations):

ٻه يا ٻه کان وڌيڪ مساواتون گڏجي همزاد مساواتن جو مجموعو ٺاهين ٿيون، ٻن بدلجندڙن جون قيمتون لهڻ لاءِ اسان کي مساواتن جو جوڙو کپي ٿو. انهن سڀني ترتيب ڏنل جوڙن (x, y) جو سيٽ جيڪي مساواتن جي مجموعي کي پورو ڪن ٿا، ان کي مجموعي جو حل سيٽ چئبو آهي.

20.7.(i)(a) ٻن بدلجندڙن ۾ ٻن مساواتن جي مجموعي کي حل ڪرڻ جڏهن هڪ مساوات هڪ درجي ۽ ٻي مساوات ٻه درجي هجي. مساواتن جي مجموعي کي حل ڪرڻ جو مڪمل طريقو هيٺين مثالن سان واضح بيان ڪجي ٿو. جڏهن هڪ مساوات هڪ درجي ۽ ٻي مساوات ٻه درجي هجي.

مثال 1: مساواتن $4x^2 + y^2 = 68$ ۽ $2x + y = 10$ جي مجموعي کي حل ڪريو.

حل:

$$2x + y = 10 \quad \dots \quad (i)$$

$$4x^2 + y^2 = 68 \quad \dots \quad (ii) \quad \text{۽}$$

مساوات (i) مان اسان کي مليو.


$$y = 10 - 2x \quad (iii)$$

اها y جي رقم مساوات (ii) ۾ رکڻ سان اسان کي مليو:

$$4x^2 + (10 - 2x)^2 = 68$$

$$\Rightarrow 4x^2 + 100 - 40x + 4x^2 - 68 = 0$$

$$\Rightarrow 8x^2 - 40x + 32 = 0$$



$$\Rightarrow x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x - x + 4 = 0$$

$$\Rightarrow (x-4)(x-1) = 0$$

$$\Rightarrow x-4=0 \quad \text{يا} \quad x-1=0$$

$$\Rightarrow x=4 \quad \text{يا} \quad x=1$$

مساوات (iii) ۾ x جون اهي قيمتون رکڻ سان

$$y = 10 - 2(4) = 2 \quad \text{جڏهن } x = 4 \text{ ته پوءِ}$$

$$y = 10 - 2(1) = 8 \quad \text{جڏهن } x = 1 \text{ ته پوءِ}$$

اهڙي طرح حل سٽ $\{(4, 2), (1, 8)\}$ آهي.

مثال 2: مساواتن $3x - 2y = 7$ ۽ $xy = 20$ جي مجموعي کي حل ڪريو.

حل:

$$3x - 2y = 7 \quad \dots \quad (i)$$

$$xy = 20 \quad \dots \quad (ii) \quad \text{۽}$$

مساوات (i) مان اسان وٽ آهي.

$$x = \frac{7+2y}{3} \quad (iii)$$

x جي اها رقم مساوات (ii) ۾ رکندي. اسان کي مليو.

$$\left(\frac{7+2y}{3}\right)y = 20$$

$$\Rightarrow 7y + 2y^2 = 20 \times 3 = 60$$

$$\Rightarrow 2y^2 + 7y - 60 = 0$$

$$\Rightarrow 2y^2 - 8y + 15y - 60 = 0$$

$$\Rightarrow 2y(y-4) + 15(y-4) = 0$$

$$\Rightarrow (y-4)(2y+15) = 0$$

$$2y+15=0 \quad \text{يا} \quad y-4=0 \quad \text{يعني}$$


$$\Rightarrow y = -\frac{15}{2} \quad \Rightarrow \quad y = 4$$

y جون اهي قيمتون مساوات (iii) ۾ رکندي

$$x = \frac{7+2(4)}{3} = \frac{15}{3} = 5 \quad \text{جيڪڏهن } y = 4 \text{ ته پوءِ}$$

$$x = \frac{7+2\left(-\frac{15}{2}\right)}{3} = -\frac{8}{3} \quad \text{جيڪڏهن } y = -\frac{15}{2} \text{ ته پوءِ}$$

اهڙي طرح حل سٽ $\left\{(5, 4), \left(-\frac{8}{3}, -\frac{15}{2}\right)\right\}$ آهي.



(b) 20.7.(i) جڏهن ٻئي مساواتون ٻه درجي آهن:

اسين هيٺين مثالن جي ذريعي مساواتن جي ان مجموعي جي حل جي طريقي جي وضاحت ڪريون ٿا جنهن ۾ ٻئي مساواتون ٻه درجي آهن.

مثال 3: مساواتن $x^2 + y^2 = 4$ ۽ $2x^2 - y^2 = 8$ جي مجموعي کي حل ڪريو.

حل:

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \dots (i)$$

$$2x^2 - y^2 = 8 \quad \dots (ii) \text{ ۽}$$

y^2 کي خارج ڪرڻ لاءِ، اسين مساواتن (i) ۽ (ii) کي جوڙ ڪريون ٿا ۽ اسان کي مليو.

$$\therefore 3x^2 = 12$$

$$\Rightarrow x^2 = 4$$

$$\Rightarrow x = \pm 2,$$

$\therefore$ مساوات (i) ۾ $x = \pm 2$ جو استعمال ڪندي اسان کي مليو.

$$(2)^2 + y^2 = 4$$

$$\Rightarrow 4 + y^2 = 4$$

$$\Rightarrow y^2 = 4 - 4 = 0$$

$$\Rightarrow y = 0$$

$$(-2)^2 + y^2 = 4$$

$$\Rightarrow 4 + y^2 = 4$$

$$\Rightarrow y^2 = 4 - 4 = 0$$

$$\Rightarrow y = 0$$

اهڙي طرح $\{(-2, 0), (2, 0)\}$ حل سيٽ آهي.

مثال 4: مساواتن $xy = 6$ ۽ $x^2 + y^2 = 13$ جي مجموعي کي حل ڪريو.

حل:

$$x^2 + y^2 = 13 \quad \dots (i)$$

$$xy = 6 \quad \dots (ii) \text{ ۽}$$

ان قسمن جي مساواتن مان اسان مستقل رقم کي خارج ڪنداسين.

مساوات (i) کي 6 سان ۽ مساوات (ii) کي 13 سان ضرب ڪندي اسان حاصل ڪيو.

$$\therefore 6x^2 + 6y^2 = 78 \quad \dots (iii)$$

$$13xy = 78 \quad \dots (iv) \text{ ۽}$$

مساوات (iii) مان مساوات (iv) کي ڪٽ ڪندي اسان حاصل ڪيو.


$$6x^2 - 13xy + 6y^2 = 0$$

$$\Rightarrow 6x^2 - 9xy - 4xy + 6y^2 = 0$$

$$\Rightarrow 3x(2x - 3y) - 2y(2x - 3y) = 0$$

$$2x - 3y = 0 \quad \text{يا} \quad 3x - 2y = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{3y}{2} \quad \text{يا} \quad x = \frac{2y}{3}$$



مجموعي (B) ۾

$$\begin{aligned} \left(\frac{2y}{3}\right) \cdot y &= 6 & \left(\because x = \frac{2y}{3}\right) \\ \Rightarrow 2y^2 &= 3 \times 6 \\ \Rightarrow y^2 &= \frac{3 \times 6}{2} = 9 \\ \Rightarrow y &= \pm 3, \\ x &= \frac{2}{3}(\pm 3) = \pm 2 \text{ ته پوء } y = \pm 3 \\ \text{اهڙي طرح حل ٿيڻ آهي} \\ \{(3, 2), (-3, -2), (2, 3), (-2, -3)\}. \end{aligned}$$

اهڙي طرح اسان وٽ مساواتن جا ٻه جوڙا آهن.

$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} xy &= 6 \\ x &= \frac{3y}{2} \end{aligned} \right\} (A) \\ \text{۽} \\ \left. \begin{aligned} xy &= 6 \\ x &= \frac{2y}{3} \end{aligned} \right\} (B) \\ \text{مجموعي (A) ۾} \\ \left(\frac{3y}{2}\right)y &= 6, & \left(\because x = \frac{3y}{2}\right) \\ \Rightarrow 3y^2 &= 2 \times 6 \\ \Rightarrow y^2 &= \frac{2 \times 6}{3} = 4 \\ y &= \pm 2 \\ \text{جڏهن } y &= \pm 2 \text{ ته پوء } x = \frac{3}{2}(\pm 2) = \pm 3 \end{aligned}$$

(ii) 20.7. ٻه درجي مساواتن سان حل ٿيندڙ عام زندگي جا مسئلا حل ڪرڻ:

مثال 1: ٻه لاڳيتا يا سلسليوار واڌو سڄا عدد لھو، جنھن جي ضرب اپت 72 آھي.


حل: فرض ڪريو ته x ۽ $x+1$ ٻه لاڳيتا واڌو سڄا عدد آهن. ڏنل شرط موجب

$$\begin{aligned} x(x+1) &= 72 \\ \Rightarrow x^2 + x - 72 &= 0 \\ \Rightarrow (x+9)(x-8) &= 0 \text{ (جُزن وسيلي)} \\ \Rightarrow x+9=0 &\quad \text{يا} \quad x-8=0 \\ \Rightarrow x=-9 &\quad \Rightarrow \quad x=8 \\ \text{منفي عدد } x=-9 &\text{ کي نظر انداز ڪندي.} \\ \text{گهربل لاڳيتا عدد 8 ۽ 9 آهن.} \end{aligned}$$

مثال 2: هڪ مستطيلي زمين جي ٽڪري جي ايراضي 320 چورس ميٽر آهي. زمين جي ٽڪري جي ويڪرائي ان جي ڊيگهه کان 4 ميٽر گهٽ آهي. زمين جي ٽڪري جي ڊيگهه ۽ ويڪرائي لھو.

حل: فرض ڪريو ته زمين جي ٽڪري جي ڊيگهه x آهي ته پوء ان جي ويڪر $x-4$ ٿيندي. ڏنل آهي ته:

$$\begin{aligned} \text{زمين جي ٽڪري جي ايراضي} &= 320m^2 \\ \Rightarrow x(x-4) &= 320 & [\because \text{ايراضي} = \text{ويڪر} \times \text{ڊيگهه}] \\ \Rightarrow x^2 - 4x - 320 &= 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \Rightarrow x^2 - 20x + 16x - 320 &= 0 \\ \Rightarrow x(x - 20) + 16(x - 20) &= 0 \\ \Rightarrow (x - 20)(x + 16) &= 0 \\ \Rightarrow x - 20 = 0 \quad \text{يا} \quad x + 16 = 0 \\ \Rightarrow x = 20 \quad \Rightarrow x = -16 \end{aligned}$$

$x = -16$ کي نظرانداز ڪندي ڇاڪاڻ ته ڊيگهه هميشه واڌو هوندي آهي.
اهڙي طرح زمين جي ٽڪري جي ڊيگهه 20 ميٽر ۽ ويڪرائي 16 ميٽر آهي.

مشق 20.7

مساواتن جي هيٺين مجموعن کي حل ڪريو.

1. $x^2 + y^2 = 2$ ۽ $2x - y = 3$
2. $x^2 - 2x + y^2 = 0$ ۽ $2x + y = 4$
3. $4x + 3y = 25$ ۽ $\frac{4}{x} + \frac{3}{y} = 2$
4. $x^2 + (y+1)^2 = 10$ ۽ $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 25$
5. $(4x-3y)(x-y-5) = 0$ ۽ $x^2 + y^2 = 25$
6. $2x^2 - 3xy + y^2 = 0$ ۽ $x^2 + y^2 = 16$
7. $xy = 2$ ۽ $x^2 + y^2 = 5$
8. $x^2 - 2xy = 2$ ۽ $x^2 + xy = 5$
9. $y + \frac{4}{x} = 25$ ۽ $x + \frac{4}{y} = 1$
10. 12 کي بن حصن ۾ ورهايو، اهڙي طرح جو انهن جي چورس جي جوڙ اُپت انهن جي ضرب ايت جي ٻيٽ کان 4 وڌيڪ آهي.
11. هڪ عبادت گاهه جي ڊيگهه ان جي ويڪر کان 4 ميٽر وڌيڪ آهي، جيڪڏهن عبادت گاهه جي ايراضي $36m^2$ آهي ته پوءِ ان جي ڊيگهه ۽ ويڪر لھو.
12. بن عددن جي چورس جي جوڙ اُپت 100 آهي. هڪ عدد ٻئي کان 2 وڌيڪ آهي ته پوءِ عددن جا مُلھ لھو.
13. گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي پايي جي ڊيگهه عمود جي ڊيگهه کان 3 وڌيڪ آهي. جيڪڏهن ٽڪنڊي جو هٿاٿينيو 34 آهي ته پوءِ پايو ۽ عمود لھو.
14. ٻيڙ پاسي ٽڪنڊي جو عمود $12cm$ آهي، ٽڪنڊي جي غير مساوي پاسي جي اوچائي $12cm$ آهي، ٽڪنڊي جي ٽنهي پاسن جي ڊيگهه لھو.
15. بن عددن جو فرق 5 آهي ۽ انهن جي چورس جو فرق 275 آهي ته پوءِ عدد لھو.



جائزي واري مشق 20

1. درست جواب چونڊيو

- i. جيڪڏهن مساوات $2x^2 + 5x + 3 = 0$ جا حاصل p ۽ q آهن ته پوءِ $p + q =$ _____
 (a) $\frac{5}{3}$ (b) $\frac{3}{5}$ (c) $\frac{5}{2}$ (d) $-\frac{5}{2}$
- ii. جيڪڏهن مساوات $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ جا اصل $\frac{1}{\alpha}$ ۽ $\frac{1}{\beta}$ آهن ته پوءِ $\alpha + \beta =$ _____
 (a) $-\frac{b}{a}$ (b) $\frac{b}{c}$ (c) $-\frac{b}{c}$ (d) $-\frac{c}{b}$
- iii. جيڪڏهن مساوات $(p+1)x^2 + (2p+3)x + (3p+4) = 0$ جي اصلن جي جوڙ اُپت -1 آهي ته پوءِ اصلن جي ضرب اُپت _____ آهي.
 (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3
- iv. مساوات $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ جي اصلن جو قسم _____ سان حاصل ٿيندو.
 (a) اصلن جي جوڙ اُپت (b) اصلن جي ضرب اُپت
 (c) شناختي فرق (d) ڪوبه نه
- v. جيڪڏهن ٻه درجي مساوات جي اصلن جي جوڙ اُپت $\frac{b}{a}$ آهي ۽ اصلن جي ضرب اُپت $\frac{c}{a}$ آهي ته پوءِ مساوات _____ آهي.
 (a) $ax^2 + bx + c = 0$ (b) $ax^2 + bx - c = 0$
 (c) $ax^2 - bx + c = 0$ (d) $ax^2 - bx - c = 0$
- vi. گهربل مساوات _____ ٿيندي جنهن جا اصل ڏنل مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ جي اصلن جا اُبتڙ آهن.
 (a) $ax^2 + bx + c = 0$ (b) $cx^2 + bx + a = 0$
 (c) $cx^2 + ax + b = 0$ (d) $cx^2 - bx - a = 0$
- vii. جيڪڏهن مساوات $x^2 - 2x - 15 = 0$ جا اصل α ۽ β آهن ته پوءِ $\alpha^2 + \beta^2 =$ _____
 (a) 34 (b) -34 (c) 26 (d) -26
- viii. جيڪڏهن حقيقي عددي مُنڊن واري ٻه درجي مساوات جو $\Delta = b^2 - 4ac$ هڪ پورو چورس آهي ته پوءِ اصلن جو قسم _____ آهي.
 (a) حقيقي ۽ مساوي (b) حقيقي، ناطق ۽ غير مساوي
 (c) حقيقي، غير ناطق ۽ غير مساوي (d) خيالي
- ix. جيڪڏهن ٻه درجي مساوات جو هڪ اصل $2 + \sqrt{3}$ آهي ته پوءِ ٻيو اصل _____ ٿيندو.
 (a) 2 (b) $-2 + \sqrt{3}$ (c) $2 - \sqrt{3}$ (d) $-2 - \sqrt{3}$
- x. ٻه درجي مساوات _____ ٿيندي جنهن جا اصل ايڪي جا منجهيل تيان مول آهن.
 (a) $x^2 - x - 1 = 0$ (b) $x^2 - x + 1 = 0$
 (c) $x^2 + x + 1 = 0$ (d) $x^2 + x - 1 = 0$



2. هيٺين ٻه درجي مساواتن جي اصلن جو قسم لھو.

i) $x^2 - 7x + 12 = 0$

ii) $x^2 - 14x + 49 = 0$

iii) $x^2 - x + 7 = 0$

iv) $x^2 - 5 = 0$

3. k جي ڪھڙي قسم لاءِ مساوات $x^2 + kx + 4 = 0$ کي

i) مساوي اصل آھن

ii) منجھيل اصل آھن

iii) حقيقي اصل آھن

iv) ناطق اصل آھن

4. 729 جا ٽيان مول لھو.

5. هيٺين ٻه درجي مساواتن جي اصلن جي جوڙ اُپت ۽ ضرب اُپت لھو.

i) $x^2 - 7x + 29 = 0$

ii) $x^2 - px + q = 0$

iii) $7x - 8 = 5x^2$

iv) $11x = 9x^2 - 28$

6. ٻه درجي مساوات جي اصلن جي همشڪلي عمل کي بيان ڪريو.

7. اها ٻه درجي مساوات لھو جنھن جا اصل $1 - \sqrt{3}$ ۽ $1 + \sqrt{3}$ آھن.

8. اها مساوات لھو جنھن جا اصل ڏنل مساوات $x^2 - 10x + 16 = 0$ جي اصلن جا ابتڙ آھن.

9. هيٺ ڏنل ھر ھڪ مساواتن جي مجموعي کي حل ڪريو.

i) $x^2 + y^2 = 10$
 $x + y = 3$

ii) $x^2 + y^2 = 37$
 $2x + 5y = 32$

خلاصو

ٻه درجي مساوات $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ جو شناختي فرق $\Delta = b^2 - 4ac$ آھي.

i. جيڪڏھن $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ تہ پوءِ اصل حقيقي ۽ غير مساوي ھوندا.

ii. جيڪڏھن $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ تہ پوءِ اصل غير حقيقي (منجھيل يا خيالي) ھوندا.

iii. جيڪڏھن $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ تہ پوءِ اصل ناطق ۽ برابر ھوندا ۽ ھر ھڪ $-\frac{b}{2a}$ جي برابر ھوندو.

iv. جيڪڏھن a, b, c ناطق آھن ۽ $\Delta = b^2 - 4ac$ ھڪ مڪمل چورس آھي تہ پوءِ اصل ناطق ۽ غير مساوي ھوندا نہ تہ پوءِ غير ناطق ھوندا.

اڻڪي جا ٽيان مون $1, \omega, \omega^2$ آھن.

اڻڪي جي ٽئين مولن جون خاصيتون

i. اڻڪي جو ھر ھڪ منجھيل ٽيون مول ٻيئي جو چورس آھي.

ii. اڻڪي جي ٽنھي ٽئين مولن جي جوڙ اُپت ٻڙي آھي

iii. اڻڪي جي ٽنھي ٽئين مولن جي ضرب اُپت 1 آھي.

iv. اڻڪي جو ھر ھڪ منجھيل ٽيون مول ٻيئي جو ابتڙ آھي.

جيڪڏھن ٻه درجي مساوات $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ جا اصل α ۽ β آھن: تہ پوءِ

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} \quad \text{۽} \quad \alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

ٻه درجي مساوات جي اصلن جا همشڪلي عمل اُهي عمل ھوندا آھن جيڪي ساڳيا رھندا جيڪڏھن

اصلن کي بدلايو وڃي. يعني $f(\alpha, \beta) = f(\beta, \alpha)$



يونٽ


جزوي ڀاڱا

PARTIAL FRACTION

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هن يونٽ جي پڙهڻ کانپوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته

- واجب، غير واجب ۽ ناطق اڻپورن کي بيان ڪن.
- هڪ الجبرائي اڻپور کي ان جي جزوي ڀاڱن ۾ ورهائڻ جڏهن ان جو چيد مشتمل هجي.
- ❖ هڪ درجي اڻ ورجايل جزن تي
- ❖ هڪ درجي ورجايل جزن تي
- ❖ ٻه درجي اڻ ورجايل جزن تي
- ❖ ٻه درجي ورجايل جزن تي



تعارف: ڪنهن ناطق اڻپور کي ٻن يا وڌيڪ ڀاڱن جي جوڙ اُپت يا تفاوت ۾ توڙجي ته انهن ڀاڱن کي جزوي ڀاڱا چئبو آهي. جزوي ڀاڱا تڏهن ئي لهي سگهجن ٿا جڏهن انس واري گهڻ رقمي جو درجو چيد واري گهڻ رقمي جي درجي کان لازمي طور ننڍو هجي.

مثال طور

$$(i) \quad \frac{2x+3}{(x-1)(x+4)} = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+4}$$

$$(ii) \quad \frac{-(4x^2+x+11)}{(x^2+1)(x-3)} = \frac{x+2}{x^2+1} - \frac{5}{x-3}$$

21.1 واجب، غير واجب ۽ ناطق اڻپورن کي بيان ڪرڻ.

واجب اڻپور (Rational Fraction):

اسين ڄاڻون ٿا ته $\frac{P}{q}$ صورت وارو عدد ناطق عدد ڪوٺبو آهي

جيڪڏهن $p, q \in \mathbb{Z}$ ۽ $q \neq 0$ ساڳي ريت ٻن گهڻ رقمين جي ونڊ اُپت، $\frac{P(x)}{Q(x)}$ کي الجبرائي ناطق اظهار ڪوٺبو جيڪڏهن $Q(x) \neq 0$ ۽ ان کي عام طرح سان ناطق اظهار چئبو آهي.

مثال:

$$(i) \quad \frac{2x^3 - 5x^2 - 3x - 10}{x^2 - 1}$$

$$(ii) \quad \frac{5x+8}{3x^2-2x-1}$$

واجب اڻپور (Proper fraction):

هڪ ناطق اڻپور $\frac{P(x)}{Q(x)}$ کي واجب اڻپور ڪوٺبو جيڪڏهن انس $P(x)$ جو درجو، چيد $Q(x)$ جي درجي کان ننڍو هجي.

مثال:

$$(i) \quad \frac{9x^2 - 9x + 6}{(x-1)(2x-1)(x+2)}$$

$$(ii) \quad \frac{6x+27}{3x^3-9x}$$

غير واجب اڻپور (Improper fraction):

هڪ ناطق اڻپور $\frac{P(x)}{Q(x)}$ غير واجب اڻپور ڪوٺبو جيڪڏهن انس $P(x)$ جو درجو چيد $Q(x)$ جي درجي جي برابر هجي يا ان کان وڏو هجي.

مثال:

$$(i) \quad \frac{2x^3 - 5x^2 - 3x - 10}{x^2 - 1}$$

$$(ii) \quad \frac{6x^3 - 5x^2 - 7}{3x^2 - 2x - 1}$$

$$(iii) \quad \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$$



ڪوبه غير واجب اڻپور هڪ گهڻ رقمي ۽ واجب اڻپور جي جوڙ اُپت ۾ ورهائي سگهجي ٿو

مثال طور:

$$\frac{3x^2 - 2x + 1}{x + 2} = 3x - 8 + \frac{17}{x + 2}$$

هتي $\frac{3x^2 - 2x + 1}{x + 2}$ هڪ غير واجب اڻپور. $3x - 8$ هڪ گهڻ رقمي ۽ $\frac{17}{x + 2}$ هڪ واجب اڻپور آهي

هڪ غير واجب اڻپور کي گهڻ رقمي ۽ واجب اڻپور جي جوڙ اُپت ۾ رهائڻ لاءِ اسان کي انس کي چيد سان ونڊ ڪرڻ جي ضرورت پوندي.

21.2 جزوي ڀاڱن ۾ هڪ اڻپور جي تحليل:

هڪ ناطق اڻپور کي. جزوي ڀاڱن ۾ ورهائڻ لاءِ، اهو لازمي آهي ته، ناطق اڻپور واجب اڻپور هجي جيڪڏهن اهو نه آهي ته پوءِ ان کي لازمي طور واجب اڻپور ۾ ونڊ وسيلي بدلائبو.

21.2.(i) هڪ آڻجبراني اڻپور کي ان جي جزوي ڀاڱن ۾ ورهائڻ جڏهن ان جو چيد مشتمل هجي.

- هڪ درجي ان ورجايل جزن تي (Non- repeated linear factors)
- هڪ درجي ورجايل جزن تي (Repeated linear factors)
- ٻه درجي ان ورجايل جزن تي (Non- repeated quadratic factors)
- ٻه درجي ورجايل جزن تي (Repeated quadratic factors)

صورت 1: جڏهن چيد هڪ درجي ان ورجايل جزن تي مشتمل هجي.

فرض ڪريو ته $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ هڪ ناطق اڻپور آهي جڏهن ته ان جو چيد $Q(x)$

هڪ درجي ان ورجايل جزن جو ضرب اُپت هجي جيڪو هيٺين ريت لکبو

$$Q(x) = (x - a_1)(x - a_2)(x - a_3) \dots (x - a_n)$$

هاڻي $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ هيٺين ريت ورهائي سگهجي ٿو

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - a_1} + \frac{A_2}{x - a_2} + \frac{A_3}{x - a_3} + \dots + \frac{A_n}{x - a_n}$$

هتي مستقلن $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ کي

ڳوليو ويندو. هيٺين مثالن ذريعي ان طريقي جي وضاحت ڪجي ٿي،


مثال 1:

$$\text{ڪي جزوي ڀاڱن ۾ ورهائبو} \quad \frac{11 - 3x}{(x - 1)(x + 3)}$$

حل:

$$\frac{11 - 3x}{(x - 1)(x + 3)} = \frac{A_1}{(x - 1)} + \frac{A_2}{(x + 3)} \quad \dots \text{ (i)}$$

فرض ڪريو ته A_1 ۽ A_2 نامعلوم مستقل آهن جن کي معلوم ڪبو مساوات (i) مان



$$\frac{11-3x}{(x-1)(x+3)} = \frac{A_1(x+3) + A_2(x-1)}{(x-1)(x+3)} \quad \text{مساوات (i) مان،}$$

ٻنهي پاسن کي $(x-1)(x+3)$ سان ضرب ڪندي، اسان حاصل ڪيو

$$11-3x = A_1(x+3) + A_2(x-1) \dots (ii)$$

مستقل A_1 ۽ A_2 لھڻ لاءِ x جون قيمتون چونڊيون
 A_1 حاصل ڪرڻ لاءِ، اسين مساوات (ii) جي ٻنهي پاسن ۾ $x = 1$ رکنداسين

$$11-3(1) = A_1(1+3) + A_2(0) \quad \text{اسان کي مليو}$$

$$\Rightarrow 8 = 4A_1$$

$$\Rightarrow A_1 = 2$$

A_2 حاصل ڪرڻ لاءِ اسين مساوات (ii) ۾ $x = -3$ رکنداسين

$$11-3(-3) = A_1(0) + A_2(-3-1) \quad \text{اسان کي مليو}$$

$$\Rightarrow 20 = -4A_2$$

$$\Rightarrow A_2 = -5$$

آخر ۾ مساوات (i) ۾ A_1 ۽ A_2 جون قيمتون رکندي

$$\frac{11-3x}{(x-1)(x+3)} = \frac{2}{x-1} + \frac{-5}{x+3} \quad \text{اسان حاصل ڪيو.}$$

مثال 2:

$$\frac{6x^3 + 5x^2 - 7}{2x^2 - x - 1} \quad \text{کي جزوي ڀاڱن ۾ ورهايو.}$$

حل: جيئن ته ڏنل ناطق اڻپور هڪ غير واجب اڻپور آهي. انهي ڪري اسان کي چيد سان ونڊ ڪندي.

اهو اڻپور، واجب اڻپور ۾ بدلائبو. جيڪو هيٺ ڏنل آهي

$$\frac{6x^3 + 5x^2 - 7}{2x^2 - x - 1} = \frac{6x^3 + 5x^2 - 7}{(x-1)(2x+1)} = 3x + 4 + \frac{7x-3}{(x-1)(2x+1)} \dots (i)$$


هاڻي اسين اظهار $\frac{7x-3}{(x-1)(2x+1)}$ کي جزوي ڀاڱن ۾ ورهائڻ لاءِ ڪٽون ٿا.

$$\frac{7x-3}{(x-1)(2x+1)} = \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{2x+1} \dots (ii) \quad \text{فرض ڪريو ته}$$

هتي A_1 ۽ A_2 نامعلوم مستقل آهن جيڪي معلوم ڪيا.

مساوات (ii) مان

$$\frac{7x-3}{(x-1)(2x+1)} = \frac{A_1(2x+1) + A_2(x-1)}{(x-1)(2x+1)}$$



ٻنهي پاسن کي $(x-1)(2x+1)$ سان ضرب ڪندي
اسان کي مليو

$$7x-3=A_1(2x+1)+A_2(x-1) \quad \dots \quad (iii)$$

مستقل A_1 ۽ A_2 معلوم ڪرڻ لاءِ x جون قيمتون چونڊيون

A_1 جو ملهه لهڻ لاءِ، مساوات (iii) ۾ $x=1$ رکندي

$$7(1)-3=A_1(2+1)+A_2(0)$$

$$4=3A_1$$

$$A_1=\frac{4}{3}$$

A_2 جو ملهه لهڻ لاءِ مساوات (iii) ۾ $x=-\frac{1}{2}$ رکندي

$$7\left(-\frac{1}{2}\right)-3=A_1(0)+A_2\left(-\frac{1}{2}-1\right)$$

$$-\frac{13}{2}=-\frac{3}{2}A_2$$

$$A_2=\frac{13}{3}$$

مساوات (ii) ۾ مستقلن A_1 ۽ A_2 جون قيمتون رکندي، اسان کي مليو

$$\frac{7x-3}{(x-1)(2x+1)}=\frac{4}{3(x-1)}+\frac{13}{3(2x+1)}$$

آخر ۾، مساوات (i) هن ريت ٿيندي.

$$\frac{6x^3+5x^2-7}{2x^2-x-1}=3x+4+\frac{4}{3(x-1)}+\frac{13}{3(2x+1)}$$

مشق 21.1

هينين کي جزوي ڀاڱن ۾ ورهايو.

1. $\frac{12}{x^2-9}$

2. $\frac{4(x-4)}{x^2-2x-3}$


3. $\frac{x^2-3x+6}{x(x-2)(x-1)}$

4. $\frac{3(2x^2-8x-1)}{(x+4)(x-1)(2x-1)}$

5. $\frac{x^2+9x+8}{x^2+x-6}$

6. $\frac{x^2-x-14}{x^2-2x-3}$

7. $\frac{3x^3-2x^2-16x+20}{(x-2)(x+2)}$



صورت II: جڏهن چيد هڪ درجي ورجايل جزن تي مشتمل هجي.

فرض ڪريو ته $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ هڪ ناطق اڻپور آهي جڏهن ته ان جو چيد $Q(x)$ هڪ درجي ورجايل جزن جي ضرب

اُپت آهي جنهن کي هن ريت لکي سگهجي ٿو: $Q(x) = (x-a)^n$

هاڻي $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ هيٺين ريت ورهائبو:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{(x-a)^1} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \frac{A_3}{(x-a)^3} + \dots + \frac{A_n}{(x-a)^n}.$$

هتي مستقل $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ معلوم ڪري سگهجن ٿا. اهو طريقو هيٺين مثالن ذريعي واضح ڪيو ويو آهي.

مثال 1:

جزيي ڀاڱن ۾ ورهائبو. $\frac{2x+3}{(x-2)^2}$ کي

حل:

$$\frac{2x+3}{(x-2)^2} = \frac{A_1}{(x-2)} + \frac{A_2}{(x-2)^2} \dots (i)$$

هتي A_1 ۽ A_2 نامعلوم مستقل آهن جيڪي معلوم ڪبا

مساوات (i) مان

$$\frac{2x+3}{(x-2)^2} = \frac{A_1(x-2) + A_2}{(x-2)^2}$$

ٻنهي پاسن کي $(x-2)^2$ سان ضرب ڪندي

$$2x+3 = A_1(x-2) + A_2$$

$$2x+3 = A_1x - 2A_1 + A_2 \quad (ii)$$

مستقل A_1 ۽ A_2 لهن لاءِ اسان مساوات (ii) جون ساڳيون رقمون برابر رکنداسين

هاڻي مساوات (ii) ۾ x جا عددي منڍ برابر رکندي، اسان کي مليو

$$2 = A_1$$

وري مساوات (ii) ۾ مستقلن کي برابر رکندي، اسان حاصل ڪيو.


$$3 = -2A_1 + A_2$$

$$\Rightarrow 3 = -2(2) + A_2 \quad (\because A_1 = 2)$$

$$\Rightarrow 7 = A_2$$

آخر ۾ مساوات (i) ۾ A_1 ۽ A_2 جون قيمتون رکندي اسان حاصل ڪيو

$$\frac{2x+3}{(x-2)^2} = \frac{2}{(x-2)} + \frac{7}{(x-2)^2}$$



مثال 2:

کي جزوي ڀاڱن ۾ ورهايو $\frac{5x^2 - 2x - 19}{(x+3)(x-1)^2}$

حل: فرض ڪريو ته

$$\frac{5x^2 - 2x - 19}{(x+3)(x-1)^2} = \frac{A_1}{(x+3)} + \frac{A_2}{(x-1)} + \frac{A_3}{(x-1)^2} \quad \dots (i)$$

هتي A_1, A_2, A_3 نامعلوم مستقل آهن جن جون قيمتون معلوم ڪيون.

مساوات (i) جي ٻنهي پاسن کي $(x+3)(x-1)^2$ سان ضرب ڪندي،

$$5x^2 - 2x - 19 = A_1(x-1)^2 + A_2(x+3)(x-1) + A_3(x+3) \quad \dots (ii)$$

$$\Rightarrow 5x^2 - 2x - 19 = A_1x^2 + 2A_1x + A_1 + A_2x^2 + 2A_2x - 3A_2 + A_3x + 3A_3$$

$$5x^2 - 2x - 19 = (A_1 + A_2)x^2 + (A_3 + 2A_2 - A_1)x + (A_1 - 3A_2 + 3A_3) \quad \dots (iii)$$

مستقلن A_1, A_2, A_3 کي لهڻ لاءِ، x جون قيمتون چونڊيون. A_1 جي قيمت لهڻ لاءِ، اسان مساوات (ii) ۾ $x = -3$ رکنداسين ته اسان کي مليو.

$$5(-3)^2 - 2(-3) - 19 = A_1(-4)^2 + A_2(0)(-4) + A_3(0)$$

$$\Rightarrow 32 = 16A_1$$

$$\Rightarrow A_1 = 2$$

هاڻي مساوات (iii) جي ٻنهي پاسن جي ساڳي رقمن کي برابر رکنداسين

مساوات (iii) x^2 جي عددي منڍن کي برابر رکندي، اسان حاصل ڪيو

$$5 = A_1 + A_2$$

$$\Rightarrow 5 = 2 + A_2 \quad (\because A_1 = 2)$$

$$\Rightarrow A_2 = 3$$

وري مساوات (iii) ۾ x جي عددي منڍن کي برابر رکندي، اسان حاصل ڪيو

$$-2 = A_3 + 2(3) - 2(2)$$

$$-2 = A_3 + 2$$

$$A_3 = -4$$

آخر ۾ مستقلن A_1, A_2, A_3 جون قيمتون مساوات (i) ۾ رکڻ سان، اسان حاصل ڪيو

$$\frac{5x^2 - 2x - 19}{(x+3)(x-1)^2} = \frac{2}{(x+3)} + \frac{3}{(x-1)} - \frac{4}{(x-1)^2}$$

مشق 21.2

هينين کي جزوي ڀاڱن ۾ ورهايو


1. $\frac{4x-3}{(x+1)^2}$

2. $\frac{x^2+7x+3}{x^2(x+3)}$

3. $\frac{5x^2-30x+44}{(x-2)^3}$

4. $\frac{18+21x-x^2}{(x-5)(x+2)^2}$

5. $\frac{x^2-x+3}{(x-1)^3}$



صورت III: جڏهن چيد ٻه درجي اڻ ورجايل جزن تي مشتمل هجي.

فرض ڪريو ته $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ هڪ ناطق اڻپور آهي جڏهن ته ان جو چيد $Q(x)$ ٻه درجي ناقابل تخفيف ۽ اڻ ورجايل جزن جو ضرب اُپت آهي.

هاڻي $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ هن هيٺين ريت ورهائبو

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1x + A_2}{a_1x^2 + b_1x + c_1} + \frac{A_3x + A_4}{a_2x^2 + b_2x + c_2} + \dots + \frac{A_{2n-1}x + A_{2n}}{a_nx^2 + b_nx + c_n}$$

هتي مستقلن $A_{2n}, \dots, A_3, A_2, A_1$ کي معلوم ڪبو هيٺين مثالن ذريعي طريقي کي واضح ڪيو ويو آهي.

مثال 1:

$$\text{جي جزوي ڀاڱن ۾ ورهائبو.} \quad \frac{7x^2 + 5x + 13}{(x+1)(x^2+2)}$$

حل:

فرض ڪريو ته

$$\frac{7x^2 + 5x + 13}{(x+1)(x^2+2)} = \frac{A_1}{x+1} + \frac{A_2x + A_3}{x^2+2} \quad \dots (i)$$

هتي A_1, A_2, A_3 نامعلوم مستقل آهن جيڪي معلوم ڪبا.

مساوات (i) جي ٻنهي پاسن کي $(x+1)(x^2+2)$ سان ضرب ڪندي، اسان حاصل ڪيو

$$7x^2 + 5x + 13 = A_1(x^2+2) + (A_2x + A_3)(x+1) \quad \dots (ii)$$

$$\Rightarrow 7x^2 + 5x + 13 = A_1x^2 + 2A_1 + A_2x^2 + A_2x + A_3x + A_3$$

$$\Rightarrow 7x^2 + 5x + 13 = (A_1 + A_2)x^2 + (A_2 + A_3)x + (2A_1 + A_3) \quad \dots (iii)$$

مستقلن A_1, A_2, A_3 کي لهڻ لاءِ x جون قيمتون چونڊيون. A_1 کي لهڻ لاءِ اسين

مساوات (ii) ۾ $x = -1$ رکي حاصل ڪيون ٿا.

$$7(-1)^2 + 5(-1) + 13 = A_1((-1)^2 + 2) + (A_2(-1) + A_3)(-1+1)$$

$$\Rightarrow 15 = 3A_1$$

$$\Rightarrow A_1 = 5$$

مساوات (iii) جي ساڳي رقمن کي برابر رکندي اسان حاصل ڪيو


$$5 = A_2 + A_3 \quad \text{۽} \quad 7 = A_1 + A_2$$

$$\Rightarrow 5 = 2 + A_3 \quad \Rightarrow 7 = 5 + A_2$$

$$\Rightarrow A = 3 \quad \Rightarrow A_2 = 2$$

آخر ۾ مساوات (i) ۾ A_1, A_2, A_3 جون قيمتون رکندي اسان حاصل ڪيو

$$\frac{7x^2 + 5x + 13}{(x+1)(x^2+2)} = \frac{5}{(x+1)} + \frac{2x+3}{(x^2+2)}$$



مثال 2:

ڪي جزوي ڀاڱن ۾ ورهايو $\frac{2x+7}{(x^2+3)(x^2+6)}$

حل:

فرض ڪريو ته

$$\frac{2x+7}{(x^2+3)(x^2+6)} = \frac{A_1x+A_2}{x^2+3} + \frac{A_3x+A_4}{x^2+6} \quad \dots (i)$$

هتي A_1, A_2, A_3, A_4 نامعلوم مستقل آهن جيڪي معلوم ڪيا

مساوات (i) جي ٻنهي پاسن کي $(x^2+3)(x^2+6)$ سان ضرب ڪندي اسان حاصل ڪيو

$$2x+7 = (x^2+6)(A_1x+A_2) + (x^2+3)(A_3x+A_4) \\ \Rightarrow 2x+7 = (A_1+A_3)x^3 + (A_2+A_4)x^2 + (6A_1+3A_3)x + (6A_2+3A_4) \quad \dots (ii)$$

مساوات (ii) جي ٻنهي پاسن جي ساڳي رقمن کي برابر رکندي، اسان حاصل ڪيو.

$$A_1+A_3=0 \quad \dots (iii)$$

$$A_2+A_4=0 \quad \dots (iv)$$

$$6A_1+3A_3=2 \quad \dots (v)$$

$$6A_2+3A_4=7 \quad \dots (vi)$$

مساوات (iii) ۽ (v) کي گڏ حل ڪندي اسان کي مليو $A_3 = -\frac{2}{3}$ ۽ $A_1 = \frac{2}{3}$

ساڳي ريت $A_4 = -\frac{7}{3}$ ۽ $A_2 = \frac{7}{3}$

آخر ۾ مستقلن A_1, A_2, A_3, A_4 جون قيمتون مساوات (i) ۾ رکندي اسان حاصل ڪيو

$$\frac{2x+7}{(x^2+3)(x^2+6)} = \frac{\frac{2}{3}x + \frac{7}{3}}{x^2+3} + \frac{-\frac{2}{3}x - \frac{7}{3}}{x^2+6} = \frac{2x+7}{3(x^2+3)} + \frac{2x-7}{3(x^2+6)}$$

مشق 21.3

هيٺين کي جزوي ڀاڱن ۾ ورهايو

$$1. \frac{x^2-x-13}{(x^2+7)(x-2)}$$

$$2. \frac{6x-5}{(x^2+10)(x+1)}$$

$$3. \frac{15+5x+5x^2-4x^3}{x^2(x^2+5)}$$


$$4. \frac{3x^2-x+1}{(x+1)(x^2-x+3)}$$

$$5. \frac{x^2-x+2}{(x+1)(x^2+3)}$$

صورت 1v: جڏهن چيد ٻه درجي ورجايل جڙن تي مشتمل هجي.

فرض ڪريو ته $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ هڪ ناطق اڻپور آهي جڏهن ته ان جي چيد $Q(x)$ کي ٻه درجي ناقابل تخفيف

۽ ورجايل جزا آهن. سولائي خاطر ان کي هن ريت ڪٽبو $Q(x) = (ax^2+bx+c)^n$



هاڻي $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ هيٺين ريت ورهائبو

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1x + A_2}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_3x + A_4}{(ax^2 + bx + c)^2} + \dots + \frac{A_{2n-1}x + A_{2n}}{(ax^2 + bx + c)^n}.$$

هتي مستقل $A_n, \dots, A_3, A_2, A_1$ معلوم ڪبا
هيٺين مثالن جي ذريعي طريقي کي واضح ڪجي ٿو.

مثال 1:

$$\frac{5x^2 + 2}{(x^2 + x + 1)^2} \text{ کي جُزوي ڀاڱن ۾ ورهائبو}$$

حل: فرض ڪريو ته

$$\frac{5x^2 + 2}{(x^2 + x + 1)^2} = \frac{A_1x + A_2}{x^2 + x + 1} + \frac{A_3x + A_4}{(x^2 + x + 1)^2} \quad \dots \text{ (i)}$$

هتي A_4, A_3, A_2, A_1 نامعلوم مستقل آهن جيڪي معلوم ڪبا

مساوات (i) جي ٻنهي پاسن کي $(x^2 + x + 1)^2$ سان ضرب ڪندي اسان حاصل ڪيو

$$5x^2 + 2 = (x^2 + x + 1)(A_1x + A_2) + A_3x + A_4$$

$$\Rightarrow 5x^2 + 2 = x^3A_1 + x^2A_1 + x^2A_2 + xA_1 + xA_2 + xA_3 + A_2 + A_4$$

$$\Rightarrow 0x^3 + 5x^2 + 0x + 2 = x^3A_1 + x^2(A_1 + A_2) + x(A_1 + A_2 + A_3) + (A_2 + A_4) \dots \text{ (ii)}$$

مساوات (ii) جي ٻنهي پاسن جي ساڳي رقمن کي برابر ڪندي، اسان کي مليو

$$A_1 = 0 \quad \dots \text{ (iii)}$$

$$A_1 + A_2 = 5 \quad \dots \text{ (iv)}$$

$$A_1 + A_2 + A_3 = 0 \quad \dots \text{ (v)}$$

$$A_2 + A_4 = 2 \quad \dots \text{ (vi)}$$

مساوات (iv) ۾ $A_1 = 0$ رکندي اسان کي مليو $A_2 = 5$

ساڳي ريت مساوات (v) ۾ A_1 ۽ A_2 جي قيمت رکندي، اسان کي مليو

$$0 + 5 + A_3 = 0$$

$$\Rightarrow A_3 = -5$$


وري، مساوات (vi) ۾ A_2 جي قيمت رکڻ سان

$$5 + A_4 = 2$$

$$\Rightarrow A_4 = -3$$

آخر ۾ مساوات (i) ۾ مستقلن A_4, A_3, A_2, A_1 جون قيمتون رکڻ سان، اسان کي مليو

$$\frac{5x^2 + 2}{(x^2 + x + 1)^2} = \frac{0x + 5}{x^2 + x + 1} + \frac{-5x - 3}{(x^2 + x + 1)^2}$$



مثال 2:

کي جزوي ڀاڱن ۾ ورهايو. $\frac{x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x(x^2 + 1)^2}$

حل:

فرض ڪريو ته

$$\frac{x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x(x^2 + 1)^2} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2x + A_3}{(x^2 + 1)} + \frac{A_4x + A_5}{(x^2 + 1)^2} \quad \dots \quad (i)$$

هتي A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 نامعلوم مستقل آهن جيڪي معلوم ڪبا

مساوات (i) جي ٻنهي پاسن کي $x(x^2 + 1)^2$ سان ضرب ڪندي اسان حاصل ڪيو

$$\begin{aligned} x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 &= A_1(x^2 + 1)^2 + x(A_2x + A_3)(x^2 + 1) + x(A_4x + A_5) \\ \Rightarrow x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 &= A_1x^4 + 2A_1x^2 + A_1 + A_2x^4 + A_2x^2 + A_3x^3 + A_3x + A_4x^2 + A_5x \\ \Rightarrow x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 &= (A_1 + A_2)x^4 + A_3x^3 + (2A_1 + A_2 + A_4)x^2 + (A_3 + A_5)x + A_1 \quad \dots \quad (ii) \end{aligned}$$

مستقل A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 لھڻ لاءِ اسان مساوات (ii) جي ساڳي رقمن کي برابر رکنداسين هاڻي اسان وٽ آهي

$$\begin{aligned} 1 &= A_1 + A_2 & \dots \quad (iii) \\ 1 &= A_3 & \dots \quad (iv) \\ 1 &= 2A_1 + A_2 + A_4 & \dots \quad (v) \\ 1 &= A_3 + A_5 & \dots \quad (vi) \\ 1 &= A_1 & \dots \quad (vii) \end{aligned}$$

مساوات (iii) ۾، A_1 جي قيمت رکندي، اسان کي مليو

$$\begin{aligned} 1 &= A_1 + A_2 \\ \Rightarrow 1 &= 1 + A_2 \\ \Rightarrow A_2 &= 0 \end{aligned}$$

مساوات (vi) ۾ A_3 جي قيمت رکندي، اسان کي مليو


$$\begin{aligned} 1 &= 1 + A_5 \\ A_5 &= 0 \end{aligned}$$

مساوات (v) ۾ A_1 ۽ A_2 جون قيمتون رکندي، اسان کي مليو

$$\begin{aligned} 1 &= 2(1) + (0) + A_4 \\ A_4 &= -1 \end{aligned}$$

آخر ۾ مساوات (i) ۾ A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 جون قيمتون رکندي، اسان حاصل ڪيو

$$\frac{x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x(x^2 + 1)^2} = \frac{1}{x} + \frac{1}{(x^2 + 1)} - \frac{x}{(x^2 + 1)^2}$$



مشق 21.4

هينين کي جزوي ڀاڱن ۾ ورهايو

$$\begin{array}{ll}
 1. \quad \frac{x^2}{(x^2+1)^2(1-x)} & 2. \quad \frac{x^2+x+2}{x^2(x^2+3)^2} \\
 3. \quad \frac{x^2}{(1+x)(1+x^2)^2} & 4. \quad \frac{7}{(x+1)(2+x^2)^2} \\
 5. \quad \frac{49}{(x-2)(3+x^2)^2}
 \end{array}$$

جائزي واري مشق 21

1. دُرست جواب چونڊيو

i. هڪ غير واجب اڻپور _____ جي ذريعي واجب اڻپور ۾ آڻي سگهجي ٿو.

(a) جوڙ (b) ضرب

(c) ڪٽ (d) ونڊ

ii. جي جزوي ڀاڱن جي صورت _____ آهي.

$$\frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + \frac{C}{x-c} \quad (b) \quad \frac{A}{x+a} + \frac{B}{x+b} + \frac{C}{x+c} \quad (a)$$

$$\frac{A}{x+a} + \frac{B}{x-b} + \frac{C}{x+c} \quad (c) \quad \text{ڪوبه نه} \quad (d)$$

iii. جا جزوي ڀاڱا _____ آهن

$$\frac{1}{x} + \frac{x+1}{x^2+3} \quad (b) \quad \frac{-1}{x} - \frac{x-1}{x^2+3} \quad (a)$$

$$\frac{-1}{x} + \frac{x+1}{x^2+3} \quad (d) \quad \frac{1}{x} - \frac{x+1}{x^2+3} \quad (c)$$


iv. هڪ _____ آهي.

(a) واجب اڻپور (b) غير واجب اڻپور

(c) هڪ ذاتي عنصر (d) مستقل رقم

v. اڻپور _____ کي چئبو آهي.

(a) واجب اڻپور (b) غير واجب اڻپور (c) ٻئي واجب ۽ غير واجب اڻپور (d) ڪوبه نه



2. واجب، غير واجب ۽ ناطق اڻپور کي بيان ڪريو

3. هيٺين کي جزوي ڀاڱن ۾ ورهايو

$$\frac{9x^2 + 5x + 7}{x(x+2)(x-5)} \quad (\text{ii}) \quad \frac{5x+8}{(x-1)(x+2)} \quad (\text{i})$$


$$\frac{x^3 + 8x^2 + 9}{(x^2 + x + 1)(x+1)} \quad (\text{iv}) \quad \frac{x^2 + 2x + 3}{(x^2 + 1)(x-2)} \quad (\text{iii})$$

$$\frac{7x+3}{(x-1)^2(x+2)} \quad (\text{vi}) \quad \frac{x+5}{(x^2+1)^2(x-3)} \quad (\text{v})$$

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هي يونٽ پڙهڻ کانپوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- تعدادي تقسيم جي باري ۾ ڄاڻڻ ۽ سڪن ته ڪيئن:
 - ❖ گروهي تعدادي جدول جي جوڙجڪ ڪجي.
 - ❖ برابر جماعتي وقفن وارا ڪالمي نقشا ٺاهجن.
 - ❖ غير مساوي جماعتن وارا ڪالمي نقشا ٺاهجن.
 - ❖ تعدادي گهٽ پاسي جي جوڙجڪ ڪجي.
- مجموعي تعدادي ورهاست جي باري ۾ ڄاڻڻ ۽ سڪن ته ڪيئن:
 - ❖ هڪ مجموعي تعدادي جدول جي جوڙجڪ ڪجي.
 - ❖ مجموعي تعدادي گهٽ پاسو ٺاهجي.
- مرڪزي رجحانن جي ماپن جي باري ۾ ڄاڻڻ ۽ سڪن ته ڪيئن
 - ❖ گروهي ۽ غير گروهي مواد لاءِ هيٺيان لهجن.
 - ❖ حسابي سراسري وصف وسيلي ۽ فرض سراسري کان انحرافن جو استعمال ڪندي.
 - ❖ مڌياني سراسري، ڪثرتي سراسري، مهندسي سراسري ۽ هارموني سراسري.
- حسابي سراسري جي خاصيتن جي سڃاڻپ ڪن.
- قدرتي سراسري ۽ متحرڪ سراسري لهن.
- مڌيان، چوٽائي ڪندڙ مشاهدن ۽ ڪثرتي سراسري جو گراف وسيلي اندازو لڳائين.
- پڪڙجڻ جي پيمانن جي باري ۾ ڄاڻڻ ۽ سڪن ته ڪيئن:
 - ❖ وسعت جي وصف بيان، سڃاڻپ ۽ ماپ ڪجي. تغير، سراسري انحراف ۽ معياري انحراف لهجي.



تعارف (Introduction):

شماريات (Statistics) رياضي جي هڪ مکيه شاخ آهي جنهن جو واسطو مواد جي ميٽر، ترتيب، اظهار، تشريح ۽ تجزيئي سان هوندو آهي ته جيئن بامعني نتيجا ۽ نمونا ڪڍيا وڃن. جيڪي دانشمنداڻا فيصلا ۽ ڪارگر حڪمت عملي ٺاهڻ ۾ مدد ڏين ٿا. اسين اڳيئي سادي مواد جي درجہ بندي، گراف ذريعي اظهار ۽ ڪجهه مرڪزي رجحان جي ماپن واري بنيادي تصورن سان واقف آهيون. هتي اسين انهن جي تفصيل سان کوجنا ڪنداسين ۽ تصورن کي متحرڪ سراسريون ۽ پڪڙجڻ جي ماپن ڏانهن وڌائينداسين.

مواد (Data) ڪنهن به شمارياتي چاچ جو بنياد آهي ۽ اهو دلچسپي واري بدلجندڙ تي سوال پڇڻ، ڳڻپ ۽ ماپ ڪرڻ، رپورٽس، خبرون، مضمون ڏسڻ سان گڏ ٿيندو آهي. مواد جي بلڪل بنيادي صورت خام مواد (Raw data) آهي جيڪو غير جماعتي يا غير گروهه (Unclassified/ungrouped) آهي ۽ ان مان سڌي ريت ڪو بامعني نتيجو ڪڍڻ مشڪل آهي.

اهڙو مواد جائزن، ڳالهه ٻولهه (انٽرويو) ۽ سوالنامن جو استعمال ڪندي حاصل ٿئي ٿو انهن کي مواد جا بنيادي ذريعا (Primary sources) پڻ چئبو آهي. خام يا غير گروهه مواد جي درجہ بندي ڪرڻ ۽ ترتيب ڏيڻ کانپوءِ اسين گروهه يا درجہ بندي ٿيل مواد (Grouped or classified data) ذريعي ڪارائتي معلومات حاصل ڪري سگهون ٿا. اخبارن، رپورٽن ۽ مضمونن کي ثانوي مواد جا ذريعا (Secondary sources) ڪوٺبو آهي ڇاڪاڻ ته اهي درجہ بندي ٿيل مواد ڏانهن وٺي وڃن ٿا.

مواد ٻن قسمن ۾ ورهايل آهي: خاصيتي مواد (Quantitative /Categorical data) ۽ مقداري مواد (Quantitative /numeric data). جنس، رت جو گروپ، پرون، رنگ، معياري درجا، رول نمبر وغيره خاصيتي مواد آهن. اُچائي، وزن، پگهار، ڳار جون pH قيمتون، ساليانا منافعو ڪنهن ڪمپني جو، شاگردن جون مارڪون ڪنهن مضمون ۾ وغيره مقداري مواد آهن.

خاصيتي مواد ۽ مشاهدا رڳو خاصيتون يا قيمتون هوندا آهن. جنهن ۾ ڪابه عددي اهميت نه هوندي آهي. پر ان ۾ درجہ بندي يا ترتيب (وڌندڙ يا گهٽجندڙ) ٿي به سگهي ٿي يا نه به ٿي سگهي ٿي. خاصيتي مواد جنهن ۾ ترتيب هجي ته ان کي ناليوارو مواد نه ته پوءِ قطاري مواد چئبو آهي. جنس، رت جو گروپ، پرون، رنگ، مذهب ناليوارو مواد آهن.


مثال طور اسين مرد ۽ عورت واري مشاهدن ۾ درجہ بندي ٿيڻا ڪري سگهون ته ڪير وڏي يا گهٽ حيثيت وارو آهي. شاگردن جا گريد (A, B, C, فيل) يا کاڌي جو معيار (بهترين، سٺو، چڱو، خراب، بدترين) اهو مواد درجہ بندي يا ترتيب ۾ اچي سگهي ٿو اهو ۽ اهو قطاري مواد ٿيندو.

خاصيتي مواد جا مشاهدا عدد هوندا آهن جنهن جي عددي اهميت ۽ ترتيب هوندي آهي. عدد رڳو سڃا عدد ٿي سگهن ٿا يا ڏهائي جي صورت ۾ پڻ ٿي سگهن ٿا. جيڪڏهن مقداري مواد جا مشاهدا رڳو سڃا عدد آهن ته پوءِ مواد کي غير مسلسل مواد (Discrete data) ڪوٺبو. ٻي صورت ۾ اهو مسلسل مواد (Continuous data) ڪوٺبو. پرين ۾ پگهار، ڪنهن اسڪول ۾ في ڪلاس چوڪرين جو تعداد، چار سڪا گڏ اُچلائڻ تي پورين (Heads) جو تعداد، اهي سڀ غير مسلسل مواد کي ظاهر ڪن ٿا. اُچائي، وزن جي ماپ، ڳارن جون pH واريون قيمتون اهي سڀ مسلسل مواد کي ظاهر ڪن ٿا.

مواد جي قسمن جي وچ ۾ فرق ڪرڻ نهايت اهم آهي ته جيئن مناسب طريقي سان شمارياتي تجزين تي لڳايو وڃي يا مواد جي وڌيڪ تجزيئي لاءِ نشان ڏيکاريندڙ جي ماپ ڪجي.

22.1 تعددي تقسيم (Frequency distribution):

مشاهدن جي وڏي تعداد واري غير گروهه مواد مان بامعني معلومات ڪڍڻ لاءِ، اسين مواد کي ننڍن جماعتن يا گروهن ۾ ورهائيندا آهيون. ساڳي مشاهدن کي هڪ جڳهه رکڻ لاءِ جماعتن کي ٺاهيو ويندو آهي. غير مسلسل



جماعتون (Discrete classes) هڪ عدد يا خاصيت تي مشتمل هونديون آهن جڏهن ته مسلسل جماعتن (Continuous Classes) ۾ عددن جي وسعت هوندي آهي. ڪنهن خاص جماعت ۾ مشاهدن جي تعداد کي ان جي تعدد (Frequency) چئبو آهي.

گروهي مواد جي جدولِي اظهار کي تعددي تقسيم (Frequency distribution) چئبو آهي. اها جماعتن ۽ انهن جي واسطيدار تعدد تي مشتمل هوندي آهي. تعددي تقسيم بنيادي تجزيئي لاءِ وڌيڪ واضح سمجهه مهيا ڪري ٿو. ڪنهن جماعت جنهن جو تعدد "f" هجي ته پوءِ ان جي نسبتي (Relative) ۽ في سيڪڙو تعدد (Percentage Frequency) ترتيبوار $\left(\frac{f}{n}\right)$ ۽ $\left(\frac{f}{n} \times 100\right)$ آهن جڏهن ته مشاهدن جي ڪل تعداد "n" آهي. سڀني نسبتي تعددن جي جوڙ اُپت 1 جي برابر هوندي آهي ۽ في سيڪڙو تعددن جي جوڙ اُپت 100 هوندي آهي.

(i) 22.1 گروهي تعددي جدول جي جوڙجڪ (Construct grouped frequency table):

گروهي تعددي جدول يا تعددي ورهاست کي ٺاهڻ جو طريقو ان ڳالهه تي منحصر ڪري ٿو ته اسين ڪهڙي ريت گروهي يا جماعتون ٺاهيون ٿا. اسين جوڙجڪ جي هيٺين ٻن طريقن تي غور ڪريون ٿا.

(a) غير مسلسل جماعتن جي تعددي جدول (Frequency table with discrete classes):

غير مسلسل جماعتون اهي جماعتون هونديون آهن جن ۾ ساڳيئي مشاهدن کي شامل ڪرڻ لاءِ هڪڙو عدد يا خاصيت هوندي آهي. اسين غير مسلسل جماعتن جو تڏهن استعمال ڪندا آهيون جڏهن مواد جا ٿورا مشاهدا پنهنجي پاڻ کي وڌيڪ پيرا ورجائن غير مسلسل جماعتن واري تعددي جدول کي غير مسلسل تعددي جدول پڻ ڪوٺبو آهي. ڪڏهن ڪڏهن نسبتي ۽ في سيڪڙو تعددن کي جدول جي آخر ۾ لڳائبو آهي جيڪڏهن گهرج هجي ته. ڏنل ڊيٽا سيٽ (Data Set) ۾ ٽن ڪالمن تي مشتمل غير مسلسل جماعتن واري تعددي جدول کي ٺاهڻ لاءِ اسين هيٺيان قدم کڻندا آهيون.

1. مختلف مشاهدن جو جماعتن يا گروهن جي صورت سڃاڻپ ڪيو ۽ انهن کي ڪنهن به ترتيب ۾ پهرين ڪالمر ۾ لکو جيڪڏهن مواد ناليوارو آهي قطاري يا مقداري مواد لاءِ جماعتن کي وڌندڙ ترتيب ۾ لکو.
2. ٻيئي ڪالمر ۾ مواد کي جماعتن ۾ ورهائڻ لاءِ مطابقت جي نشانين يا ٽيلي نشان (Tally Marks) جو استعمال ڪريو.
3. ٽئين ڪالمر ۾ هر هڪ جماعت جي تعدد کي لکڻ لاءِ مطابقت جي نشانين کي ڳڻيو.

مثال 1: هڪ ڪلاس جي 30 شاگردن جي رت جي گروپن لاءِ گروهي تعددي جدول ٺاهيو.

A+ O+ B+ A+ A- AB+ B+ O+ O+ A- A- AB- A+ O- B-
B+ O- B- O- AB- O- A- AB- A- O- B- O- A- AB- O-


گروهي تعددي جدول

تعدد ”شاگردن جي تعداد“	ٽيلي نشان	جماعتون ”رت جا گروپ“
6		A+
5		B+
3		AB+
7		O+
3		A-
1		B-
2		AB-
3		O-
n = 30	---	ڪُل تعداد

حل:

هتي $n = 30$ ۽ مواد ناليوارو آهي ان ڌار ڌار رت جا گروپ A+, B+, AB+, O+, A-, B-, AB-, O- اهي ان جماعتون آهن جيڪي پهرين ڪالمر ۾ لکيا ويا آهن. مواد کي ورهائڻ لاءِ ٻيئي ڪالمر ۾ ٽيلي نشانين جو استعمال ڪندي ۽ ان کانپوءِ ٽئين ڪالمر ۾ تعدد لکڻ لاءِ انهن کي ڳڻندي

اسان کي گهربل گروهي تعددي جدول ملي جيڪا شاگردن جي رت جي گروپن کي ورهائي ٿي.



مثال 2: هڪڙي بازار ۾ 40 سرسري چونڊيل گراهڪن جا جواب هيٺ ڏنل آهن جڏهن انهن کان پڇيو ويو ”توهان خدمت مان ڪيترو مطمئن آهيو؟“ انهن جي جوابن جي گروههي تعدادي جدول ٺاهيو. نسبتي ۽ في سيڪڙو تعدادون پڻ لھو.

ڏاڍو	گهڻو نه	گهڻو نه	ڏاڍو	ڪجهه	بلڪل نه	ڏاڍو	گهڻو نه
ڏاڍو	گهڻو نه	ڏاڍو	ڏاڍو	ڏاڍو	گهڻو نه	ڏاڍو	ڪجهه
پڪ ناهي	ڏاڍو	بلڪل نه	ڏاڍو	ڏاڍو	ڏاڍو	گهڻو نه	ڪجهه
بلڪل نه	پڪ ناهي	گهڻو نه	گهڻو نه	پڪ ناهي	ڏاڍو	ڏاڍو	ڏاڍو
ڏاڍو	ڪجهه	ڏاڍو	ڪجهه	گهڻو نه	پڪ ناهي	ڏاڍو	ڪجهه

حل:

هتي $n = 40$ ۽ مواد قطاري آهي. وڌندڙ ترتيب (گهٽ کان وڌ) ۾ پنج مختلف مطمئن ڪندڙ درجا جماعتون آهن. ٽيلي نشانن ۽ تعدادن سان اسان گروههي تعدادي جدول حاصل ڪئي. نسبتي ۽ في سيڪڙو تعدادون پڻ چوٿين ۽ پنجين ڪالم ۾ ڪڍيل آهن.

جماعتون ”مطمئن ڪندڙ درجا“	ٽيلي نشان	تعداد (f)	نسبتي تعداد $\left(\frac{f}{n}\right)$	في سيڪڙو تعداد (%) $\left(\frac{f}{n} \times 100\right)$
بلڪل نه		3	$\frac{3}{40} = 0.075$	$\frac{3}{40} \times 100 = 7.5$
گهڻو نه		8	0.2	20
پڪ ناهي		5	0.125	12.5
ڪجهه		6	0.15	15
ڏاڍو		18	0.45	45
ڪُل تعداد	---	$n = 40$	1	100

نوٽ ڪيو ته:

- مثال 2 جي گروههي تعدادي جدول مان، اسين سولائي سان فيصلو ڪري سگهون ٿا ته گراهڪن مان سڀ کان وڌيڪ تعداد ”ڏاڍو“ واري آهي جڏهن ته گراهڪن جي گهٽ تعداد ”بلڪل نه“ واري آهي.
- اهو چوڻ نيڪ ۽ سمجهه ۾ ايندڙ آهي ته 45% گراهڪ ڏاڍا مطمئن هئا بجاءِ ان جي ته 40 مان 18 گراهڪ ڏاڍا مطمئن هئا.


مثال 3:

هڪ شهر جي 45 خاندانن کان جڏهن موبائيلن جي تعداد بابت پڇيو ويو جيڪي آهي استعمال ڪن ٿا ته جيڪي جواب انهن ڏنا آهي هيٺين ريت نوٽ ڪيا ويا انهن جوابن جي غير مسلسل تعدادي جدول ٺاهيو انهن جوابن جي نسبتي ۽ في سيڪڙو تعداد لھو.

1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 3 4 1 1 0 2 4 1
3 3 2 3 2 2 5 1 6 1 6 2 1 5 3 2 4 2 4 7 4 2

حل:

هتي $n = 45$ ۽ مواد مقداري آهي ۽ خاص طور سان غير مسلسل آهي مواد جا مختلف عدد وڌندڙ ترتيب ۾ هي آهن. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 جيڪي ٿورا عدد آهن ۽ پنهنجي پاڻ کي وري وري ورجائن ٿا. پهرين ڪالم ۾ اهي اٺ جماعتون آهن. ٻيئي ڪالم ۾ ٽيلي نشانن کي لکندي ۽ ٽئين ڪالم ۾ 45 خاندانن جي موبائيل جي تعداد کي ورهائڻ جي گهريل غير مسلسل تعدادي جدول حاصل ڪرڻ لاءِ ٽئين ڪالم ۾ تعدادن کي لکندي.



غير مسلسل تعددي جدول

جماعتون ”موبائيلن جو تعداد“	ٽيلي نشان	تعداد ”خاندانن جو تعداد“
0		1
1		7
2		15
3		12
4		5
5		2
6		2
7		1
ڪُل تعداد	---	$n = 45$

مثال 4: هڪ ڪمپني جي سرسري چونڊيل 1.5 لٽرن واري بوتلن ۾ ٿڌي مشروب جي مقدار جي ماپ (لٽرن ۾) ڪئي وئي جيڪا هيٺ ڏنل آهي. ٿڌي مشروب جي ماپ ٿيل مقدار جي غير مسلسل تعددي جدول ٺاهيو. نسبتي ۽ في سيڪڙو تعددون پڻ لھو.

1.48 1.51 1.50 1.49 1.49 1.49 1.51 1.48 1.49 1.52
1.51 1.49 1.51 1.50 1.50 1.50 1.51 1.49 1.49 1.50

حل: مواد مقداري ۽ خاص طور سان مسلسل آهي. مختلف عدد 1.52, 1.51, 1.50, 1.49, 1.48 ۽ 1.52 وڌندڙ ترتيب ۾ پنج جماعتون آهن. ٽيلي نشانين ۽ تعددن جي مدد سان اسين غير مسلسل تعددي جدول حاصل ڪريون ٿا. چوٿين ۽ پنجين ڪالمن ۾ نسبتي ۽ في سيڪڙو تعددون پڻ معلوم ڪري لکيون ويون آهن.

جماعتي حدون ٿڌي مشروب جي مقدار (لٽرن ۾)	ٽيلي نشان	تعداد ”بوتلن جو تعداد“	نسبتي تعداد $\left(\frac{f}{n}\right)$	في سيڪڙو تعداد (%) $\left(\frac{f}{n} \times 100\right)$
1.48		2	$\frac{2}{20} = 0.1$	$\frac{2}{20} \times 100 = 10$
1.49		7	0.35	35
1.50		5	0.25	25
1.51		5	0.25	25
1.52		1	0.05	5
ڪُل تعداد	---	$n = 20$	1	100

(b) مسلسل جماعتن واري تعددي جدول (Frequency table with continuous classes):

جڏهن مواد مقداري (مسلسل يا غير مسلسل) هجي ۽ گهٽ ورجائڻ ۽ وڌيڪ ڦيرگهير وارا مشاهدا عددن جي ڪنهن خاص حد تائين ورهائيل هجن ته پوءِ اسين مسلسل جماعتون (Continuous classes) استعمال ڪنداسين. اهي جماعتون اڪيلا عدد نه آهن پر عددن جي وسعت (وقف) آهن هر هڪ جماعت انهن عددن تي مشتمل هوندي آهي جيڪي جماعتي حدن جي اندر هوندا آهن هڪ مسلسل تعددي جدول مسلسل جماعتن سان گڏوگڏ ترتيبوار تعددن تي مشتمل هوندي آهي. اسين اڳيئي گذريل ڪلاس ۾ غير مسلسل مواد لاءِ تعددي تقسيم پڙهي چڪا آهيون هتي اسين ڏهائي جي ڪنهن به درجي واري مسلسل ۽ غير مسلسل مواد



جي بنيادي تصورن جي عمومي ڳالهه ڪنداسين ۽ انهن جو استعمال ڪنداسين. اسين پهريان انهن ڪجهه اهم اصطلاحن جو دور ڪنداسين ۽ بيان ڪنداسين جيڪي ان عمل ۾ فعال طور استعمال ٿين ٿا.

وسعت (Range): اهو ڏنل مواد جي سڀ کان وڏي ۽ سڀ کان ننڍي رقم (مشاهدن) جو فرق آهي.

$$(سڀ کان ننڍي رقم) - (سڀ کان وڏي رقم) = وسعت ... (1)$$

جماعتي حدون (Class limits): هي آهي عدد آهن جنهن سان جماعت جي سڃاڻپ ٿيندي آهي هر هڪ جماعت لاءِ هڪ سڀ کان ننڍو عدد هوندو آهي جنهن کي هيٺين جماعتي حد (Lower class limit) يعني (LCL) چئبو آهي ۽ سڀ کان وڏي عدد کي مٿين جماعتي حد (Upper class limit) يعني (UCL) چئبو آهي. ڪنهن خاص جماعت ۾ آهي سڀ مشاهدا شامل هوندا جيڪي LCL کان وٺي UCL تائين هجن.

جماعتي وقفو يا ويڪر (h) (Class interval/width): ڪنهن جماعت جي ماپ/ڊيگهه کي جماعتي وقفو يا ويڪر چئبو آهي ۽ اهو ڪن ٻن لاڳيتن LCLs يا VCLs جو فرق معلوم ڪري لهيو آهي. اسين عام طرح سان سڀني جماعتن لاءِ مستقل جماعتي وقفو يا ويڪر استعمال ڪندا آهيون جنهن کي h سان ظاهر ڪبو آهي ۽ هيٺين ريت لهي سگهي ٿو.

$$h = \frac{1}{10^m} \left[\frac{R}{K} \times 10^m \right] \dots (2)$$

جڏهن ته جماعتن جو تعداد K وسعت R ۽ مشاهدن ۾ وڌ ۾ وڌ ڏهائي درجن جو تعداد m آهي. جيڪڏهن مواد غير مسلسل آهي ته پوءِ $m = 0$ ، جيڪڏهن مواد مسلسل آهي ۽ ان جون رقمون ڏهائي جي هڪ درجي تائين هجن ته پوءِ $m = 1$ ساڳي ريت m جون ٻيون قيمتون به لکبيون. نشاني $\lceil \cdot \rceil$ سان مٿيون اندازو (Ceiling approximation) ظاهر ڪبو آهي جيڪو h جو سڄي عدد وارو قطعي ملهه حاصل ڪرڻ لاءِ استعمال ڪبو آهي. هڪ سڄي عدد جو مٿيون اندازو ساڳيو سڄو عدد ٿيندو جڏهن ته ڏهائي اڻڀور جو مٿيون اندازو ان کان وڏو فوراً ايندڙ سڄو عدد ٿيندو. مثال طور: $\lceil 4 \rceil = 4$, $\lceil 1.6 \rceil = 2$, $\lceil 1.9 \rceil = 2$, $\lceil 7.5 \rceil = 8$.

جماعتن جو تعداد (K) (Number of classes): جماعتن جي تعداد کي K سان ظاهر ڪبو آهي. اها تعداد 5 کان 15 تائين هوندي آهي پر اهو مشاهدن جي تعداد ۽ وسعت تي منحصر ڪري ٿو. اها تعداد جيڪڏهن مليل نه هجي ته پوءِ احتياط سان چونڊي يا لهي ويندي آهي. K جي تمام وڏي ملهه سان خراب گروهه بندي ۽ معلومات جو نقصان ٿيندو. ايڇ اسٽرجز (1926) (H- Sturges) مشاهدن جي تعداد n جو استعمال ڪندي جماعتن جو مناسب تعداد K لهڻ لاءِ هڪ اصول تجويز ڪيو. اسٽرجز جو اصول هن ريت بيان ڪجي ٿو.

$$K = \lceil 1 + 3.322 \log(n) \rceil \dots (3)$$


جڏهن ته $\log(n)$ جو مطلب، بنياد 10 سان n جو لاگريٿم آهي ۽ $\lceil \cdot \rceil$ مٿيون اندازو آهي اها ڳالهه ڌيان ۾ رکڻ گهرجي ته اسٽرجز وارو اصول $15 \leq n \leq 200$ لاءِ وڌيڪ مناسب آهي. مثال طور: جيڪڏهن $n = 25$ ته پوءِ جماعتون $K = \lceil 1 + 3.322 \log(25) \rceil = \lceil 5.6439 \rceil = 6$

جماعتن جي وچ ۾ وٿي (d) (Spacing between the classes):

هڪ جماعت جي LCL ۽ ايندڙ جماعت UCL جي وچ ۾ مستقل فرق کي جماعتن جي وچ ۾ وٿي (d) چئبو آهي. جيڪڏهن m ڏهائي درجن جو وڌ ۾ وڌ تعداد آهي ته پوءِ

$$d = \frac{1}{10^m}, m = 0, 1, 2, \dots \dots (4)$$

غير مسلسل مواد لاءِ $m = 0$ ۽ $d = 1$ ، جيڪڏهن مواد ڏهائي جي هڪ درجي تائين مليل آهي ته پوءِ $m = 1$ ۽ $d = 0.1$. ڏهائي جي ٻن درجن واري مواد لاءِ $m = 2$ ۽ $d = 0.01$



مسلسل تعددي جدول ٺاهڻ جو طريقو:

مقداري مواد لاءِ مسلسل تعددي جدول ٺاهڻ جا قدم:

1. مشاهدن جو تعداد (n) لکو ۽ مواد جي سڃاڻپ ڪريو: مسلسل يا غير مسلسل مواد ۾ وڌ ۾ وڌ ڏهائي درجن جو تعداد (m) پڻ لکو.
2. مساوات (1) جو استعمال ڪندي وسعت (R) لھو ۽ اسٽرچ جو اصول مساوات (3) استعمال ڪندي جماعتن جو تعداد (K) لھو جيڪڏهن مليل نہ هجي تہ
3. مساوات (2) جو استعمال ڪندي جماعتي ويڪر (h) ويڪر معلوم ڪريو ۽ مساوات (4) جو استعمال ڪندي جماعتن جي وچ واري وٿي (d) لھو. انتهائي حالتن ۾ اسان کي " $h + d$ " کي جماعتي ويڪر طور ڪٽڻو پوندو آھي يا هڪ وڌيڪ جماعت جو اضافو ڪرڻو پوندو.
4. جماعتي حدون معلوم ڪريو تہ جيئن پڪ ٿئي تہ سڀ مشاهدا K جماعتن ۾ شامل ٿيا آهن. اسين سڀ کان ننڍي مشاهدي کي شروعاتي LCL طور استعمال ڪري سگهون ٿا. شروعاتي UCL هن ريت لهبي:
5. $UCL = LCL + h - d$ شروعاتي LCL ۽ UCL ۾ مسلسل h کي جوڙ ڪندي ۽ ٻين جماعتن جا $LCLs$ ۽ $VCLs$ لکو. مسلسل تعددي جدول جي پهرين ڪالم ۾ جماعتي حدن کي جماعتن طور لکو.
6. مواد کي جماعتن ۾ ورهائڻ لاءِ ٻيئي ڪالم ۾ ٽيلي نشانين جو استعمال ڪريو يا رقمن کي لکو. ٽيلي نشانين کي ترجيح ڏني ويندي آهي.
7. سڀني جماعتن جي تعددن کي ٽئين ڪالم ۾ لکڻ لاءِ ٽيلي نشانن يا رقمن کي ڳڻيو.

مثال 1:

هڪ ڏڪان ۾ 60 لڳاتار ڏينهن لاءِ بجلي جو استعمال (kwh ۾) هيٺين ريت ڏنل آهي. ٽيلي نشان وارو طريقو استعمال ڪندي تعددي تقسيم ٺاهيو.

106	107	76	82	109	107	115	93	187	95	139	119	115	128	115
123	125	111	92	86	70	126	68	130	129	194	82	90	158	118
123	146	80	136	137	110	141	152	104	111	140	184	204	178	75
113	162	131	99	185	181	84	486	100	98	148	90	110	107	78

حل: هتي $n = 60$ مواد غير مسلسل آهي ۽ $m = 0$ ، $R = 204 - 68 = 136$ جماعتن جي تعداد لاءِ اسٽرچ جو اصول استعمال ڪندي:


تعددي تقسيم

تعداد	ٽيلي نشان	جماعتي حدون
10		68 - 87
13		88 - 107
15		108 - 127
10		128 - 147
4		148 - 167
6		168 - 187
2		188 - 207
$n = 60$	---	ڪُل تعداد

$$K = \lceil 1 + 3.322 \log(60) \rceil = \lceil 6.9070 \rceil = 7.$$

$$h = \left\lceil \frac{136}{7} \right\rceil = \lceil 19.4285 \rceil = 20, \text{ ۽ } d = 1.$$

شروعاتي $LCL = 68$ سان شروعاتي $UCL = 68 + 20 - 1 = 87$ انهن ۾ $h = 20$ کي جوڙ ڪندي اسان کي ٻيون حدون مليون. پهرين ڪالم ۾ جماعتي حدون، ٻيئي ڪالم ۾ ٽيلي نشان ۽ ٽئين ڪالم ۾ تعددن کي لکندي، اسان گهربل تعددي جدول حاصل ڪئي.



مثال 2: 24 جڳهن تي هڪ تار جي ريل جي قطر جون ٿيل ماپون تقريبا 0.01mm تائين درست آهن:

2.10, 2.29, 2.32, 2.21, 2.14, 2.22, 2.28, 2.18, 2.17, 2.20, 2.23, 2.13, 2.26, 2.10, 2.21, 2.17, 2.28, 2.15, 2.34, 2.27, 2.11, 2.23, 2.25, 2.16.

تعدادي ورهاست ٺاهيو.

حل: هتي $n = 24$ ۽ ڏهائي جي ٻن درجن تائين مسلسل مواد آهي. تنهنڪري $m = 2$ ۽

$$K = [1 + 3.322 \log(24)] = 6 \quad \text{۽} \quad R = 2.34 - 2.10 = 0.24$$

$$d = \frac{1}{100} = 0.01, \quad h = \frac{1}{100} \left[\frac{R}{K} \times 100 \right] = 0.04$$

$LCL = 2.10$ ۽ $h = 0.04$ سان شروعات ڪندي ڇهه جماعتون آهن.

2.10-2.13, 2.14-2.17, 2.18-2.21, 2.22-2.25, 2.26-2.29, 2.30-2.33

پر 2.34 ڪنهن به جماعت ۾ شامل نٿو ڪري سگهجي. ان انتهائي حالت ۾ اسين جماعتي ويڪر $h + d = 0.05$

استعمال ڪنداسين. گهربل ڇهه جماعتون آهن: 2.10-2.14, 2.15-2.19, 2.20-2.24, 2.25-2.29, 2.30-2.34, 2.35-2.39

۽ قطر جي ماپن واري گهربل تعدادي ورهاست آهي.

تعدادي جدول

جماعتي حدون	2.10 - 2.14	2.15 - 2.19	2.20 - 2.24	2.25 - 2.29	2.30 - 2.34	2.35 - 2.39	ڪُل تعداد
تيلي نشان						---	
تعدد	3	5	6	6	3	0	$n = 24$

ڌيان ۾ رکو ته: مثال 2 ۾، 2.34 کي شامل ڪرڻ لاءِ اسان رڳو هڪ وڌيڪ جماعت جو اضافو ڪري سگهون ٿا. جدول هن ريت ٿيندي.

ڪلاس حدون	2.10 - 2.13	2.14 - 2.17	2.18 - 2.21	2.22 - 2.25	2.26 - 2.29	2.30 - 2.33	2.34 - 2.37
تيلي نشان							
تعدد	4	5	4	4	5	1	1

مسلسل جماعتن واري گروهه تعدادي جدولن جا ڪجهه ٻيا مکيه اصطلاح:

حقيقي جماعتي حدون (Class boundaries):

اهي عدد جيڪي هڪ جماعت کي پاسي واري جماعتن کان ڌار ڪن حقيقي جماعتي حدون ڪوٺبا آهن.

هڪ جماعت لاءِ، ان جي هيٺين حقيقي جماعتي حد (LCB) ۽ مٿين حقيقي جماعتي حد (UCB) ترتيبوار LCL

۽ UCL مان هيٺين ريت حاصل ڪيون آهن.

هڪ جماعت لاءِ: $LCB = LCL - \frac{d}{2}$ ۽ $UCB = UCL + \frac{d}{2}$ جڏهن ته d جماعتن جي وچ ۾ وٽي آهي.

جماعتي نشان يا وچيان ٽپڪا (Class marks/mid points):

جماعتي نشان يا وچيان ٽپڪا x سان ظاهر ڪبا آهن. اهي مسلسل جماعتن واري گروهه مواد جي جماعتن

جي جماعتي حدن يا حقيقي جماعتي حدن جون حسابي سراسريون هونديون آهن.


$$x = \frac{LCB + UCB}{2} \quad \text{يا} \quad x = \frac{LCL + UCL}{2}$$

مجموعي تعداد (Cumulative Frequency): لفظ "Cumulative" جو مطلب آهي ته لاڳيتو جوڙ سان ڪنهن شي جو

وڌڻ يا وڌو ٿيڻ جيڪڏهن اسين جماعتن جي تعدادن کي هڪ ٻئي پٺيان جوڙ ڪندا رهون. هر ڀيري ڪل

تعداد ۾ ايندڙ جماعت جي تعداد کي جوڙ ڪندي اسين مجموعي تعداد حاصل ڪنداسين ڪنهن خاص جماعت

لاءِ، مجموعي تعداد، ان جماعت تائين سڀني تعدادن جي جوڙ اُپت هوندي آهي.



مثال 3: هيٺ ڏنل تعددي جدول لاءِ حقيقي جماعتي حدون، جماعتي نشان ۽ مجموعي تعدد لھو.

جماعتي حدون	7.1-7.3	7.4-7.6	7.7-7.9	8.0-8.2	8.3-8.5	8.6-8.8	8.9-9.1
تعدد	3	5	9	14	11	6	2

حل: هتي $n = 50$ ۽ $d = 0.1$ حقيقي جماعتي حدون، جماعتي نشان ۽ مجموعي تعدد هيٺين جدول ۾ معلوم ڪيا ويا آهن

جماعتي حدون	حقيقي جماعتي حدون	جماعتي نشان	تعدد	مجموعي تعدد
7.1-7.3	7.05-7.35	7.2	3	3
7.4-7.6	7.35-7.65	7.5	5	3+5=8
7.7-7.9	7.65-7.95	7.8	9	17
8.0-8.2	7.95-8.25	8.1	14	31
8.3-8.5	8.25-8.55	8.4	11	42
8.6-8.8	8.55-8.85	8.7	6	48
8.9-9.1	8.85-9.15	9.0	2	n = 50
ڪُل تعداد	----	----	n = 50	----

نوٽ ڪريو ته:

- اسين ڏسي سگهون ٿا هڪ جماعت جي UCB ۽ ان کانپوءِ ايندڙ جماعت جي LCB ساڳيون آهن.
- شروعاتي LCB ۾ h کي لاڳيتو جوڙ ڪرڻ سان اسين باقي بچيل سڀ جماعتون حاصل ڪريون ٿا.
- شروعاتي جماعتي نشان ۾ " h " جوڙ ڪرڻ سان اسان باقي بچيل سڀ جماعتي نشان حاصل ڪري سگهون ٿا.
- آخري جماعت جي مجموعي تعدد سڀني مشاهدن جو ڪُل تعداد آهي.

مشق 22.1

1. ڏنل مواد جي قسم جي سڃاڻپ ڪريو (غير مسلسل يا مسلسل يا ناليوارو يا قطاري) ۽ مشاهدن جي ڪُل تعداد لکو.


- 30 ڏينهن لاءِ شاپنگ مال ۾ روز ايندڙ ماڻهن جو تعداد
- هڪ مهيني لاءِ هڪ ماڻهو جو ورزش گاهه ۾ گذاريل وقت (روزانو متن ۾)
- 45 گاڏي جي بيٽرين جي عمر (سالن ۾)
- 2 مهينن لاءِ بجلي جو استعمال (Kwh في ڏينهن ۾)
- هڪ ڪلاس جي 55 شاگردن جو وزن (ڪلو گرامن ۾)
- 20 ماڻهن جي پڙهڻ جو رنگ. **g.** هڪ ڪلاس جي 70 شاگردن جا حاصل ڪيل گريڊ
- 10 ماڻهن جي ڪوويڊ (COVID) جي تشخيصي ٽيسٽ جا نتيجا (مثبت يا منفي)
- اسڪول جي 30 استادن جي ازدواجي حيثيت
- توهان جي ڪلاس جي شاگردن جي مستقل رهائش جو ضلعو.

2. هڪ اسڪول جا 20 شاگرد جيڪي ڏيهي دوري تي وڃن پيا انهن جي تعليمي درجن (پڙهائي جي موجوده ڪلاس) جي گروهه تعددي جدول ٺاهيو. تعليمي درجا آهن:

VIII, X, X, VIII, VI, IX, X, IX, X, VIII, VII, VIII, VI, X, VI, V, IV, VII, IX, IX.

3. هڪ ٻولي سکڻ واري ڪورس ۾ حاضر ٿيڻ لاءِ 20 شاگردن آمدورفت لاءِ جيڪي طريقا استعمال ڪيا آهن هيٺ ڏنل آهن. في سيڪڙو تعدد سان گڏ گروهه تعددي جدول ٺاهيو.

بس	پنڌ	پنڌ	موٽر سائيڪل	پنڌ	پنڌ	موٽر گاڏي	بس	پنڌ	پنڌ	موٽر سائيڪل	پنڌ	پنڌ	موٽر گاڏي
بس	بس	موٽر گاڏي	موٽر گاڏي	بس	پنڌ	پنڌ	پنڌ	بس	پنڌ	پنڌ	پنڌ	پنڌ	پنڌ



4. گروهی تعددي ورهاست ۾ 40 خاندانن جي جوابن جي درجہ بندی کریو جڏهن انهن کان پڇيو ويو ته آهي ڪيترا ڀيرا شهر کان ٻاهر موڪلون گذاريندا آهن. نسبتي تعدد پڻ لھو

ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه
ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن
ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه
ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن
ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه
ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن
ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه	ڪڏهن به نه
ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن	ڪڏهن ڪڏهن

5. تعددي جدول ۾ مختلف اسڪولن جي نگران شاگردن (پرفيڪٽس) جي ٽوپين جي رنگن کي ترتيب ڏيو

ڪارو	ڪارو	ڪارو	ڪارو	ڪارو	ڪارو	ڪارو	ڪارو	ڪارو	ڪارو
ڪارو	ڪارو	ڪارو	ڪارو	ڪارو	ڪارو	ڪارو	ڪارو	ڪارو	ڪارو

6. هڪڙي ڪلاس ٽسيٽ ۾ 25 شاگردن جون 5 مان ڪنيل مارڪون هيون: 4.0, 0.5, 4.5, 1.0, 3.5, 3.5, 5.0, 2.5, 4.0, 2.5, 1.0, 2.0, 4.0, 3.5, 0.0, 3.0, 5.0, 1.0, 2.0, 2.0, 4.5, 2.5, 3.0, 3.5, 1.5

غير مسلسل جماعتن ۽ نسبتي تعددن سان گڏ تعددي جدول ٺاهيو.

7. ٽيسٽ کان هڪ ڏينهن اڳ ۾ هڪ ويب سائيٽ تان هڪ اُستاد جا ليڪچر هر هڪ ڪلاڪ ۾ جيترا دفعا ڊائون لوڊ ٿيا ان جا نتيجا هي آهن. 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 1. غير مسلسل تعددي جدول ۾ مواد جي درجہ بندی کریو.

8. هڪ ڪلاس ۾ 18 ڏينهن ۾ غير حاضر شاگردن جو تعداد هيٺ ڏنل آهي. 4, 3, 0, 1, 2, 5, 6, 8, 10, 7, 11, 15, 13, 14, 3, 4, 12, 12

9. ڪاليج جي 40 شاگردن جا وزن تقريباً پائونڊن ۾ هن ريت آهن. 138, 148, 146, 146, 119, 164, 152, 173, 158, 154, 150, 144, 142, 140, 165, 132, 150, 147, 147, 153, 144, 156, 135, 126, 140, 125, 168, 157, 138, 135, 149, 136, 135, 142, 161, 145, 176, 163, 145, 128


10. ان مواد جي مسلسل تعددي جدول ٺاهيو حقيقي جماعتي حدون، جماعتي نشان ۽ مجموعي تعددون پڻ لھو ساڳي ملهه واري 48 رزسٽرن (Resistors) جي هڪ ٽولي جي روڪ (Resistance) جي قيمت اوهر ۾ هن ريت آهي. 21.0, 22.4, 22.8, 21.5, 22.6, 21.1, 21.6, 22.3, 22.9, 20.5, 21.8, 22.2, 21.0, 21.7, 22.5, 20.7, 23.2, 22.9, 21.7, 21.4, 22.1, 22.2, 22.3, 21.3, 22.1, 21.8, 22.0, 22.7, 21.7, 21.9, 21.1, 22.6, 21.4, 22.4, 22.3, 20.9, 22.8, 21.2, 22.7, 21.6, 22.2, 21.6, 21.3, 22.1, 21.5, 22.0, 23.4, 21.2.

11. مسلسل تعددي جدول ٺاهيو. مجموعي ۽ في سيڪڙو تعددون پڻ لھو. 50 ٽڪرن جو مايو (ڪلوگرامن ۾) 0.1 ڪلوگرامن تائين تقريباً درست ماپيو ويو ۽ اهو هيٺ ڏنل آهي. مابين جي تعددي ورهاست ٺاهيو. نسبتي ۽ في سيڪڙو تعددون پڻ لھو.

8.0	8.3	7.7	8.1	7.4	8.6	7.1	8.4	7.4	8.2	8.4	8.8	7.9	8.1	8.2	7.5	8.3
8.8	8.0	7.7	8.3	8.2	7.9	8.5	7.9	8.0	8.4	7.2	8.7	8.0	9.1	8.5	7.6	8.2
7.8	7.8	8.7	8.5	8.4	8.5	8.1	7.8	8.2	7.7	7.5	8.5	8.1	7.3	9.0	8.6	

(ii) 22.1 برابر جماعتي وقفن وارا ڪالمي نقشا (Histogram) ٺاهڻ:

مقداري مواد جي گراف واري اظهار لاءِ ڪالمي نقشا استعمال ٿيندا آهن. ان ۾ مسلسل ۽ غير مسلسل جماعتن واريون تعددي جدولون ۽ لاڳاپيل تصور استعمال ٿيندا آهن. ڀر وارن مستطيلن جو استعمال ڪندي ڪالمي نقشو ڪڍيو ويندو آهي. جماعتن ۾ عددن جي ورهاست سان مستطيلن جي پائين کي نشان هنيا ويندا



آهن ۽ مستطيلن جون ايراضيون يا اوچائيون جماعتي تعددن سان متناسب هونديون آهن. برابر جماعتي وقفن واري ڪالمي نقشن ۾ مستطيلن جون ٻئي ايراضيون ۽ اوچائيون تعدد سان متناسب هونديون آهن. غير مسلسل تعددي جدولن سان واسطو رکندڙ ڪالمي نقشن ۾، مستطيلن جا پايا مواد جي مختلف عددن کي ظاهر ڪن ٿا ۽ اوچائيون عام طرح سان جماعتن جي تعددن کي ظاهر ڪن ٿيون. هر هڪ مستطيل جي ويڪر مستقل جماعتي وقفي سان ڪٽندي آهي.


برابر جماعتي وقفن واري مسلسل تعددي جدولن سان واسطو رکندڙ ڪالمي نقشن ۾ مستطيلن جا پايا حقيقي جماعتي حدن کي ظاهر ڪن ٿا ۽ اوچائيون عام طرح سان جماعتن جي تعددن کي ظاهر ڪنديون آهن. هر هڪ مستطيل جي ويڪر جماعتي وقفي جي برابر هوندي آهي.

ڪالمي نقشا ڪيڏو وقت محورن کي چٽي طرح ليبل ڪرڻ گهرجي ۽ پٺمانن کي بيان ڪرڻ گهرجي. x -محور (x -axis) 0 کان شروع ناهي ڪرڻو. y -محور (y -axis) 0 کان لازمي شروع ٿيڻ گهرجي. تعددن کي مستطيلن جي مٿان پڻ لڳائڻ گهرجي. هيٺين مثالن ۾ ڪالمي نقشا ٺاهڻ جي طريقي کي واضح ڪيو ويو آهي.

مثال 1: 80 خاندانن جو هيٺيون مواد استعمال ڪندي، ڳوٺن ۾ هر هڪ خاندان جي ٻارن جي تعداد لاءِ

ڪالمي نقشو ٺاهيو.	6	5	4	3	2	1
هڪ خاندان ۾ ٻارن جو تعداد	7	20	25	10	10	8
خاندانن جو تعداد	7	20	25	10	10	8


حل:



مواد هڪ غير مسلسل تعددي جدول ظاهر ڪري ٿو x -axis تي ساڳيئي وقفي وارين جماعتن کي ظاهر ڪندڙ مختلف عدد 1, 2, 3, 4, 5, 6 لکندي. ان کانپوءِ 25 تائين سڀني تعددن کي شامل ڪرڻ لاءِ مناسب پٺمانن سان تعددن کي y -axis تي لکندي جيڪي 0 کان شروع ٿين ٿا. مستطيلن کي ٺاهيندي جن جا برابر ويڪر وارا پايا مختلف عددن تي آهن ۽ اوچائين کي تعددن جي برابر ڪٽندي اسان هيٺيون ڪالمي نقشو حاصل ڪيو. محورن کي ليبل ڪيو ويو آهي ۽ پٺمانن کي بيان ڪيو ويو آهي.

مثال 2: هيٺين ورهاست لاءِ في سيڪڙو تعددي وارو ڪالمي نقشو ٺاهيو.

ٽڪر جو ماپو (ڪلوگرامن ۾)	7.1 - 7.3	7.4 - 7.6	7.7 - 7.9	8.0 - 8.2	8.3 - 8.5	8.6 - 8.8	8.9 - 9.1
ٽڪرن جو تعداد	3	5	9	14	11	6	2



حل: ڏهائي جي هڪ درجي تائين مسلسل مواد جي مسلسل تعددي جدول ڏنل آهي. ته پوءِ $d = 0.1$ ۽ $m = 1$, $n = 50$

حقيقي جماعتي حدون آهن: 7.35 - 7.65, 7.65 - 7.95, 7.95 - 8.25, 8.25 - 8.55, 8.55 - 8.85, 8.85 - 9.15. انهن کي x -axis تي ۽ واسطيدار في سيڪڙو تعددن 4, 12, 22, 28, 18, 10, 6 کي y -axis تي ترتيبوار پٺمانن سان لکندي $h = 0.3$ ويڪر وارن ۽ پاسي وارن مستطيلن کي ٺاهيندي جن جا پايا حقيقي جماعتي حدن تي آهن ۽ اوچائيون في سيڪڙو تعددن جي برابر آهن. اسان گهربل في سيڪڙو وارو ڪالمي نقشو حاصل ڪيو.



(iii) 22.1 غير مساوي جماعتن وارا کالمي نقشا ٺاهڻ (Construct histograms with unequal class intervals):

غير مساوي جماعتن واري کالمي نقشن واري صورت ۾ پاسي وارا مستطيل ٺاهبا آهن ته جيئن انهن جون ايراضيون (نه ڪي اوچائيون) تعددن سان متناسب هجن. اهو ڪرڻ لاءِ اسان مستطيلن جون ترميم ٿيل اوچائيون (Adjusted heights) بيان ڪنداسين متناسب ايراضي ۽ تعددن جي پڪ ڪرڻ لاءِ جيڪڏهن h^* ۽ f^* هڪ جماعت جي ترتيبوار تعدد ۽ اوچائي آهن ته پوءِ

$$\text{مستطيل جي ترميم ٿيل اوچائي} = \frac{f^*}{h^*} \quad (1)$$

$$\text{مستطيل جي ايراضي} = h^* \times \frac{f^*}{h^*} = f^* \quad (2)$$

مساوات (i) مان، اسين ڏسون ٿا ته ترميم ٿيل اوچائيون f^* سان تناسب ۾ نه آهن. پر مساوات (ii) ۾ ايراضيون تناسب ۾ آهن اها اسان جي گهرج پوري ڪري ٿي. غير مساوي جماعتي وقفن واري کالمي نقشن کي ٺاهڻ جا قدم اهي ساڳيا آهن جيڪي اڳ ۾ هئا پر اسان کي ترميم ٿيل اوچائيون y -axis تي لازمي لکڻيون پونديون. مثال: هيٺين مواد لاءِ غير مساوي جماعتي وقفن وارو کالمي نقشو ٺاهيو


جماعتي حدون	10 - 40	50 - 70	80 - 90	100 - 110	120 - 140	150 - 170
تعدد	2	6	12	14	4	2

حل: اسين ڏسي سگهون ٿا ته ڏنل مواد غير مساوي جماعتي وقفن واري تعددي جدول ڏيکاري ٿو. سڀ کان اڳ ۾، اسين حقيقي جماعتي حدون ۽ ترميم ٿيل اوچائيون لهنداسين. هتي $d = 10$

جماعتي حدون	حقيقي جماعتي حدون	جماعتي وقفا (h^*)	تعدد (f^*)	مستطيلن جون ترميم ٿيل اوچائيون (f^* / h^*)
10 - 40	5-45	40	2	$\frac{2}{40} = 0.05$
50 - 70	45-75	30	6	$\frac{6}{30} = 0.2$
80 - 90	75-95	20	12	0.6
100 - 110	95-115	20	14	0.7
120-140	115-145	30	4	≈ 0.13
150-170	145-175	30	2	≈ 0.07

x -axis تي حقيقي جماعتي حدون ۽ y -axis تي ترميم ٿيل اوچائيون لکندي، اسين سڀني جماعتن جا

x -axis تي، 1 ننڍو چورس = 5
 y -axis تي، 5 ننڍا چورس = 0.1




مستطيل ٺاهيون ٿا جن جي ويڪر غير مساوي جماعتي وقفن جي برابر آهي ۽ اوچائيون برابر آهن. ترميم ٿيل اوچائين جي جيڪي مٿين جدول ۾ معلوم ڪري چڪا آهيون. اهڙي طرح اسان غير مساوي جماعتي وقفن وارو کالمي نقشو حاصل ڪيو آهي. اسين تصديق ڪري سگهون ٿا ته مستطيلن جون ايراضيون متناسب آهن ۽ خاص طور سان برابر آهن تعددن جي هتي

$$\text{مستطيل 1- جي ايراضي} = 40 \times 0.05 = 2$$

$$\text{مستطيل 2- جي ايراضي} = 30 \times 0.2 = 6$$

$$\text{مستطيل 3- جي ايراضي} = 20 \times 0.6 = 12$$

۽ اهڙي ريت اڳيان به




(iv) 22.1 تعدي گھڻ پاسي جي جوڙجڪ ڪرڻ (Construct a frequency polygon):

تعدي گھڻ پاسو ان مقداري مواد جي گراف واري اظهار جو هڪ طريقو آهي جيڪو تعدي ورهاست ۾ ترتيب ڏنل هوندو آهي. اسين اهڙا گراف اڪثر اخبارن ۾ (خاص طور سان ڪاروباري حصي ۾)، موسم جي اڳڪٿي واري خبرن ۾، ۽ ڪرڪيٽ ميچ جي انگ اکر (Stats) ۾ (جيڪو Statistics جو مخفف آهي) لفظ گھڻ پاسو (Polygon) سان مراد پلين (Plane) جي هڪ اهڙي بند شڪل جيڪا گھڻ ۾ گھڻ ٽن ليڪ ٽڪرن کي پاڻ ۾ ڳنڍڻ سان ٺهي. مثال طور ٽڪنڊا، چورس، پنج ڪنڊا وغيره. هتي سڪنداسين ته اهو جاميٽري جو تصور تعدي ورهاست سان ڪيئن لاڳاپيل آهي. تعدي گھڻ پاسو ورهاست جي شڪل سڃاڻڻ لاءِ جديد شمارياتي تجزين ۾ استعمال ٿيندا آهن.

تعدي گھڻ پاسي کي ٺاهڻ لاءِ ٽپڪا (x, y) لڳائبا جڏهن ته x -محددي (Abscissa) جماعتي نشان آهن ۽ y -محددي (Ordinates) جماعتي تعددون آهن. ٻيو ته اسين 0 تعدد وارن ٻن فرضي جماعتن کي شامل ڪنداسين، هڪ شروعات ۾ ۽ ٻي آخر ۾ ۽ انهن لاءِ واسطيدار ٽپڪا x -axis تي لڳائينداسين. آخر ۾ گهربل بند شڪل حاصل ڪرڻ لاءِ اسين گراف تي پڪڙيل ٽپڪن کي ليڪ ٽڪرن سان ملائينداسين. ان بند شڪل کي تعدي گھڻ پاسو چئبو آهي جنهن جو پايو x -axis تي هوندو آهي ۽ ان جون چوٽيون تعددن کي ظاهر ڪن ٿيون. وضاحت خاطر، پريل نشان (•) حقيقي جماعتن کي ظاهر ڪن ٿا ۽ خالي نشان (o) فرض ڪيل جماعتن کي ظاهر ڪن ٿا. محورن کي ليبل ڪبو ۽ مناسب پئمائن کي بيان ڪبو.

مثال 1: هيٺين مواد لاءِ نسبتي تعدي گھڻ پاسو ٺاهيو.

x -axis تي، 5 ننڍو چورس = 0.01
 y -axis تي، 5 ننڍو چورس = 0.05



تڏي مشروب جي مقدار لٽرن ۾	1.48	1.49	1.50	1.51	1.52
ٻوٽن جو تعداد	2	7	5	5	1


حل: ڏنل مواد غير مسلسل تعدي جدول کي ظاهر ڪري ٿو. مختلف عدد:

1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52 جماعتي نشان (x) آهن تعددون (y) آهن:

2, 5, 7, 5, 1 سڀ کان اڳ ۾ اسين نسبتي تعددون لهنداسين جيڪي هي آهن 0.1, 0.35, 0.25, 0.25, ۽ 0.05 ٻن فرضي جماعتن سان لاڳاپيل ٽپڪا آهن $(1.47^*, 0)$, $(1.48, 0.1)$, $(1.49, 0.35)$, $(1.50, 0.25)$, $(1.51, 0.25)$, $(1.52, 0.05)$ ۽ $(1.53^*, 0)$ ٽپڪن کي ليڪ ٽڪرن سان ملائيندي، اسان نسبتي تعدي گھڻ پاسو حاصل ڪيو.

مثال 2: هيٺين ورهاست لاءِ، في سيڪڙو تعدي گھڻ پاسو ٺاهيو.

ٽڪرن جو مائو (ڪلوگرامن ۾)	7.1 - 7.3	7.4 - 7.6	7.7 - 7.9	8.0 - 8.2	8.3 - 8.5	8.6 - 8.8	8.9 - 9.1
ٽڪرن جو تعداد	3	5	9	14	11	6	2



x -axis تي، 5 ننڍا چورس = 0.3
 y -axis تي، 1 ننڍو چورس = 1

حل: مواد، مساوي جماعتي وقفي $h = 0.3$ واري مسلسل

تعدي ورهاست ظاهر ڪري ٿو. لڳائڻ وارا ٽپڪا (x, y) آهن جڏهن ته x جماعتي نشانن کي ظاهر ڪري ٿو جيڪي آهن:

7.2, 7.5, 7.8, 8.1, 8.4, 8.7, 9.0 ۽ y في سيڪڙو تعددن کي ظاهر ڪري ٿو جيڪي آهن. 4, 12, 22, 28, 18, 10, 6, 2

فرضي جماعتي نشان شامل ڪندي ۽ مناسب پئمائن کي استعمال ڪندي گهربل في سيڪڙو تعدي گھڻ پاسو هيٺين ٽپڪن سان

ٺاهيو ويو آهي. $(6.9^*, 0)$, $(7.2, 6)$, $(7.5, 10)$, $(7.8, 18)$, $(8.1, 28)$, $(8.4, 22)$, $(8.7, 12)$, $(9.0, 4)$ ۽ $(9.3^*, 0)$



22.2. مجموعي تعددي ورهاست (Cumulative frequency distribution):

مجموعي تعددي ورهاست هڪ جدول آهي جنهن ۾ مٿيون حقيقي جماعتي حدون ۽ انهن سان واسطو رکندڙ مجموعي تعددون پڻ درج هونديون آهن. اسين اڳيئي مجموعي تعددون جي لهن بابت ڄاڻون ٿا. مجموعي تعددون انهن مشاهدن جي تعداد کي جوڙ ڪري لهبيون آهن جيڪي جماعتن جي UCBs کان ننڍا هوندا آهن ۽ اسين انهن مجموعي تعددن کي هيٺيون مجموعي تعددون ”Less than Cumulat frequencies“ چوندا آهيون اهي ”0“ کان شروع ۽ مشاهدن جي ڪُل تعداد ” n “ تي ختم ٿينديون آهن. اسان کي شروع ۾ هڪ فرضي UCB شامل ڪرڻي پوندي جنهن جي مجموعي تعدد 0 هجي.

مٿيون مجموعي تعددون ”The greater than cummulative frequencies“ جماعتن جي LCB کان وڌن سڀني مشاهدن کي جوڙ ڪرڻ سان لهبيون آهن. اهي ” n “ کان شروع ۽ ”0“ تي ختم ٿينديون آهن. پر اسان عملي طور اڪثر هيٺيون مجموعي تعددون استعمال ڪندا آهيون. اڳتي ايندڙ بحث ۾ اسين سولائي خاطر ”هيٺيون مجموعي تعددون“ لاءِ اصطلاح ”مجموعي تعدد“ استعمال ڪنداسين.

(i) 22.2 هڪ مجموعي تعددي جدول جي جوڙجڪ ڪرڻ:

گروهي مقداري مواد جي مجموعي تعددي جدول ٺاهڻ لاءِ هيٺيان قدم آهن.

1. مٿيون حقيقي جماعتي حدون ۽ مجموعي تعددون لھو.
2. شروع ۾، مجموعي تعدد 0 واري هڪ فرضي مٿين حقيقي جماعتي حد جو اضافو ڪريو.
3. سڀني UCBs ۽ ترتيبوار مجموعي تعددن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ هڪ جدول ٺاهيو.

شاگردن جون مارڪون	1	2	3	4	5
شاگردن جو تعداد	2	5	4	3	1

مثال 1: هيٺيون مواد استعمال ڪندي هڪ مجموعي تعددي جدول ٺاهيو.

حل: ڏنل مواد هڪ غير مسلسل تعددي ورهاست ظاهر ڪري ٿو.

مجموعي تعددون	تعددون	UCBs	جماعتون
2	2	1.5	1
7	5	2.5	2
11	4	3.5	3
14	3	4.5	4
15 = n	1	5.5	5

هتي $d = 1$ ۽ $n = 15$ جماعتي حدن ۾ $\frac{d}{2}$ کي جوڙ ڪندي، UCBs کي لهن ۽ ان کانپوءِ مجموعي تعددن کي معلوم ڪندي اسان پاسي واري جدول حاصل ڪئي. شروع ۾ مجموعي تعدد ”0“ واري هڪ فرضي UCB شامل ڪندي جنهن جو ملهه $*0.5$ آهي، اسان گهربل مجموعي تعددي جدول حاصل ڪئي جيڪا آهي:

شاگردن جون مارڪون (UCBs)	*0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	4.5
شاگردن جو تعداد (مجموعي تعددون)	0	2	7	11	14	15

مثال 2: بجلي جي استعمال جي مواد واري مجموعي تعددي جدول ٺاهيو.


بجلي جو استعمال (kWh)	68-87	88-107	108-127	128-147	148-167	168-187	188-207
ڏينهن جو تعداد	10	13	15	10	4	6	2

حل: ڏنل مواد هڪ مسلسل تعددي ورهاست آهي.

هتي $d = 1$ ۽ $n = 60$ UCBs آهن: 87.5, 107.5, 127.5, 147.5, 167.5, 187.5, 207.5

شروعات ۾ $*67.5$ ملهه واري فرضي UCB شامل ڪريو اسان وٽ هيٺين مجموعي تعددي جدول آهي.

بجلي جو استعمال (kWh)	*67.5	87.5	107.5	127.5	147.5	167.5	187.5	207.5
ڏينهن جي تعداد	0	10	23	38	48	52	58	60



(ii) 22.2 مجموعي تعددي گھٽ پاسو ٺاهڻ:


هڪ مجموعي تعددي ورهاست گراف وسيلي هڪ مجموعي تعددي گھٽ پاسو (Commutative frequency polygon) سان ظاهر ڪبي آهي ان کي لهر دار ليڪ (Ogive) پڻ چئبو آهي. اسين مجموعي تعددي جدول جي ٽيڪن (x, y) کي ظاهر ڪرڻ شروع ڪنداسين x UCBs: y مجموعي تعددون) ته پوءِ انهن کي ليڪ ٽڪرن سان ملايو. آخر ۾ اسين x -axis تي چوٽي واري ٽيڪي تان عمود ٺاهينداسين ته جيئن هڪ بند شڪل ملي جيڪا گهريل (Ogive) يا مجموعي تعددي گھٽ پاسو آهي.

مثال 1: هيٺين مواد لاءِ هڪ Ogive (مجموعي تعددي گھٽ پاسو) ٺاهيو.

ٿڌي مشروب جي مقدار (لترن ۾)	1.48	1.49	1.50	1.51	1.52
ٻوٽن جو تعداد	2	7	5	5	1

حل: هتي $n = 20$ ۽ $d = 0.01$ UCBs ۽ مجموعي تعددن کي لهندي اسان مجموعي تعددي جدول حاصل ڪريون ٿا جڏهن ته 1.475^* هڪ فرضي شروعاتي UCB آهي.

x -axis تي، 5 ننڍا چورس $0.01 =$
 y -axis تي، 2 ننڍا چورس $5 =$




ٿڌي مشروب جي مقدار (لترن ۾)	1.475^*	1.485	1.495	1.505	1.515	1.525
ٻوٽن جو تعداد	0	2	9	14	19	20

هاڻي، اسين گراف تي هي ٽيڪا ظاهر ڪريون ٿا: $(1.475^*, 0)$ ، $(1.485, 2)$ ، $(1.495, 9)$ ، $(1.505, 14)$ ، $(1.515, 19)$ ۽ $(1.525, 20)$ انهن کي اسين ليڪ ٽڪرن سان ملائينداسين ۽ آخر ۾ اسين گهريل Ogive يا مجموعي تعددي گھٽ پاسو حاصل ڪرڻ لاءِ آخري ٽيڪي کان x -axis ڏانهن هڪ عمود ڪڍنداسين. محورن کي واضح طور ليبل ڪرڻ سان گڏ مناسب پئمائن کي بيان ڪيو ويندو.

مثال 2: هڪ انجڻ ۾ ڪيل 60 سوراخن جي قطر (سينٽي ميٽرن ۾) جي هيٺين ورهاست لاءِ Ogive ٺاهيو. اهو مواد ڪنهن خاص تحقيق ۾ ماپيل آهي.

قطر (س.م)	2.011 – 2.014	2.016 – 2.019	2.021 – 2.024	2.026 – 2.029	2.031 – 2.034
سوراخن جي تعداد	7	16	23	9	5

x -axis تي، 1 ننڍو چورس $0.001 =$
 y -axis تي، 2 ننڍا چورس $5 =$



حل: ڏنل جدول هڪ مسلسل تعددي جدول آهي جنهن ۾ $n = 60$ ۽ $d = 0.002$ UCBs ۽ مجموعي تعددن جو استعمال ڪندي. اسان هڪ مجموعي تعددي جدول حاصل ڪئي جنهن ۾ ٽيڪا آهن: $(2.010^*, 0)$ ، $(2.010, 7)$ ، $(2.020, 23)$ ، $(2.025, 46)$ ، $(2.030, 55)$ ۽ $(2.035, 60)$ اهي ٽيڪا اسان کي گهريل Ogive يا مجموعي تعددي گھٽ پاسو ڏين ٿا.



مشق 22.2

1. هيٺين مواد لاءِ في سيڪڙو ڪالمي نقشو، تعدادي گهٽ پاسو، مجموعي تعدادي جدول ۽ Ogive حاصل ڪريو.

شاگردن جون مارڪون	1	2	3	4	5
شاگردن جو تعداد	2	5	4	3	1

2. غير مساوي جماعتي وقفن واري هيٺين مراد لاءِ ڪالمي نقشو ٺاهيو.

جماعتي حدون	0-39	40-49	50-79	80-99
تعدادون	6	8	12	4

3. ڏنل مواد لاءِ ڪالمي نقشو، تعدادي گهٽ پاسو، مجموعي تعدادي جدول ۽ Ogive ٺاهيو.

هفتيوار ڪمائيل رقم	20-40	50-70	80-90	100-110	120-140	150-170
مائٽن جو تعداد	2	6	12	14	4	2

4. هيٺين مواد لاءِ ڪالمي نقشو، نسبتي تعدادي گهٽ پاسو ۽ Ogive ٺاهيو.

جماعتي حدون	10.5-10.9	11.0-11.4	11.5-11.9	12.0-12.9	13.0-13.4
تعدادون	2	7	10	12	8

22.3 مرڪزي رجحان جون ماپون (Measures of central tendency):

مواد ۾ مرڪزي ٽپڪي (Central point) جي چوڌاري سڀني مشاهدن جي ميڙ ڪرڻ واري صلاحيت کي مرڪزي رجحان (Central tendency) چئبو آهي. مواد جو مرڪزي ٽپڪي کي مرڪزي رجحان جي ماپ (Measure of Central tendency) يا سولائي خاطر سراسري (Average) چئبو آهي. مرڪزي رجحان جي ماپ سڄي مواد کي هڪ واحد مرڪزي ٽپڪي سان ظاهر ڪري ٿي ۽ سڄي مواد جي مختصر ۽ جامع سڃاڻپ آهي. اسين عام طور عددن ۽ خاصيتن جي سراسرين بابت بار بار ڳالهائيندا آهيون. مثال طور: هيٺين بيانن تي غور ڪريو.

1. ”هڪ ڪلاس ۾ شاگردن جي اڪثريت B گريڊ حاصل ڪيو.“ هتي B گريڊ هڪ سراسري آهي.
2. ”علي روزانو ورزش گاهه ۾ 45 منٽ گذاري ٿو“ هتي علي ورزش گاهه (GYM) ۾ سراسري وقت في ڏينهن 45 منٽ گذاري ٿو. اهو واضح آهي ته هن شايد 45 منٽن کان گهٽ يا وڌيڪ وقت گذاريو هجي.
3. ”T20 ۾ هڪ رانديگر جو سراسري اسڪور“ جيڪو منحصر ڪري ٿو انهن اسڪورن تي جيڪي هن سڀني ميچن ۾ راند ڪري ڪيا سراسري اسڪور ڌار ڌار ڪيل اسڪورن کي عام ڪري ٿو.


22.3 (i) مرڪزي رجحان جي ماپن کي لهڻ اسين عام طرح سان مواد جي سراسري يا مرڪزي رجحان جي ماپ سڀني مشاهدن کي جوڙ ڪري ۽ پوءِ مشاهدن جي ڪُل تعداد سان ونڊ ڪندي حاصل ڪندا آهيون جيڪا خاص طور سان حسابي سراسري (arithmetic mean) آهي سراسريون لهڻ جا ٻيا به ڪيترائي طريقا آهن اسين هتي هيٺين پنجن قسمن تي غور ڪنداسين.

- (1) حسابي سراسري (Arithmetic mean) (2) مڌياني سراسري (Median) (3) ڪثرتي سراسري (Mode)
 - (4) مهندسي سراسري (Geometric mean) (5) هارموني سراسري (Harmonic mean)
- انهن سراسرين جا ڪجهه فائدا ۽ نقصان آهن جڏهن انهن جي هڪٻئي سان پيٽ ڪجي، هڪ سراسري جو سڀ کان سٺو استعمال مواد جي قسم تي پڻ منحصر ڪري ٿو.

22.3 (i) (a) حسابي سراسري وصف وسيلي ۽ فرضي سراسري کان انحراف (Deviation) جو استعمال ڪندي:

حسابي سراسري سڀني مشاهدن جي وچ ۾ برابري واري اصول تي ٻيٺل آهي. اسين سڀني n مشاهدن کي جوڙ ڏيئي وسيلي ڏيکاريندا آهيون ۽ پوءِ ان جوڙ ڏيئي n سان ورهائيندا آهيون. جيڪڏهن $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ عدد آهن ته پوءِ انهن جي حسابي سراسري (ظاهر ڪيو آهي x سان) آهي

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \quad (1) \quad \text{يا} \quad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$



جڏهن ته "Σ" هڪ وڏو يوناني اکر سگما "SIGMA" آهي جيڪو جوڙ اُپت لاءِ استعمال ٿيندو آهي. نوٽ ڪيو ته:

- حسابي سراسري مواد جي وسعت اندر هڪ يگانو عدد آهي
- جيڪڏهن مواد مقداري هجي ته پوءِ اسين حسابي سراسري سڌي ريت لهي سگهون ٿا ناليواري يا قطاري مواد لاءِ اسين ترتيبوار عددي علامتون يا درجا استعمال ڪندا آهيون.
- حسابي سراسري ناليواري مواد لاءِ موزون ناهي

وصف يا سڌي طريقي وسيلي حسابي سراسري:

سڌي طريقي يا وصف وسيلي مان مراد آهي ته مشاهدن جي جاءِ يا پئماني کي بدلائڻ ڪانسواءِ ڏنل مواد مان سڌي ريت حسابي سراسري لهڻ.

وصف وسيلي يا سڌي طريقي ۾ اسين هيٺيان فارمولا استعمال ڪندا آهيون. غير گروهه مواد لاءِ

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{\sum x}{n}$$

گروهه مواد لاءِ

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i f_i}{\sum f_i} = \frac{\sum x f}{\sum f}$$

جڏهن ته x_i غير گروهه مواد ۾ ڌار ڌار مشاهدن کي ظاهر ڪري ٿو ۽ گروهه مواد ۾ جماعتي نشانن کي ظاهر ڪري ٿو جڏهن ته f_i واسطيدار جماعتي تعددون آهن. سولائي خاطر اسين هيٺين لکت کي فارمولن ۾ نظر انداز ڪري سگهون ٿا.

مثال ۱: وصف وسيلي هيٺ ڏنل ڊيٽا سيٽن جي حسابي سراسري لهو

18.92, 27.9, 34.7, 39.68 (iii). 7, 5, 74, 10 (ii). 2, 3, 7, 5, 5, 13, 1, 7, 4, 8, 3, 4, 3 (i).

حل وصف وسيلي يا سڌي طريقي سان اسان وٽ آهي.

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{2+3+7+5+5+13+1+7+4+8+3+4+3}{13} = \frac{65}{13} = 5. \quad (i).$$

وصف وسيلي سان وٽ آهي:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{7+5+74+10}{4} = \frac{96}{4} = 24. \quad (ii).$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{18.92+27.9+34.7+39.68}{4} = \frac{121.2}{4} = 30.3. \quad (iii).$$

نوٽ ڪريو ته: تمام وڏين رقمن (يا ٻين کان مختلف رقمن) سان حسابي سراسري اثرانداز ٿئي ٿي.

مثال 1 (ii) ۾ $\bar{x} = 24$ سڀني مشاهدن 74, 5, 7 کان گهڻو پري آهي ڇو جو 74 تمام وڏي رقم آهي.

مثال پنج شاگردن جا گريڊ، جن گروهه جي شڪل ۾ پڙهائي ڪئي، هئا: A, B, C, B+, A+ حسابي سراسري جو

استعمال ڪندي گريڊن جي سراسري ڳوليو:

حل: مواد قطاري آهي ۽ عددين سان درجا ڏيئي سگهجن ٿا. اسين گريڊن A+, A, B+, B, C+، C کي ترتيب وار

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{6+1+4+3+5}{5} = \frac{19}{5} = 3.8 \approx 4.$$

انهي ڪري گريڊن جي سراسري B+ آهي

مثال وصف وسيلي، هيٺين مواد ۾ ٿڌي مشروب جي مقدارن جي حسابي سراسري لهو

ٿڌي مشروب جي مقدار (لٽرن ۾)	1.48	1.49	1.50	1.51	1.52
بوتلن جو تعداد	2	7	5	5	1



x	f	xf
1.48	2	$1.48 \times 2 = 2.96$
1.49	7	10.43
1.50	5	7.5
1.51	5	7.55
1.52	1	1.52
	$\sum f = 20$	$\sum xf = 29.96$

حل: غير مسلسل جماعتن ۾ گروهِي مواد آهي جماعتي نشان (x) آھن 1.52, 1.51, 1.50, 1.49, 1.48 ۾ ڏيکاريل آھن آخر ۾ لٽر $\bar{x} = \frac{\sum xf}{\sum f} = \frac{29.96}{20} = 1.498$

حسابي سراسري جو استعمال ڪندي، ٿڌي مشروب جو سراسري مقدار 1.498 لٽر آهي. مثال وصف استعمال ڪندي گراهڪن جي اطمینان جي معيار جي حسابي سراسري لھو

ڏاڍو	ڪجهه	پڪ ناھي	گھڻو نه	بلڪل نه	اطمینان جي معيار
18	6	5	8	3	گراهڪن جو تعداد

حل: اسين قطاري بدلجندڙ جي خاصيتن ”بلڪل نه، گھڻو نه، پڪ ناھي، ڪجهه ۽ ڏاڍو“ کي ترتيبوار درجن 5, 4, 3, 2, 1 سان ظاهر ڪريون ٿا. وصف مطابق

$$\bar{x} = \frac{\sum xf}{\sum f} = \frac{(1)(3) + (2)(8) + (3)(5) + (4)(6) + (5)(18)}{3 + 8 + 5 + 6 + 18} = \frac{148}{40} = 3.7 \approx 4.$$

انهي ڪري اطمینان جي معيار جي سراسري چوٿون درجو آهي جيڪو ”ڪجهه“ آهي.

مثال 60 ڏينهن لاءِ، هڪ ڏڪان جي بجلي جي استعمال (kWh ۾) جي حسابي سراسري لھو

بجلي جو استعمال	68-87	88-107	108-127	128-147	148-167	168-187	188-207
ڏينهن جو تعداد	10	13	15	10	4	6	2

جماعتي حدون	جماعتي نشان (x)	تعداد (f)	xf
68-87	77.5	10	775
88-107	97.5	13	1267.5
108-127	117.5	15	1762.5
128-147	137.5	10	1375
148-167	157.5	4	630
168-187	177.5	6	1065
188-207	197.5	2	395
ڪُل تعداد	---	$\sum f = 60$	7270


حل مواد مسلسل تعددي جدول ڏيکاري ٿو. اسين ڀر واري جدول ۾ جماعتي نشان ۽ گھربل جوڙ اوبتون لھون ٿا وصف يا سڌي طريقي موجب $\bar{x} = \frac{\sum xf}{\sum f} = \frac{7270}{60} = 121.166$. ڏڪان جي بجلي جي استعمال جي حسابي سراسري 121.166kWh آهي

نوٽ ڪيو ته:

غير گروهِي مواد ۽ غير مسلسل تعددي جدول جون حسابي سراسريون ساڳيون آهن. ڀر مسلسل تعددي ورهاست واري مواد جي حسابي سراسري واسطيدار غير گروهِي مواد جي سراسري جي برابر نه آهي پر ويجهو آهي

انحرافن يا اڻ سڌي طريقن وسيلي حسابي سراسري:

جيڪڏهن x_i مشاهدا آهن ۽ A هڪ فرضي يا عارضي سراسري (مواد جي وسعت جي اندر يا ٻاهر ڪو به عدد) آهي ته پوءِ A سان انحراف $D_i = x_i - A$ آهن.



انحرافن جي بنياد تي ٻه اڻ سڌا طريقا آهن: مختصر ۽ فرضي طريقا. اهي وڏي رقمن واري وسيع مواد لاءِ استعمال ڪندا آهن.

مختصر طريقو: (Short cut Method)

مختصر طريقو استعمال ڪندي حسابي سراسري هيٺين ريت لکبي آهي.

$$\bar{x} = A + \frac{\sum D}{n}$$

$$\bar{x} = A + \frac{\sum Df}{\sum f}$$

غير گروهه مواد لاءِ x_i مشاهدا آهن، گروهه مواد لاءِ x_i جماعتي نشان آهن. گروهه مواد لاءِ اهو بهتر آهي ته سڀ کان وڏي تعدد سان واسطو رکندڙ x_i کي ”A“ ڪڍجي.

فرضي طريقو: (Ceding Method)

فرضي طريقو استعمال ڪندي حسابي سراسري لهن جا فارمولا آهن.

$$\bar{x} = A + h \frac{\sum u}{\sum n}$$

$$\bar{x} = A + h \frac{\sum uf}{\sum f}$$

جڏهن ته $u_i = \frac{x_i - A}{h}$ يا سولائي خاطر $u = \frac{x - A}{h}$ کي فرضي بدلجندڙ (Coded Variable) ڪوٺبو آهي غير

گروهه مواد لاءِ x_i مشاهدا آهن ۽ گروهه مواد لاءِ x_i جماعتي نشان آهن.

مثال ڇهه شاگردن جون ڪُل مارڪون، جيڪي امتحان لاءِ ٽولي جي صورت ۾ پڙهيا، هن ريت آهن 640, 610, 580, 710, 680, 685. سڌا طريقا استعمال ڪندي مارڪن جي حسابي سراسري لھو جڏهن ته $h = 20$. ۽ $A = 680$ (ii). $h = 10$ ۽ $A = 650$ (i).

حل مختصر طريقو بيان ڪري ٿو ته: $\bar{x} = A + \frac{\sum D}{n}$

$$\bar{x} = A + h \frac{\sum u}{n}, \quad u = \frac{x - A}{h}$$

ٻنهي حصن لاءِ، گهربل حساب جدولن ۾ ڌار ڌار ڏيکاريل آهن.

$h = 10$. ۽ $A = 650$ (i).


مختصر طريقي موجب، اسان وٽ آهي

$$\bar{x} = 650 + \frac{5}{6} = 650.833.$$

فرضي طريقي موجب، اسان وٽ آهي

$$\bar{x} = 650 + 10 \times \frac{0.5}{6} = 650 + \frac{5}{6} = 650.833.$$

x	$D = x - 650$	$u = \frac{x - 650}{10}$
610	-40	-4
640	-10	-1
685	35	3.5
680	30	3
710	60	6
580	-70	-7
	$\sum D = 5$	$\sum u = 0.5$



$$h = 20. \text{ ۽ } A = 680 \text{ (ii).}$$

مختصر طريقي موجب اسان وٽ آهي:

$$\bar{x} = 680 + \left(\frac{-175}{6} \right) = 680 - 29.1666$$

$$\bar{x} = 650.833.$$

فرضي طريقي موجب

$$\bar{x} = 680 + 20 \left(\frac{-8.75}{6} \right)$$

$$\bar{x} = 680 - 29.1666 = 650.833.$$

h ۽ A جي چونڊ جو خيال ڪرڻ بنا مارڪن جي حسابي

سراسري 650.833 يا 651 آهي

مثال مختصر ۽ فرضي طريقن وسيلي ٿڌي مشروب جي مقدارن (لترن ۾) جي حسابي سراسري لھو

ٿڌي مشروب جي مقدارن (لترن ۾)	1.48	1.49	1.50	1.51	1.52
ٻولتن جو تعداد	2	7	5	5	1

حل هتي اسين $h = 0.01$ ۽ $A = 1.49$ جو استعمال ڪريون ٿا حساب وضاحت سان جدول ۾ آهن.

x	f	$D = x - 1.49$	$u = \frac{x - 1.49}{0.01}$	Df	uf
1.48	2	-0.01	-1	-0.02	-2
1.49	7	0	0	0	0
1.50	5	0.01	1	0.05	5
1.51	5	0.02	2	0.1	10
1.52	1	0.03	3	0.03	3
	$\sum f = 20$			$\sum Df = 0.16$	$\sum uf = 16$

$$\bar{x} = A + \frac{\sum Df}{\sum f} = 1.49 + \frac{0.16}{20} = 1.498. \text{ مختصر طريقي موجب}$$


$$\bar{x} = A + h \times \frac{\sum uf}{\sum f} = 1.49 + 0.01 \left(\frac{16}{20} \right) = 1.498. \text{ فرضي طريقي موجب}$$

مثال اسين اهو ڏسون ٿا ته ٻنهي اڻ سڌي طريقن ۽ وصف وسيلي جواب ساڳيا آهن. 50 ڏاتو جي ٽڪرن جي مابين جي حسابي سراسري مختصر ۽ فرضي طريقن سان لھو.

ٽڪر جو مابو (ڪلو گرامن ۾)	7.1-7.3	7.4-7.6	7.7-7.9	8.0-8.2	8.3-8.5	8.6-8.8	8.9-9.1
ٽڪرن جو تعداد	3	5	9	14	11	6	2

حل هتي اسين $h = 0.1$ ۽ $A = 8.1$ کڻندي ڏسون ٿا حساب ڪريون ٿا.

جماعتي نشان (x)	f	$D = x - 8.1$	$u = \frac{x - 8.1}{0.1}$	Df	uf
7.1-7.3	3	-0.9	-9	-2.7	-27
7.4-7.6	5	-0.6	-6	-3	-30
7.7-7.9	9	-0.3	-3	-2.7	-27
8.0-8.2	14	0	0	0	0
8.3-8.5	11	0.3	3	3.3	33
8.6-8.8	6	0.6	6	3.6	36
8.9-9.1	2	0.9	9	1.8	18
	$\sum f = 50$			$\sum Df = 0.3$	$\sum uf = 3$



$$\bar{x} = A + \frac{\sum Df}{\sum f} = 8.1 + \frac{0.3}{50} = 8.106 \quad \text{مختصر طريقي موجب}$$

$$\bar{x} = A + h \times \frac{\sum uf}{\sum f} = 8.1 + 0.1 \times \left(\frac{3}{50} \right) = 8.106 \quad \text{فرضي طريقي موجب}$$

انهي ڪري مائي جي سراسري 8.106 ڪلو گرام آهي

22.3(i). مڌيان، ڪثرتي سراسري، مهندسي سراسري ۽ هارموني سراسري:

حسابي سراسري (برابري تي بيٺل) کان علاوه مواد جي مرڪزي رجحان جون ماپون لهڻ لاءِ ڪجهه ٻيا طريقا به آهن. مثال طور اسان جي چونڊن واري نظام ۾ هر ڪنهن کي ووٽ ڏيڻ جو حق آهي پر منتخب نمائندا نيٺ اڪثريت جي بنياد تي چونڊبا آهن جيئن ته چيو وڃي ٿو ته ”اڪثريت کي اختيار آهي.“ اهڙي صورت ڪثرتي سراسري (Mode) کي ظاهر ڪري ٿي جيڪو سڀ کان گهڻو ايندڙ مشاهدو آهي. ساڳي ريت مڌيان جو مرڪز ترتيب ڏنل ڊيٽا سيٽ جي سڀ کان وچيون حصو هوندو آهي. مهندسي ۽ هارموني سراسريون (Geometric and Harmonic Means) حسابي سراسري وانگر فطري طور حسابي آهن ان جي برعڪس مڌيان ۽ ڪثرتي سراسري فطري طور بياني آهن.

مڌيان (Median)

هڪ ترتيب ڏنل مواد ۾ مڌيان هڪ اهڙي رقم آهي جيڪا مواد کي ٻن برابر حصن ۾ ورهائي ٿي مڌيان معلوم ڪندي اسين اهو فرض ڪندا آهيون ته وڌندڙ يا گهٽجندڙ ترتيب واري سڄي مواد جو مرڪزي ٽپڪو وچين جاءِ تي آهي

نوٽ

- مواد ۾، مڌيان هميشه يگانو هوندو آهي.
- اسين مقداري مواد جو مڌيان لهي سگهون ٿا.
- خاصيتي مواد لاءِ رڳو قطاري مواد جو مڌيان لهڻ اهم هوندو آهي.
- مڌيان سمورن مشاهدن تي برابري سان انحصار نٿو ڪري.
- مڌيان، مواد جي وڌين رقمن (يا ٻين کان مختلف رقمن) سان متاثر نه ٿيندو آهي ”n“ مشاهدن واري ترتيب ڏنل غير گروهجي مواد لاءِ، مڌيان ”m“ مواد جو سڀ کان وچيون حصو آهي ۽ هيٺين ٻن صورتن ذريعي بيان ڪري سگهجي ٿو

$$\text{جيڪڏهن } n \text{ اڪي آهي ته پوءِ} \quad \left(\frac{n+1}{2} \right) \text{ هون مشاهدو} \quad (1)$$

ٻي صورت ۾

$$\text{جڏهن } n \text{ ٻڌي آهي ته پوءِ} \quad \left[\frac{1}{2} \left(\left(\frac{n}{2} + 1 \right) \text{ هون} + \left(\frac{n}{2} \right) \text{ هون} \right) \right] = m \quad (2)$$


غير مسلسل جماعتن واري گروهجي مواد لاءِ، مجموعي تعددن جي مدد سان اسين (1) ۽ (2) جو استعمال ڪندي مڌيان کي چونڊيندا آهيون

مسلسل جماعتن واري گروهجي مواد لاءِ، مڌيان $\left(\frac{n}{2} \right)$ هون مشاهدو رکندڙ جماعت ۾ هوندو آهي ان جماعت کي مڌياني جماعت (جماعت m) پڻ چئبو آهي.

فارمولو هن ريت آهي

$$(3) \quad m = L + \frac{h}{f} \left(\frac{n}{2} - c \right)$$

جڏهن ته ”L“ مڌياني جماعت جي LCB آهي مڌياني جماعت جي ويڪر h ۽ تعداد f آهي مڌياني جماعت جي بلڪل اڳ واري جماعت جي مجموعي تعداد c آهي.



مثال هيٺين جو مڌيان لھو

18.92, 27.9, 37.4, 39.68 (iii). 7, 5, 74, 10 (ii). 2, 3, 7, 5, 5, 13, 1, 7, 4, 8, 3, 4, 3, (i).

حل (i). مواد کي وڌندڙ ترتيب ۾ لکندي. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 13.

هتي $n = 13$ (اڪي) تنهنڪري

$$4. = \text{ستون مشاهدو} = \text{هون مشاهدو} \left(\frac{13+1}{2} \right) = m$$

(ii). وڌندڙ ترتيب ۾ اسان وٽ آهن 5, 7, 10, 74

هتي $n = 4$ (ٻڌي) تنهنڪري

$$8.5 = \frac{1}{2} [7+10] = \frac{1}{2} [\text{ٻيون} + \text{ٽيون مشاهدو}] = \frac{1}{2} \left[\text{هون مشاهدو} \left(\frac{n}{2} + 1 \right) + \text{هون} \left(\frac{n}{2} \right) \right] = m$$

(iii). هتي $n = 4$ (ٻڌي). مواد اڳيئي ترتيب واري صورت ۾ آهي

$$m = \frac{1}{2} [\text{ٻيون} + \text{ٽيون مشاهدو}] = \frac{1}{2} [27.9 + 37.4] = 32.65.$$

مثال

شاگردن جي هيٺين ٻن ٽولين جو مڌيان گريڊ معلوم ڪريو

(i). A+, B+, C, B, A (ii). C+, A, B, B, B+, C, B+, A, A+, C

(i). ترتيب ٿيل مواد آهي A+, B+, C, B, A ۽ $n = 5$ (اڪي) تنهنڪري

$$m = \left(\frac{n+1}{2} \right) = \text{هون} \left(\frac{5+1}{2} \right) = \text{هون} = \text{ٽيون مشاهدو} = B+ \text{ اهو مڌيان گريڊ آهي.}$$

(ii). وڌندڙ ترتيب ۾ آئڻ کانپوءِ اسان وٽ آهي A+, A, A+, B+, B, B+, C, C, C, هتي $n = 10$

ٻه وچيان مشاهدا $\left(\frac{n}{2} \right)$ هون ۽ $\left(\frac{n}{2} + 1 \right)$ هون آهن

يعني ته پنجون ۽ ڇهون مشاهدا جيڪي B ۽ B+ گريڊ (مختلف) آهن انهي ڪري اسين اهو نتيجو ڪڍي

سگهون ٿا ته مڌيان گريڊ B ۽ B+ گريڊن جي وچ ۾ برابر ورهائجي ويو آهي

مثال 40 گراهڪن جي هيٺين مواد ۾ اطمينان واري معيار جو مڌيان معلوم ڪريو.

ڏاڍو	ڪجهه	پڪ ناهي	گهڻو نه	بلڪل نه	اطمينان وارو معيار
18	6	5	8	3	گراهڪن جو تعداد

حل $n = 40$ (ٻڌي) تنهنڪري ٻه وچيان مشاهدا 20 هون ۽ 21 هون آهن. اهي ٻئي جماعت ”ڪجهه“ ۾ موجود آهن

تنهنڪري اطمينان واري معيار جو مڌيان ”ڪجهه“ آهي.

مثال هيٺين مواد ۾ ٿڌي مشروب جو مڌيان مقدار لھو

1.48	1.49	1.50	1.51	1.52	ٿڌي مشروب جي مقدار (لٽر ۾)
2	7	5	5	1	ٻوٽن جو تعداد

x	f	مجموعي تعددون
1.48	2	2
1.49	7	9
1.50	5	14
1.51	5	19
1.52	1	20
$\sum f = 20$		


حل

هتي (ٻڌي) $n = \sum f = 20$

$$m = \frac{1}{2} [\text{ڏهون} + \text{يارنھون مشاهدا}]$$

مجموعي تعددن کي معلوم ڪندي اسين ڏسون ٿا ته ڏهون ۽

يارنھون مشاهدا مجموعي تعدد واري جماعت ۾ موجود آهن.



$$m = \frac{1}{2}[1.50 + 1.50] = \frac{1}{2}(3) = 1.50 \text{ لٽر}$$

مثال مواد جو استعمال ڪندي هڪ ڏڪان جي 60 ڏينهن لاءِ بجلي جي استعمال جو مڌيان لھو.

بجلي جو استعمال	68-87	88-107	108-127	128-147	148-167	168-187	188-207
ڏينهن جو تعداد	10	13	15	10	4	6	2

حل: هتي، $n = 60$ ۽ $h = 20$ هڪ مسلسل تعدادي جدول آهي تنهنڪري اسان کي حقيقي جماعتي حدون ۽ مجموعي تعدادون معلوم ڪرڻيون پونديون جيئن هيٺين جدول ۾ ٿيل آهي.

مجموعي تعدادون	f	حقيقي جماعتي حدون	جماعتي حدون
10	10	67.5-87.5	68-87
23	13	87.5-107.5	88-107
38 (m - جماعت)	15	107.5-127.5	108-127
48	10	127.5-147.5	128-147
52	4	147.5-167.5	148-167
58	6	167.5-187.5	168-187
60	2	187.5-207.5	188-207
	$n = 60$		

مڌياني جماعت (m - جماعت) اها جماعت آهي جيڪا $\left(\frac{n}{2}\right)$ هون مشاهدو رکي ٿي. يعني ته 30 هون مشاهدو تنهنڪري مجموعي تعداد 38 واري جماعت مڌياني جماعت آهي (m - جماعت) 108-127 آهي (جيئن جدول ۾ نمايان ڪيل آهي) فارمولي جو استعمال ڪندي.

$$m = L + \frac{h}{f} \left(\frac{n}{2} - c \right) = 107.5 + \frac{20}{15} \left(\frac{60}{2} - 23 \right)$$

$$\Rightarrow m = 107.5 + \frac{20}{15} (30 - 23) = 107.5 + \frac{20}{15} \times 7 = 107.5 + 9.333 = 116.833 \text{ kWh.}$$

$$L = \text{LCB جي } m\text{-جماعت} = 107.5$$

$$h = \text{جماعت } m\text{-جو جماعتي وقفو} = 20$$


$$\text{جماعت } m\text{-جي تعداد} = 15$$

$$C = 23 = \text{مڌياني جماعت کان بلڪل اڳ واري جماعت جي مجموعي تعداد}$$

چوٿائي ڪندڙ مشاهدا: (Quartiles)

چوٿائي ڪندڙ مشاهدا بيان ڪرڻ لاءِ هڪ ترتيب ڏنل مواد چئن برابر حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. مواد جي وسعت جي اندر ٽي چوٿائي ڪندڙ مشاهدا هوندا آهن جيڪي مواد کي چار برابر حصن ۾ ورهائڻ ٿا. پهريون (يا هيٺيون) چوٿائي ڪندڙ مشاهدو Q_1 25% کان 75% جي نسبت ۾ مواد کي ورهائي ٿو غير گروهه مواد لاءِ: جيڪڏهن $\frac{n}{4}$ سڄو عدد نه آهي ته پوءِ

$$\left(\frac{n+3}{4} \right) = Q_1 \quad (1) \text{ هون مشاهدو، ٻي صورت ۾ جيڪڏهن } \frac{n}{4} \text{ سڄو عدد آهي ته پوءِ}$$



$$Q_1 = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{n}{4} + 1 \right) \text{ هون} + \left(\frac{n}{4} \right) \text{ هون مشاهدو} \right] \quad (2)$$

غير مسلسل جماعتن واري گروهی مواد لاء، اسين (1) ۽ (2) جو استعمال پڻ ڪندا آهيون
مسلسل جماعتن واري گروهی مواد لاء، اسين هي فارمولو استعمال ڪنداسين

$$Q_1 = L + \frac{h}{f} \left(\frac{n}{4} - c \right)$$

جڏهن ته Q_1, L - جماعت جي LCB، h ان جي ويڪر ۽ f ان جو تعدد آهي
 Q_1 جماعت کان بلڪل اڳ واري جماعت جي مجموعي تعدد آهي C - جماعت اها جماعت آهي جيڪا
 $\left(\frac{n}{4} \right)$ هين مشاهدي کي رکي ٿي.

ٻيو (يا وچيون) چوٽائي ڪندڙ مشاهدو Q_2 ترتيب ڏنل مواد کي 50% - 50% نسبت ۾ ورهائي ٿو
اهو ۽ مواد جو مٿيان ٻئي ساڳيا آهن ٽيون (يا مٿيون) چوٽائي ڪندڙ مشاهدو Q_3 ترتيب ڏنل مواد کي
75% - 25% نسبت ۾ ورهائي ٿو
غير گروهی مواد لاء

جيڪڏهن $\frac{3n}{4}$ سڄو عدد نه آهي ته پوءِ

$$Q_3 = \left(\frac{3n+1}{4} \right) \text{ هون مشاهدو} \quad (4)$$

ٻي صورت ۾ جيڪڏهن $\frac{3n}{4}$ سڄو عدد آهي ته پوءِ

$$Q_3 = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{3n}{4} + 1 \right) \text{ هون} + \left(\frac{3n}{4} \right) \text{ هون مشاهدو} \right] \quad (5)$$

غير مسلسل جماعتن واري گروهی مواد لاء مجموعي تعددن سان گڏ مساواتون (4) ۽ (5) استعمال ٿينديون آهن
مسلسل جماعتن واري گروهی مواد لاء

$$Q_3 = L + \frac{h}{f} \left(\frac{3n}{4} - c \right)$$

جڏهن ته Q_3, L - جماعت جي LCB، h ان جي ويڪر ۽ f ان جي تعدد آهي. اها جماعت $\left(\frac{3n}{4} \right)$
هون مشاهدو رکي ٿي Q_3 - جماعت کان بلڪل اڳ واري جماعت جي مجموعي تعداد C آهي
مثال هيٺين ڏيئا سڀني ۾ هيٺيان ۽ مٿيان چوٽائي ڪندڙ مشاهدا لھو

(i). 1000, 1200, 1600, 1500, 1200 (ii). 32, 36, 36, 37, 39, 41, 45, 46

حل (i) ترتيب ڏنل ڏيئا سڀ آهي.

1000, 1200, 1200, 1500, 1600


هتي $n = 5$.

Q_1 لاء: (سڄو عدد ناھي) $\frac{n}{4} = \frac{5}{4} = 1.25$

تنهنڪري $Q_1 = \left(\frac{n+3}{4} \right)$ هون = ٻيو مشاهدو = 1200

Q_3 لاء: (سڄو عدد ناھي) $\frac{3n}{4} = \frac{3 \times 5}{4} = 3.75$

تنهنڪري $Q_3 = \left(\frac{3n+1}{4} \right)$ هون = چوٿون مشاهدو = 1500



(ii) ديٽا سيٽ اڳيئي ترتيب واري صورت ۾ آهي
 $n = 8$ ۽

Q_1 لاءِ: (سڄو عدد آهي) $\frac{n}{4} = \frac{8}{4} = 2$

تنهنڪري $Q_1 = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{n}{4} + 1 \right) \text{ هون} + \left(\frac{n}{4} \right) \text{ هون مشاهدو} \right]$

$Q_1 = \frac{1}{2} \left[\text{ٻيون} + \text{ٽيون مشاهدو} \right]$

$Q_1 = \frac{1}{2} (36 + 36) = 36$ لاءِ Q_3

(سڄو عدد آهي) $\frac{3n}{4} = \frac{3 \times 8}{4} = 6$

تنهنڪري

$Q_3 = \frac{1}{2} [\text{ڇهون} + \text{ستون مشاهدو}] = \frac{1}{2} [41 + 45] = 43$

مثال 80 ڪٽنبن ۾، ٻارن جي تعداد جا هيٺيان ۽ مٿيان چوٽائي ڪندڙ مشاهدا لھو

ٻارن جو تعداد	1	2	3	4	5	6
ڪٽنبن جو تعداد	8	10	10	25	20	7

حل غير تسلسل جماعتن وارو گروهي مواد مليل آهي جنهن ۾ $n = 80$ مجموعي تعددن کي لهندي جيئن جدول ۾ ڪيل آهي

x	f	مجموعي تعداد
1	8	8
2	10	18
3	10	28 Q_1 - جماعت
4	25	53
5	20	73 Q_3 - جماعت
6	7	80

Q_1 لاءِ (سڄو عدد آهي) $\frac{n}{4} = \frac{80}{4} = 20$

تنهنڪري Q_1 سراسري آهي 20 هين ۽ 21 هين مشاهدن جي. اهي ٻئي مجموعي تعداد 28 واري جماعت ۾ موجود آهن تنهنڪري


$Q_1 = \frac{1}{2} (3 + 3) = 3$

Q_3 لاءِ $\frac{3n}{4} = \frac{3 \times 80}{4} = 60$

مجموعي تعداد 73 واري جماعت ۾ 60 هون ۽ 61 هون مشاهدو موجود آهن

تنهنڪري $Q_3 = \frac{1}{2} (5 + 5) = 5$

مثال 100 شاگردن جي وزنن (ڪلو گرامن ۾) جا چوٽائي ڪندڙ مشاهدا لھو. مواد هيٺ ڏنل آهي



وزن (کلو گرامن ۾)	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94
شاگردن جو تعداد	10	24	46	12	8

حل هتي $n=100, h=5$ ۽ مسلسل جماعتن وارو گروهی مواد آهي. سڀ کان اڳ ۾ اسين حقيقي جماعتي حدون ۽ مجموعي تعددون معلوم ڪريون ٿا. اهي سڀ حساب ۾ واري جدول ۾ خلاصو ڪري ڏنل آهن.

مجموعي تعدد	f	حقيقي جماعتي حدون	جماعتي حدون
10	10	69.5-74.5	70-74
34 Q_1	24	74.5-79.5	75-79
80 جماعت- Q_3 ۽ m	46	79.5-84.5	80-84
92	12	84.5-89.5	85-89
100	8	89.5-94.5	90-94

$$Q_1 \text{ لاءِ } \frac{n}{4} = \frac{100}{4} = 25$$

مجموعي تعدد 34 واري

جماعت ۾ 25 هون مشاهدو موجود آهي تنهنڪري Q_1 - جماعت 75 - 79 آهي ان جماعت ۾

$$Q_1 = L + \frac{h}{f} \left(\frac{n}{4} - c \right) = 74.5 + \frac{5}{24} (25 - 10) = 77.625 \text{ کلو گرام}$$

$$Q_2 = m \text{ لاءِ } \frac{n}{2} = \frac{100}{2} = 50$$

مجموعي تعداد 80 واري جماعت ۾ 50 هون مشاهدو موجود آهي.

تنهن ڪري m - جماعت 80-84 آهي.

$$m = L + \frac{h}{f} \left(\frac{n}{2} - c \right) = 79.5 + \frac{5}{46} (50 - 34) = 81.239 \text{ کلو گرام}$$

$$Q_3 \text{ لاءِ } \frac{3n}{4} = \frac{3 \times 100}{4} = 75$$

مجموعي تعداد 80 واري جماعت ۾ 75 هون مشاهدو موجود آهي.

تنهنڪري Q_3 - جماعت ۽ m - جماعت ٻئي ساڳيون آهن جيڪا 80-84 آهي.

ان جماعت ۾


$$Q_3 = L + \frac{h}{f} \left(\frac{3n}{4} - c \right) = 79.5 + \frac{5}{46} (75 - 34) = 83.956 \text{ کلو گرام}$$

نوٽ ڪيو ته:

چوتائي ڪندڙ مشاهدا فطري طور تي بيهڪ وارا يا مقامي آهن جيستائين مشاهدن جو تعداد ساڳيو رهي ٿو تيستائين انهن جا مقام نه مٽبا آهن. مثال طور $n=10$ واري ترتيب ٿيل مواد لاءِ

$$Q_2 = m = \frac{1}{2} \left[\text{پنجون} + \text{چهون مشاهدو} \right]$$

۽ $Q_3 = \text{اٺون مشاهدو}$



10 مشاهدن وارو ڪوبه ترتيب ڏنل ڊيٽا سيٽ انهن مقامن جي پوڻيواري ڪندو جيئن ته هيٺ ڏنل آهي

$$Q_1 = 5, m = 10, Q_3 = 15 \quad 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 \quad a.$$

$$Q_1 = 12, m = 13.5, Q_3 = 20. \quad 10, 12, 12, 13, 17, 20, 20, 20, 21, 25 \quad b.$$

$$Q_1 = 1, m = 12, Q_3 = 17. \quad 1, 1, 1, 3, 12, 12, 13, 17, 19, 30 \quad c.$$

ڪثرتي سراسري (Mode)

مواد ۾ سڀ کان وڌيڪ ايندڙ مشاهدي کي ڪثرتي سراسري چئبو آهي. ڪثرتي سراسري ان اصول تي انحصار ڪندي آهي ته ”اڪثريت کي اختيار آهي.“ ڪثرتي سراسري ٻنهي مقداري ۽ خاصيتي مواد لاءِ لهي سگهجي ٿو اهو مواد جنهن ۾ ڪوبه ڪثرتي سراسري نه هجي ان کي غير- ڪثرتي (non-modal) چئبو آهي. هڪ ڪثرتي سراسري واري مواد کي ڪثرتي مواد، ٻه يا وڌيڪ سراسرين واري مواد کي گهڻ ڪثرتي مواد چئبو آهي. غير گروهه مواد لاءِ، هڪ يا وڌيڪ مشاهدا جيڪي ٻين جي مقابلي ۾ سڀ کان وڌيڪ دفعا اچن انهن کي ڪثرتي سراسري يا سراسريون چئبو آهي. جيڪڏهن اهي وجود رکن مسلسل جماعتن واري گروهه مواد لاءِ، ڪثرتي سراسري هڪ مشاهدو يا جماعت هوندي آهي جنهن جي تعدد سڀ کان وڌيڪ هجي. جيڪڏهن ٻه يا ٻه کان وڌيڪ جماعتن جي سڀ کان وڌي

تعدد ساڳي هجي ته مواد کي گهڻ ڪثرتي چئبو ۽ سڀ کان وڌيڪ تعدد وارا سڀ مشاهدا ڪثرتي سراسريون ڪوٺبا:

مسلسل جماعتن واري گروهه مواد لاءِ، سڀ کان وڌيڪ تعدد واري جماعت ڪثرتي جماعت (modal Class) ڪوٺبي ۽ ڪثرتي سراسري ان جماعت ۾ موجود هوندو آهي. ڪثرتي جماعت (m-جماعت) ۾ ڪثرتي سراسري

$$(M) \text{ لهڻ جو فارمولو آهي. } M = L + \frac{(f_M - f_{M-1}) \times h}{2f_M - f_{M-1} - f_{M+1}}$$

جڏهن ته M, L -جماعت جي h, LCB ويڪر ۽ f_M ان جي تعدد آهي M -جماعت جي بلڪل اڳ واري ۽ پوءِ واري جماعتن جون تعددون ترتيبوار f_{M-1} ۽ f_{M+1} آهن

مثال 1: هيٺين ڊيٽا سيٽن جي ڪثرتي سراسري لهو

- (i). 75, 76, 80, 80, 82, 82, 82, 85 (ii). 13, 14, 15, 11, 16, 10, 19, 20, 18, 17
(iii). 1.49, 1.50, 1.51, 1.50, 1.48, 1.51 (iv). 1, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 8, 9, 9, 6, 1, 10
(v). C+, A, B, B, B+, C, B, A, A+, C (گريد) (vi). ڏتبا، چڱو، چڱو، سنو موڱو، خراب، سنو

حل (i): $82 =$ ڪثرتي سراسري جيئن ته 82 تي ڀيرا اچي ٿو جيڪو ٻيئي ڪنهن به مشاهدي کان وڌيڪ آهي. (ii). مواد ۾ ڪابه ڪثرتي سراسري نه آهي. اهو غير ڪثرتي مواد آهي.

(iii). ڪثرتي سراسريون ٻه آهن 1.50 ۽ 1.51 جيئن ته اهي ٻئي برابر اچن ٿا ۽ ٻين کان وڌيڪ ڀيرا اچن ٿا

(iv). مواد تي ڪثرتي آهي يعني مواد ۾ ٽي ڪثرتي سراسريون آهن: 2، 5 ۽ 9

(v). گريد ”B“ سڀ کان وڌيڪ ڀيرا اچي ٿو تنهنڪري ڪثرتي گريد ”B“ گريد آهي.

(vi). مواد ۾ ٻه ڪثرتي سراسريون آهن: چڱو ۽ سنو جيئن ته اهي ٻئي برابر سڀ کان وڌيڪ ڀيرا ايندڙ مشاهدا آهن.

مثال 2: 45 ڪٽنبن جي مواد مان، هڪ ڪٽنب جي موبائيلن جي تعداد جي ڪثرتي سراسري لهو

موبائيلن جو تعداد	0	1	2	3	4	5	6	7
ڪٽنبن جو تعداد	1	7	15	12	5	2	2	1


حل: غير مسلسل جماعتن وارو گروهه مواد آهي.

هتي 15 سڀ کان وڌيڪ تعدد آهي ۽ اها جماعت ”2“ سان واسطو رکي ٿي. انهيءَ ڪري موبائيلن جي ڪثرتي تعداد في ڪٽنب 2 آهي

مثال 3: هيٺ ڏنل 30 شاگردن جي رت جي گروپن مان، ڪثرتي رت جو گروپ لهو

رت جو گروپ	A+	B+	AB+	O+	A-	B-	AB-	O-
شاگردن جو تعداد	6	5	3	7	3	1	2	3

حل: ڪثرتي رت جو گروپ O+ آهي جيئن ته اهو سڀ کان وڌيڪ تعدد ”7“ سان لاڳاپيل آهي



مثال 4: هيٺ ڏنل مواد مان 40 گراهڪن جي اطمینان جي معيار جي ڪثرتي سراسري لھو

ڏاڍو	ڪجهه	يڪ ناھي	گھڻو نه	بلڪل نه	اطمینان جو معيار
18	6	5	8	3	گراهڪن جو تعداد

حل: اطمینان جي معيار جي ڪثرتي سراسري ”ڏاڍو“ آھي جيئن ته اھو سڀ کان وڌيڪ ڀيرا اچي ٿو.
مثال 5: هيٺين مواد جو استعمال ڪندي 60 ڏينھن لاءِ هڪ ڏڪان ۾ بجلي جي استعمال ۾ kWh جي ڪثرتي سراسري

188-207	168-187	148-167	128-147	108-127	88-107	68-87	بجلي جو استعمال
2	6	4	10	15	13	10	ڏينھن جو تعداد

حل: مسلسل جماعتن وارو گروهه مواد آھي. سڀ کان وڏي. تعداد 15 آھي ڪثرتي جماعت 108-127 آھي حقيقي جماعتي حدون جدول ۾ ڪڍيل آھن. هتي

$$h = 20, L = 107.5, f_M = 15, f_{M-1} = 13, f_{M+1} = 10$$

$$M = L + \frac{(f_M - f_{M-1}) \times h}{2f_M - f_{M-1} - f_{M+1}}$$

$$M = 107.5 + \frac{(15 - 13) \times 20}{2(15) - 13 - 10} = 107.5 + \frac{2 \times 20}{30 - 23}$$

$$M = 107.5 + 5.71428 = 113.21428 \text{ kWh.}$$

تعداد	حقيقي جماعتي حدون	جماعتي حدون
10	67.5 - 87.5	68 - 87
13	87.5 - 107.5	88 - 107
15	107.5 - 127.5	108 - 127
10	127.5 - 147.5	128 - 147
4	147.5 - 167.5	148 - 167
6	167.5 - 187.5	168 - 187
2	188.5 - 207.5	188 - 207

نوٽ ڪيو ته: مثال 5 ۾ مسلسل تعددي ورهاست يڪ ڪثرتي هئي جيئن ته سڀ کان وڏي تعداد واري رڳو هڪڙي جماعت هئي. هيٺين مسلسل تعددي ورهاست جيڪا هڪ ٽار جي ريل جي قطر کي ظاهر ڪري ٿي ۽ 24 جاين تي قطر ماپيل آهن اهو مواد به ڪثرتي آهي.

قطر (mm)	2.10-2.13	2.14-2.17	2.18-2.21	2.22-2.25	2.26-2.29	2.30-2.33	2.34-2.37
جاين جو تعداد	4	5	4	4	5	1	1

هتي ٻه ڪثرتي جماعتون ”2.14-2.17“ ۽ ”2.26-2.29“ آهن جيڪي سڀ کان وڏي تعداد ”5“ سان لاڳاپيل آهن هر هڪ جماعت ۾ فارمولو استعمال ڪندي اسين ترتيبوار ڪثرتي قطر 2.175 mm ۽ 2.263 mm حاصل ڪري سگهون ٿا.


مهندسي سراسري (Geometric Mean)

مهندسي سراسري ۾ سڀني عددن کي برابر اهميت ڏني ويندي آهي. اسين سمورن عددن کي ضرب آيت وسيلي پاڻ ۾ ملائيندا آهيون ۽ پوءِ ضرب آيت جو ”n“ ملاوت جو اثر هٽائيندا آهيون. مهندسي سراسري (G.M) ان مواد جي ڪيڏن اهم آهي جيڪو مقداري ۽ واڌو هجي جيڪڏهن $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ سڀ واڌو عدد آهن ته پوءِ

$$G.M. = (x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n)^{\frac{1}{n}} = [\prod (x)]^{\frac{1}{n}} \quad (1)$$

هتي $\prod$ هڪ وڏو يوناني اکر پائي ”Pi“ آهي جيڪو ضرب آيت لاءِ استعمال ٿئي ٿو جيڪڏهن G.M وجود رکي ٿو ته پوءِ اهو يگانو هوندو آهي.

غير گروهه مواد لاءِ، فارمولو (1) کي G.M. لھڻ جو بنيادي فارمولو ڪوٺيو آھي. پر جڏھن مشاھدن جون رقمون وڌيون هجن ته پوءِ اسين لاڳرٿم وارو فارمولو استعمال ڪنداسين. جيڪو مساوات (1) جي ٻنهي پاسن جو لاڳرٿم وٺي ۽ خاصيتن جو استعمال ڪندي حاصل ڪيو آهي، جيڪو هن ريت آهي



$$G.M = \text{antilog} \left[\frac{\sum_{i=1}^n \log x_i}{n} \right] = \text{antilog} \left[\frac{\sum \log x}{n} \right] \quad (2)$$

مساوات (2) ۾ G.M مواد جي لاڳرٿم جي حسابي سراسري جو ضد لاڳرٿم آهي گروهي مواد لاءِ بنيادي فارمولو آهي:

$$G.M. = \left[(x_1)^{f_1} \times (x_2)^{f_2} \times \dots \times (x_n)^{f_n} \right]^{\frac{1}{\sum f}} = \left[\prod (x)^f \right]^{\frac{1}{\sum f}} \quad (3)$$

۽ لاڳرٿم وارو فارمولو آهي

$$G.M. = \text{antilog} \left[\frac{\sum f \cdot \log x}{\sum f} \right] \quad (4)$$

مساواتن (3) - (4) ۾ $f_1, f_2, \dots, f_n$ جماعتي تعددون آهن ۽ $x_1, x_2, \dots, x_n$ جماعتي نشان آهن اهي سڀ واڌو آهن. مساوات (4) ۾ ڪابه تعداد ٻڌي نه هئڻ گهرجي

مثال 1: بنيادي ۽ لاڳرٿم وارو فارمولو استعمال ڪندي G.M. لهر. انهن مان ڪهڙو بهتر آهي ۽ ڇو؟

(i). 2, 4, 2, 16

(ii). 1.48, 1.52, 1.47, 1.50

(iii). 1000, 1200, 1600, 1500, 1200

حل: (i) بنيادي فارمولو استعمال ڪندي

$$G.M. = (2 \times 4 \times 2 \times 16)^{\frac{1}{4}} = (256)^{\frac{1}{4}} = 4.$$

$$G.M. = \text{antilog} \left[\frac{\log(2) + \log(4) + \log(2) + \log(16)}{4} \right] \text{ لاڳرٿم وارو فارمولو استعمال ڪندي:}$$

$$G.M. = \text{antilog} \left[\frac{0.3010 + 0.6021 + 0.3010 + 1.2041}{4} \right] = \text{antilog} (0.60205) = 3.9999 \approx 4.$$

مشاهدن جون رقمون ننڍيون هيون انهي ڪري بنيادي فارمولو بهتر آهي.

(ii) بنيادي فارمولو استعمال ڪندي

$$G.M. = (1.48 \times 1.52 \times 1.47 \times 1.50)^{\frac{1}{4}} = (4.9604)^{\frac{1}{4}} = 1.4924$$

$$G.M. = \text{antilog} \left[\frac{\log(1.48) + \log(1.52) + \log(1.47) + \log(1.5)}{4} \right] \text{ لاڳرٿم وارو فارمولو استعمال ڪندي}$$

$$G.M. = \text{antilog} \left[\frac{0.1703 + 0.1818 + 0.1673 + 0.1761}{4} \right] = \text{antilog} (0.173875) = 1.4924.$$

وري بنيادي فارمولو موزون آهي جيئن ته مشاهدن جون رقمون ننڍيون آهن

(iii) بنيادي فارمولو استعمال ڪندي


$$G.M. = (1000 \times 1200 \times 1600 \times 1500 \times 1200)^{\frac{1}{5}} = (345600000000000)^{\frac{1}{5}} = 1281.48 \approx 1281.5$$

لاڳرٿم وارو فارمولو استعمال ڪندي

$$G.M. = \text{antilog} \left[\frac{\log(1000) + \log(1200) + \log(1600) + \log(1500) + \log(1200)}{5} \right]$$

$$G.M. = \text{antilog} \left[\frac{3 + 3.0792 + 3.2041 + 3.1761 + 3.0792}{5} \right] = \text{antilog} (3.10772) = 1281.504 \approx 1281.5$$

لاڳرٿم وارو فارمولو بهتر آهي جيئن ته لاڳرٿم وڏين رقمن کي ننڍو ڪندو آهي. استعمال ڪرڻ لاءِ.



مثال: هيٺين مواد ۾ مهندسي سراسري جو استعمال ڪندي ٿڌي مشروب جي مقدارن جي سراسري لھو.

ٿڌي مشروب جي مقدار (لٽرن ۾)	1.48	1.49	1.50	1.51	1.52
ٻوٽلن جو تعداد	2	7	5	5	1

حل: ڏنل مواد، غير مسلسل جماعتن وارو گروهي مواد آھي. بنيادي فارمولي ۽ لاگريٽم واري فارمولي جو گهربل حساب هيٺين جدول ۾ ڏيکاريل آھي

جماعتون (x)	f	(x) ^f	log(x)	f × log(x)
1.48	2	2.1904	0.1703	0.3406
1.49	7	16.3044	0.1732	1.2124
1.50	5	7.5938	0.1761	0.8805
1.51	5	7.8503	0.1790	0.8950
1.52	1	1.52	0.1818	0.1818
---	Σ f = 20	Π x ^f = 3236.0651	---	Σ f log(x) = 3.5103

بنيادي فارمولو استعمال ڪندي

$$G.M. = \left[\prod (x)^f \right]^{\frac{1}{\sum f}} = (3236.0651)^{\frac{1}{20}} = 1.49796 \approx 1.498 \text{ لٽر}$$

لاگريٽم وارو فارمولو استعمال ڪندي

$$G.M. = \text{antilog} \left[\frac{\sum f \log x}{\sum f} \right] = \text{antilog} \left[\frac{3.5103}{20} \right]$$

ٿڌي مشروب جي مقدارن جو G.M 1.498 لٽر آھي $G.M. = \text{antilog} (0.175515) = 1.4980 \text{ L}$

مثال 3: لاگريٽم وارو طريقو استعمال ڪندي بجلي جي استعمال واري مواد جو G.M لھو

بجلي جو استعمال	68-87	88-107	108-127	128-147	148-167	168-187	188-207
ڏينهن جو تعداد	10	13	15	10	4	6	2

حل: فارمولي ۾ گهربل حساب هيٺين جدول ۾ ڪيل آھن


جماعتي حدون	f	جماعتي نشان (x)	Log (x)	f × log(x)
68-87	10	77.5	1.8893	18.8930
88-107	13	97.5	1.9890	25.8570
108-127	15	117.5	2.0700	31.0500
128-147	10	137.5	2.1383	21.3830
148-167	4	157.5	2.1973	8.7892
168-187	6	177.5	2.2492	13.4952
188-207	2	197.5	2.2956	4.5912
Σ f = 60				Σ f log x = 124.0586

انھي ڪري

$$G.M. = \text{antilog} \left[\frac{\sum f \log x}{\sum f} \right] = \text{antilog} \left[\frac{124.0586}{60} \right] = \text{antilog} (2.0676) = 116.8422 \text{ kWh.}$$

مثال 4: G.M جا ٻئي طريقا استعمال ڪندي تار جي ريل جي قطر جي سراسري لھوماپ 24 جاين تي ٿي آھي

قطر (mm) ۾	2.10-2.13	2.14-2.17	2.18-2.21	2.22-2.25	2.26-2.29	2.30-2.33	2.34-2.37
جاين جو تعداد	4	5	4	4	5	1	1



حل: ڏنل مواد مسلسل جماعتن وارو گروهه مواد آهي فارمولن ۾ گهربل حساب هيٺين جدول ۾ ڪيل آهن

جماعتي نشان حدون	جماعتي نشان (x)	f	x^f	$\log(x)$	$f \times \log x$
2.10-2.13	2.115	4	20.0097	0.3253	1.3012
2.14-2.17	2.155	5	46.4768	0.3334	1.6670
2.18-2.21	2.195	4	23.2134	0.3414	1.3656
2.22-2.25	2.235	4	24.9523	0.3493	1.3972
2.26-2.29	2.275	5	60.9406	0.3570	1.7850
2.30-2.33	2.315	1	2.315	0.3646	0.3646
2.34-2.37	2.355	1	2.355	0.3720	0.3720
		$\sum f = 24$	$\prod x^f = 178967745.4$	---	$\sum f \log x = 8.2526$

بنيادي فارمولي مطابق

$$G.M. = \left[\prod x^f \right]^{\frac{1}{\sum f}} = (178967745.4)^{\frac{1}{24}} = 2.2073 \text{ mm}$$

لاگريٽم واري فارمولي مطابق

$$G.M. = \text{antilog} \left[\frac{\sum f \log x}{\sum f} \right] = \text{antilog} \left[\frac{8.2526}{24} \right] = 2.2074 \text{ mm}$$

هارموني سراسري (Harmonic Mean)

هارموني سراسري H.M مواد جي معڪوسن جي حسابي سراسري جو معڪوس آهي H.M ۾ اسين سڀني غير بڙي عددن کي انهن جي معڪوسن جي جوڙي ايت وسيلي ملائيندا آهيون ۽ ان کانپوءِ جوڙي ايت کي n برابر حصن ۾ ورهائيندي ملاوت جي اثر کي هٽائيندا آهيون. آخر ۾ نتيجي جو معڪوس H.M آهي عام طرح سان مقداري مواد جو ڪڍيو آهي ۽ اهو هميشه يڪانو هوندو آهي. جيڪڏهن $x_1, x_2, \dots, x_n$ غير بڙي n عدد آهن ته پوءِ

غير گروهه مواد لاءِ جيڪڏهن غير بڙي جماعتي نشان x آهن. ته پوءِ

$$\text{H.M.} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}} \quad (1)$$

$$\text{جو معڪوس} \left[\frac{\sum \left(\frac{1}{x} \right)}{n} \right] = \frac{n}{\sum \left(\frac{1}{x} \right)}$$

$$\text{H.M.} = \frac{\sum f}{\sum \left(\frac{f}{x} \right)} \quad (2)$$


مثال 1: هر هڪ 10 ڪلو ميٽرن جي فاصلي لاءِ ماپيل گاڏي جي رفتارن جو H.M. لهو. رفتارون آهن 45km/h, 30km/h, 22km/h, 30km/h, 15km/h

حل:

$$\text{H.M.} = \frac{n}{\sum \left(\frac{1}{x} \right)} = \frac{5}{\frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{22} + \frac{1}{30} + \frac{1}{45}} = \frac{5}{0.0667 + 0.0333 + 0.0454 + 0.0333 + 0.0222}$$

$$\text{H.M.} = \frac{5}{0.2009} = 24.8880.$$

انهيءَ ڪري، H.M. جو استعمال ڪندي گاڏي جي سراسري رفتار 12.4719 km/h آهي



مثال 2: ٿڌي مشروب جي مقدار (لترن ۾) 20 بوتلن لاءِ ڏنل آهي. H.M. لھو.

ٿڌي مشروب جي مقدار لترن ۾	1.48	1.49	1.50	1.51	1.52
بوتلن جو تعداد	2	7	5	5	1

حل: ڏنل مواد، غير مسلسل جماعتن وارو گروهه مواد آهي. تنهنڪري

$$H.M. = \frac{\sum f}{\sum \left(\frac{f}{x}\right)} = \frac{2+7+5+5+1}{\frac{2}{1.48} + \frac{7}{1.49} + \frac{5}{1.50} + \frac{5}{1.51} + \frac{1}{1.52}}$$

$$H.M. = \frac{20}{1.3513 + 4.6980 + 3.3333 + 3.3112 + 0.6579} = \frac{20}{13.3517} = 1.4979 \text{ لتر}$$

مثال 3: ڏاتو جي 50 ٽڪرن جي مايي (ڪلو گرامن ۾) جو هارموني سراسري لھو. ان جو مواد ڏنل آهي

مايو (ڪلو گرامن ۾)	7.1-7.3	7.4-7.6	7.7-7.9	8.0-8.2	8.3-8.5	8.6-8.0	8.9-9.1
ٽڪرن جو تعداد	3	5	9	14	11	6	2

حل: ڏنل مواد مسلسل جماعتن وارو گروهه مواد آهي. فارمولي ۾ گهربل حساب جدول ۾ ڪيل آهن

$$H.M = \frac{\sum f}{\sum \left(\frac{f}{x}\right)} \text{ تنهنڪري:}$$


$$H.M = \frac{50}{6.1869} = 8.0816 \text{ Kg.}$$

جماعتي حدون	جماعتي نشان (x)	f	$\frac{f}{x}$
7.1-7.3	7.2	3	0.4167
7.4-7.6	7.5	5	0.6667
7.7-7.9	7.8	9	1.1538
8.0-8.2	8.1	14	1.7284
8.3-8.5	8.4	11	1.3095
8.6-8.8	8.7	6	0.6896
8.9-9.1	9.0	2	0.2222
ڪُل تعداد	---	50	6.1869

مشق 22.3

1. هيٺين جو A.M, G.M, H.M مڌيان ۽ ڪثرتي سراسري لھو (جتي ممڪن هجي)

- 3.2, 6, 10, 12, 12, -20, 25, 28, 30.8
- 14, 12, 18, 19, 0, -19, -18, -12, -14
- 6.5, 11, 12.3, 9, 8.1, 16, 18, 20.5, 25
- 51, 55, 52, 54, 58, 60, 61, 62, 52, 57, 52, 64
- A+, O-, AB+, O+, AB+, AB-, B+, AB+, O+, A- (رت جا گروپ)
- (طرف) اولهه، اوڀر، ڏکڻ، اتر
- B+, Fail, B+, A+, A-, C+, B+, A-, B-, Fail, A-, B+, C- (grades)



2. ڏهن مزدورن جي روز جي ڪمائي رڳيون 188, 170, 172, 125, 115, 195, 181, 190, 195 آهي. معلوم ڪريو AM (وصف وسيلي ۽ انحرافن وسيلي جڏهن $G.M.(h=10)$ ۽ $A=50$) (وصف وسيلي ۽ لاڳرٿم واري طريقي سان), HM, مڌيان ۽ ڪثرتي سراسري
3. A.M. مڌيان ۽ ڪثرتي سراسري جو استعمال ڪندي 60 ماڻهن جي مواد مان ڪتن جي ورتاءَ جي سراسري لھو
- | ڪتن سان نفرت ڪن ٿا | ڪتن کي ناپسند ڪن ٿا | ڪتب راءِ نه آهي | ڪتن کي پسند ڪن ٿا | ڪتن سان پيار ڪن ٿا | ورٽاءُ |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 8 | 13 | 4 | 15 | 20 | ماڻهن جو تعداد |
4. هڪ شهر ۾ فوتگي في مهيني واري هيٺين مواد مان موت جي سبب جي ڪثرتي سراسري لھو.
- | دل جو دورو | B.P. | ڪنيسر | ڪوويڊ | ڦار (دست ۽ الٽيون) | مليريا | ذبابيطس | T.B. | موت جو سبب |
|------------|------|-------|-------|--------------------|--------|---------|------|----------------|
| 5 | 2 | 10 | 15 | 2 | 2 | 6 | 10 | ماڻهن جو تعداد |
5. هڪ ڏڪان ۾ 50% رعايتي قيمت تي وڪيل جوٽن جون ماڻهن ڏنل آهن مڌيان Q_1, Q_3 ۽ ڪثرتي وڪيل جوٽي جي ماپ لھو جيڪي جوٽا ان ڏينهن وڪيا ويا.
- | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---|----------------|
| 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | جوتئي جي ماپ |
| 1 | 4 | 11 | 23 | 40 | 60 | 30 | 15 | 5 | 2 | جوڙين جو تعداد |
6. هڪ فيڪٽري جي هزار ملازمن جي روز جي مزوري (سون ۾) ڏنل آهي AM, GM, HM مڌيان چوٿائي ڪندڙ مشاهدا ۽ ڪثرتي مزدوري لھو.
- | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----------------------|
| 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | روز جي مزوري (سون ۾) |
| 1 | 6 | 25 | 69 | 139 | 204 | 220 | 175 | 102 | 43 | 13 | 3 | ملازمن جو تعداد |
7. هڪ ڪمپني جي گذريل 50 ڏينهن جي عرصي ۾ ڪاميل نفعن جو خلاصو هيٺ ڏنل آهي. مختصر ۽ فرضي طريقن سان نفعن جو AM لھو
- (a). $A = 9000, h = 2000$ (b). $A = 11000, h = 2000$
- | نفعو (ريپن ۾) | 4000-6000 | 6000-8000 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12000-14000 |
|----------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| ڏينهن جو تعداد | 5 | 7 | 11 | 21 | 6 |
8. شاگردن جون هڪ مضمون ۾ (50 مان) ڪنيل مارڪون هيٺ ڏنل گروهي مواد جي جدول ۾ ڏنل آهن. معلوم ڪريو AM, GM, سڌي ۽ لاڳرٿم واري طريقي سان, HM, مڌيان ۽ ڪثرتي سراسري
- | مارڪون | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| شاگردن جو تعداد | 9 | 18 | 35 | 17 | 5 |
9. AM, GM, HM مڌيان, چوٿائي ڪندڙ مشاهدا ۽ ڪثرتي سراسري لھو هيٺ ڏنل مواد جي
- | اجماعتِي حدون | 10.5-10.9 | 11.0-11.4 | 11.5-11.9 | 12.0-12.4 | 12.5-12.9 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| تعداد | 2 | 7 | 10 | 12 | 8 |


(iii) 22.3 حسابي سراسري A.M جي خاصيتن جي سڃاڻپ ڪرڻ

- جي خاصيتن جي سڃاڻپ ڪرڻ. هتي اسين، مثالن سان گڏ AM جي ڪجهه مکيه خاصيتن تي غور ڪريون ٿا
- غير گروهي مواد ۾ AM کان سمورن مشاهدن جي انحرافن جي جوڙ آيت ٻڙي آهي
 - هڪ مستقل ڊيٽا سيٽ جو AM اهو مستقل پاڻ ٿيندو
 - جيڪڏهن هڪ سيٽ جو AM $\bar{x}$ آهي ته پوءِ $Y = aX + b$ آهي $\bar{y} = a\bar{x} + b$ جڏهن ته a ۽ b حقيقي عدد آهن
 - جيڪڏهن $AM = GM = HM$ ته پوءِ ڊيٽا سيٽ جا سڀ مشاهدا ساڳيا يا مستقل هوندا.
 - هڪ غير مستقل مواد لاءِ $AM > GM > HM$
 - هڪ غير مستقل مواد لاءِ $(AM)(HM) \approx (G.M.)^2$
 - جيڪڏهن مڌيان $AM =$ ته پوءِ مواد همشڪلي آهي نه ته ٻي صورت ۾ مواد غير همشڪلي آهي
 - هڪ يڪ ڪثرتي ۽ همشڪلي مواد لاءِ ڪثرتي سراسري = مڌيان = AM
 - هڪ مستقل ڊيٽا ۾، ڪثرتي سراسري = مڌيان = $AM = GM = HM$

مثال ۱

هيٺين ڊيٽا سيٽن جي حسابي سراسري لھو.

- (i). $X = \{19, 19, 19, 19, 19\}$ (ii). $Y = \{3, 4, 6, 1, 6\}$ جيڪڏهن $Z = 3Y + 7$



حل (i): $X = \{19, 19, 19, 19, 19\}$ اهو هڪ مستقل آهي جنهن جون سڀ قيمتون 19 جي برابر آهن

تنهنڪري $\bar{x} = 19$

(ii): پهريان اسان معلوم ڪريون ٿا.

$$\bar{y} = \frac{3+4+6+1+6}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

هاڻي، جيئن

$$\bar{z} = 3\bar{y} + 7 = 3(4) + 7 = 19. \quad Z = 3Y + 7$$

اسين تصديق ڪري سگهون ٿا ته جڏهن $Z = 3Y + 7 = \{16, 19, 25, 10, 25\}$ ته پوءِ $\bar{z} = 19$ درست آهي

مثال 2: ثابت ڪري ڏيکارو ته A.M. کان $\{3, 4, 6, 1, 6\}$ ۾ انحرافن جي جوڙي اُپٽ ٻڌي ٿيندي

ثابتي: فرض ڪريو ته

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{20}{5} = 4. \quad X = \{3, 4, 6, 1, 6\}$$

هاڻي $\bar{x}$ کان انحراف آهن: $(3-4), (4-4), (6-4), (1-4), (6-4)$ يا رڳو $-1, 0, 2, -3, 2$ هاڻي اسان $\bar{x}$ کان سڀني انحرافن جي جوڙي اُپٽ لھون ٿا

$$\sum (X - \bar{x}) = (-1) + (0) + (2) + (-3) + (2) = 0. \Rightarrow \sum (X - \bar{x}) = 0$$

اهڙي طرح ثابت ٿيو.

مثال 3: تصديق ڪريو ته $\{19, 19, 19, 19, 19\}$ لاءِ ڪثرتي سراسري = مڌيان = A.M. = G.M. = H.M.

حل: ڏنل مستقل ڊيٽا سيٽ لاءِ سڀ سراسريون معلوم ڪندي. هتي (اڪي) $n = 5$

$$\text{A.M.} = \frac{19+19+19+19+19}{5} = 19 \quad (\text{i})$$

$$\text{G.M.} = (19 \times 19 \times 19 \times 19 \times 19)^{\frac{1}{5}} = 19^{\frac{5 \times 1}{5}} = 19. \quad (\text{ii})$$

$$\text{H.M.} = \frac{5}{\frac{1}{19} + \frac{1}{19} + \frac{1}{19} + \frac{1}{19} + \frac{1}{19}} = \frac{5}{\frac{5}{19}} = 19. \quad (\text{iii})$$

$$19 = \text{مڌيان} = \left(\frac{5+1}{2} \right) \text{ هون مشاهدو} = \text{ٽيون مشاهدو} \quad (\text{iv})$$

$$19 = \text{ڪثرتي سراسري} = (\text{سڀ کان وڌيڪ ايندڙ مشاهدو}) \quad (\text{v})$$

ساوات (i) - (v) مان اسان حاصل ڪيو ڪثرتي سراسري = مڌيان = AM = GM = HM انهي ڪري ثابت ٿيو

مثال 4: AM ۽ مڌيان جو استعمال ڪندي ڏسو ته ڇا ڏنل مواد همشڪلي يا غير همشڪلي آهي

(i). 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10 (ii). 4, 8, 13, 14, 19, 20, 23


حل:

$$\text{A.M.} = \frac{4+5+6+6+6+7+7+7+7+7+8+8+8+9+10}{16} = \frac{112}{16} = 7 \quad (\text{i}).$$

$$\text{مڌيان} = \frac{1}{2} [7 + 7] = 7$$

جيئن ته مڌيان = AM

انهي ڪري مواد همشڪلي آهي



$$A.M = \frac{4+8+13+14+19+20+23}{7} = 14.42$$

(ii).

$$\left[\frac{7+1}{2} \right] = \text{مڌيان} \quad \text{هون مشاهدو} = \text{چوٿون مشاهدو} = 14$$

جيئن ته مڌيان $AM \neq$ انهي ڪري مواد غير همشڪلي آهي

مثال 5: $\{4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8\}$ لاءِ تصديق ڪريو ته

$$A.M. > G.M. > H.M. \quad (i).$$

$$(G.M.)^2 \approx (A.M.)(H.M.). \quad (ii).$$

حل:

$$A.M. = \frac{4+5+6+6+6+7+7+8}{8} = 6.125,$$

$$G.M. = (4 \times 5 \times 6 \times 6 \times 6 \times 7 \times 7 \times 8)^{\frac{1}{8}} = 6.006$$

$$H.M. = \frac{1}{\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}} = 5.879.$$

جيئن ته $6.125 > 6.006 > 5.879$ تنهنڪري $A.M. > G.M. > H.M.$

انهي ڪري (i) جي تصديق ٿي

جيئن ته $(G.M.)^2 = 36.072$ ۽ $(A.M.)(H.M.) = 36.008$ تنهنڪري $(G.M.)^2 \approx (A.M.)(H.M.)$.

انهي ڪري (ii) جي تصديق ٿي

(iii) 22.3 قدري سراسري ۽ متحرڪ سراسري لھڻ

(a) قدري سراسري يا وزني سراسري (Weighted mean)

جيڪڏهن مواد ۾ ڪجهه مشاهدا ٻين کان وڌيڪ اهم هجن ته پوءِ اسين سراسري ڪڍڻ لاءِ سڀني کي برابر وزن يا قدر (نسبتي اهميت) ڏيئي سگهون. اها سراسري جيڪا مشاهدن جي قدرن يا نسبتي اهميت جو استعمال ڪندي ڪڍي وڃي ان کي قدري سراسري يا وزني سراسري چئبو آهي.

جيڪڏهن $x_1, x_2, \dots, x_n$ آهي عدد آهن جيڪي مواد ۾ مشاهدن سان لاڳاپيل آهن ۽ $w_1, w_2, \dots, w_n$ واسطيدار وزن آهن ته پوءِ قدري $G.M., A.M., H.M.$ آهن

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum w_i} = \frac{\sum w x}{\sum w},$$

$$G_w = \text{antilog} \left[\frac{\sum w \log x}{\sum w} \right]$$

$$H_w = \frac{\sum w}{\sum \left(\frac{w}{x} \right)}$$

مثال 1: هڪ شاگرد جي سماجي علمن جي ڊپلوما ڪورس جي هر هڪ پڙهيل مضمون جون مارڪون، انهن جي نسبتي قدرن سان گڏ مليل آهن. مارڪن جي قدري سراسري لھو.

رياضي	سائنس	تاريخ	فرانسيسي	انگريزي	مضمون
57	62	60	82	73	مارڪون
1	1	2	3	4	وزن

حل: فارمولا آهن

$$H_w = \frac{\sum w}{\sum \left(\frac{w}{x} \right)}, \quad G_w = \text{antilog} \left[\frac{1}{\sum w} (\sum w \log x) \right] \quad \text{۽} \quad \bar{x}_w = \frac{\sum x w}{\sum w}$$



اسين گهريل جوڙ اُپتون هيٺين جدول ۾ ڪيون ٿا

$$\bar{x}_w = \frac{777}{11} = 70.6 \text{ مارڪون}$$

$$G_w = \text{anti log} \left[\frac{1}{11} \times 20.2993 \right]$$

$$G_w = \text{antilog}(1.8454) = 70.04 \text{ مارڪون}$$

$$H_w = \frac{11}{0.1583} = 69.5 \text{ مارڪون}$$

x	w	x.w	$\frac{w}{x}$	log x	w.log x
73	4	292	0.0548	1.8633	7.4532
82	3	246	0.0366	1.9138	5.7414
60	2	120	0.0333	1.7782	3.5564
62	1	62	0.0161	1.7924	1.7924
57	1	57	0.0175	1.7559	1.7559
جوڙ ايت	11	777	0.1583	---	20.2993

نوٽ ڪريو ته:

مثال 1 ۾ غير قدري سراسريون آهن، $\bar{x} = 66.8$ ، $G.M. = 66.17$ ۽ $H.M. = 65.58$ جيڪي قدري سراسرين کان گهٽ آهن. مارڪن جي قدري سراسري، اهم ڪورسن کي وڌيڪ حصو ڏيندي. شاگرد جي سراسر ڪارڪردگي کي بهترين طريقي سان بيان ڪري ٿي

(b) متحرڪ سراسريون (Moving averages)

جيڪڏهن اسين وقت جي مستقل وقفن (ڏينهن ۾ / مهينن ۾ / سالن وغيره ۾) ۾ ڪنهن دلچسپي واري بدلاجندڙ جي سراسري رويي جو تجزيو ڪرڻ چاهيون ٿا ته پوءِ سراسري ۾ تبديلي جي کوچ ڪرڻ ڏاڍو اهم آهي جيئن مخصوص وقفن يا مدتن ۾ وقت گذري. ان صورت ۾ وقت جي مخصوص وقفن يا مدتن جي سراسري وقت سان گڏ تبديل يا حرڪت ڪندي رهندي آهي. ۽ انهن سراسرين کي متحرڪ سراسريون (Moving averages) چئبو آهي.

اڪي- وقفي وارين متحرڪ سراسرين جي صورت ۾، اسين متحرڪ سراسرين کي رڳو مخصوص وقفي جي وچ وارن خانن ۾ رکندا آهيون ۽ باقي خانا خالي ڇڏبا آهن. متحرڪ سراسرين کي اڳيئي موجود خانن ۾ رکبو آهي. ٻڌي- وقفي وارين متحرڪ سراسرين جي صورت ۾ اسين ٻن وچين خانن جي سراسري رکندا آهيون. ان طريقي سان اڳيئي موجود خانن ۾ متحرڪ سراسرين کي رکي سگهجي ٿو. هيٺين مثالن جي مدد سان طريقي کي واضح ڪجي ٿو.


مثال ۱: هيٺيون مواد گذريل سال لاءِ، هڪ شي جي ماهوار قيمت ڏيکارين ٿا. هيٺين جي حساب سان خلاصو ڪري بيان ڪري ٿو.

مهينو	نومبر	آڪٽوبر	سيپٽمبر	آگسٽ	جولائي	جون	مئي	اپريل	مارچ	فيبروري	جنوري	مهينو
330	289	307	220	200	150	139	108	102	91	87	180	قيمت ڏيکارين ٿا

معلوم ڪريو (i) 3 - مهيني واريون. (ii) 5 - مهيني واريون. (iii) 4 - مهيني واريون متحرڪ سراسريون

3 - مهيني واريون متحرڪ سراسريون	قيمت	مهينو
-----	180	جنوري
$(180+87+91)/3=119.33$	87	فيبروري
93.33	91	مارچ
100.33	102	اپريل
166.33	108	مئي
132.33	139	جون
163	150	جولائي
190	200	آگسٽ
242.33	220	سيپٽمبر
272	307	آڪٽوبر
308.66	289	نومبر
-----	330	ڊسمبر

حل (i): پهريان اسين 3 - مهيني واريون متحرڪ سراسريون لهنداسين اسين ٽن لاڳيتي مهينن جي شروعات ڪنداسين: جنوري، مارچ، فيبروري، اپريل، مارچ مئي ۽ اهڙي ريت آخري ٽن مهينن آڪٽوبر- ڊسمبر تي ختم ڪنداسين هي 3 - مهيني واري وقفي جي وچين مهيني ۾ رڳيون مثال طور جنوري- مارچ واري متحرڪ سراسري فيبروري جي پاسي ۾ رکبي 3 - مهيني واريون متحرڪ سراسريون ۾ واري جدول ۾ مختصر طور ڏنل آهن



مھينو	قيمت	5- مھيني واريون متحرڪ سراسريون
جنوري	180	-----
فيبروري	87	-----
مارچ	91	$(180+87+91+102+108)/5=113.6$
اپريل	102	105.4
مئي	108	118
جون	139	139.8
جولائي	150	163.4
آگسٽ	200	203.2
سيپٽمبر	220	233.2
آڪٽوبر	307	269.2
نومبر	289	-----
ڊسمبر	330	-----

(ii) 5- مھينن وارين متحرڪ سراسرين لاءِ اسين 5 لاڳيتا مھينا شروع ڪنداسين. جنوري - مئي، فيبروري - جون ۽ اهڙي طرح سان آگسٽ - ڊسمبر تي ختم ڪنداسين متحرڪ سراسريون پاسي واري جدول ۾ ڏيکاريل آهن. اسين ڏسي سگهون ٿا ته اهڙيون 8 سراسريون آهن. پھريون ۽ آخري ٻه خانا خالي رکبا. 5 مھينن واريون متحرڪ سراسريون وچ وارن مھينن تي رکيل آهن.

(iii) 4- مھينن وارين متحرڪ سراسرين لاءِ اسين هر دفعي چار لڳاتار مھينن جون ٽوليون ڪنداسين جيڪي شروع ۾ ريت ٿين ٿا: جنوري- اپريل، فيبروري - مئي، سيپٽمبر - ڊسمبر شروع ۾ 4 مھينن جي وچ ۾ سراسريون رکيون ويون آهن ان کانپوءِ گھربل 4- مھينن واريون مرڪزي متحرڪ سراسريون حاصل ڪرڻ لاءِ اسين 4- مھينن وارين سراسرين جي هر هڪ جوڙي جي وڌيڪ سراسري ڪنداسين هيٺين جدول ۾ نتيجن جو خلاصو بيان ڪيو ويو آهي. اسان هميشه ٻڌي- وقفي. وارين متحرڪ سراسرين لاءِ اسين ٻن ڪالمن جو اضافو ڪندا آھيون

مھينا	قيمتون	4- مھينن واريون متحرڪ سراسريون (شروعاتي)	4- مھينن واريون متحرڪ سراسريون (مرڪزي)
جنوري	180		-----
فيبروري	87		-----
مارچ	91	115	
اپريل	102	97	106
مئي	108	110	103.5
جون	139	124.75	117.375
جولائي	150	149.25	137
آگسٽ	200	177.25	163.25
سيپٽمبر	220	219.25	198.25
آڪٽوبر	307	254	236.625
نومبر	289	286.5	270.25
ڊسمبر	330		-----



نوٽ ڪريو ته: سال جي 12 مهينن جي سراسري واري قيمت (حسابي سراسري) برابر آهي 183.58 رپيا في مهينو. اسين ڏسي سگهون ٿا ته قيمتون مستقل نه هيون ۽ 3، 4، 5 مهينن واريون متحرڪ سراسريون سڄي سال جي ترتيبوار وقفن جي تبديلين جو بهتر طريقي سان خلاصو ڪن ٿيون.

22.3 مڌيان، چوٽائي ڪندڙ مشاهدن ۽ ڪثرتي سراسري جو گراف وسيلي اندازو لڳائڻ

گراف وسيلي مڌيان ۽ چوٽائي ڪندڙ مشاهدن جو هنڌ معلوم ڪرڻ ۽ اندازو لڳائڻ لاءِ اسين مواد جو 0 give (مجموعي تعدادي گهٽ پاسو) استعمال ڪندا آهيون. 0 give ۾ مڌيان هيٺيون چوٽائي ڪندڙ مشاهدو (Q_1) ۽ مٿيون چوٽائي ڪندڙ مشاهدو (Q_3) رڳو انهن ٽيڪن جا x - محدد يا x -coordinates آهن جن جا y - محدد يا y -coordinates (مجموعي تعدادن) ترتيبوار $\frac{n}{4}$ ۽ $\frac{3n}{4}$ آهن. گراف وسيلي ڪثرتي سراسري (جيڪڏهن وجود رکي) جو هنڌ لهن ۽ اندازو لڳائڻ لاءِ، اسين مواد جو ڪالمي نقشو استعمال ڪندا آهيون. ڪثرتي جماعت اها جماعت آهي جنهن لاءِ مستطيل جي اوچائي سڀ کان وڌي هوندي آهي ۽ ان جماعت ۾ ڪثرتي سراسري ٻن ليڪ ٽڪرن جي ڪاٽيندڙ مشترڪ ٽپڪي جو x -محدد آهي پهريون ليڪ ٽڪر ڪثرتي جماعت ۽ ان کان پوءِ واري جماعت سان واسطو رکندڙ مستطيلن جي ڪاٺي چوٽين کي ملائڻ سان ڪڍيو آهي ٻيو ليڪ ٽڪر ڪثرتي جماعت ۽ ان کان اڳ واري جماعت سان واسطو رکندڙ مستطيلن جي ساڄي چوٽين کي ملائڻ سان ڪڍيو آهي. ڪاٺ جي ٽپڪي کان x -محور ڏانهن عمود x -محور کي ڪثرتي سراسري جي هنڌ يا مقام تي لڳي ٿو. اهو طريقو مسلسل جماعتن واري گروهه مواد لاءِ استعمال ڪبو آهي.


مثال 1: گراف وسيلي مڌيان، چوٽائي ڪندڙ مشاهدا ۽ ڪثرتي سراسري واري وزنن (ڪلو گرامن ۾) جو هنڌ لھو ۽ اندازو لڳايو

وزن (ڪلو گرامن ۾)	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94
شاگردن جي تعداد	10	24	46	12	8

مجموعي تعداد	f	حقيقي جماعتي حدون	جماعتي حدون
10	10	69.5-74.5	70-74
34	24	74.5-79.5	75-79
80	46	79.5-84.5	80-84
92	12	84.5-89.5	85-89
100	8	89.5-94.5	90-94

حل: اسان وٽ $n=100$ ۽ ڏنل مواد مسلسل

جماعتن وارو گروهه مواد آهي. ogive ۽ ڪالمي نقشو ڪڍڻ لاءِ اسين پهريان ڀيرو واري جدول ۾ حقيقي جماعتي حدون ۽ مجموعي تعدادون معلوم ڪيون ٿا.



مڌيان ۽ چوٽائي ڪندڙ مشاهدن لاءِ، اسين y -axis تي


$$\frac{n}{2} = 50, \quad \frac{n}{4} = 25 \quad \text{۽} \quad \frac{3n}{4} = 75 \quad \text{جي سڃاڻپ ڪريون ٿا.}$$

ان کانپوءِ انهن مان ogive ڏانهن عمود ڪڍندي ۽ ان کانپوءِ ogive مان x -axis ڏانهن عمود ڪڍندي اسان کي ترتيبوار مڌيان Q ۽ Q_3 ملي ٿو، اسين انهن ملهن کي هن ريت لکنداسين


$$\text{مڌيان} \approx 81.2$$

$$77.6 \approx Q_1$$

$$83.9 \approx Q_3$$



ڪثرتي سراسري لاءِ اسين پهريان ڪالمي نقشو ڪيون ٿا جيئن هتي ڏيکاريل آهي: ڪثرتي جماعت سڀ کان ڏي اوجائي واري مستطيل سان واسطو رکي ٿي جيئن شڪل ۾ نمايان آهي. ٻه ليڪ ٽڪر حاصل ڪرڻ لاءِ، اسين ڪثرتي جماعت ۽ ان کانپوءِ واري جماعت جي مستطيلن جي کاٻي چوٽين کي ملائينداسين ان کانپوءِ ڪثرتي جماعت ۽ ان کان اڳ واري جماعت جي مستطيلن جي ساڄي چوٽين کي ملائينداسين. هاڻي ڪات جي ٽپڪي کان x -axis ڏانهن عمود- کي لڳ ڀڳ 81.4 تي لڳي ٿو جيڪو ڪثرتي سراسري جو هنڌ آهي. انهي ڪري ڪثرتي وزن لڳ ڀڳ 81.4 ڪلو گرام آهي.



مشق 22.4

- جيڪڏهن $X = \{-2, -2, -2, -2\}$ ۽ $W = \{148, 145, 160, 157, 156, 160, 160, 165\}$ ، ته پوءِ
 - ثابت ڪري ڏيکاريو ته W جي A کان سڀني انحرافن جي جوڙ اڻ ٻڌي آهي.
 - ثابت ڪري ڏيکاريو ته x جي ڪثرتي سراسري = مڌيان = $A.M. = G.M. = H.M.$
 - $Y = 3X$ جو $A.M.$ لھو
 - $Z = 3W - 11$ جو $A.M.$ لھو
 - ثابت ڪري ڏيکاريو ته W جي ڪثرتي سراسري < مڌيان $H.M. < G.M. < A.M.$
- ڇڪاس ڪريو ته ڇا $X = \{7, 9, 3, 3, 3, 4, 1, 3, 2, 2\}$ ۽ $Y = \{2, 1, 4, 4, 4, 6, 5, 7, 1\}$ همشڪلي آهن؟
- هڪ ڪٽنب لاءِ پوري مهيني ۾ گهريل شين جا گهريل وزن (ڪلو گرامن ۾) ۽ قيمتون (رپيا في ڪلو گرام) ڏنل آهن. $A.M.$ ۽ $H.M.$ جو استعمال ڪندي قيمتن جي مقداري سراسري لھو.


شي	A	B	C	D	E
قيمت (رپيا في ڪلو گرام)	300	200	600	250	650
گهريل وزن (ڪلو گرام)	25	5	4	8	3

- 50 خريد ڪيل سرن مان، 21 سرن جو سراسري مايو 24.2 ڪلو گرام آهي ۽ 29 سرن جو سراسري مايو 23.6 ڪلو گرام آهي. 50 سرن جو قدرتي سراسري مايو لھو.
- هڪ صوبي ۾، چوٽي واري هفتي ۾ ڪوويڊ 19 جي ڪري ٿيل فوتگين جي تعداد واري مواد مان 3, 2 ۽ 4 ڏينهن واريون متحرڪ سراسريون لھو.

اڇر	چنڇر	جمعو	خميس	اربع	اڱارو	سومر	ڏينهن
310	259	196	188	158	130	102	فوتگين جو تعداد

11 سالن ۾ وڪري (ملين رپين ۾) جون 4 ۽ 5 سالن واريون متحرڪ سراسريون لھو.



سال	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
وڪرو	102	130	158	188	196	259	310	188	196	259	310



7. ڏنل مواد ۾ گراف وسيلي مڌيان، چوٽائي ڪندڙ مشاهدا ۽ ڪثرتي سراسري جو هنڌ لھو ۽ انھن جو اندازو لڳايو.

اضافي وقت (ڪلاڪ في هفتو)	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
ڏينهن جو تعداد	5	4	7	11	12	8	1

8. هيٺين گرافن ۾ ظاهر ڪيل ماپن جو هنڌ لھو ۽ انھن جو اندازو لڳايو.
a ڪثرتي سراسري
b مڌيان ۽ چوٽائي ڪندڙ مشاهدا



22.4 پکڙجڻ جا پيمانا (Measures of Dispersion)

مواد ۾ تبديلي ۽ موافقت جو خيال ڪئي بنا مرڪزي رجحان جون ماپون يا پيمانا مواد جي سراسري يا مرڪزي رويي تي مرڪوز هوندا آهن. جڏهن مشاهدا سراسري کان گهڻو پري هجن ته پوءِ مواد جي ورتاءُ ۽ خاصيتن جي پوري سمجهه لاءِ رڳو مرڪزي رجحان جا پيمانا ڪافي نه هوندا آهن مثال طور: هيٺين جدول، ٻن شاگردن جي پنجن مضمونن ۾ ڪنيل مارڪون ڏيکاري ٿي.


مضمون	I	II	III	IV	V
شاگرد A جون مارڪون	90	30	85	50	25
شاگرد B جون مارڪون	63	50	60	55	52

جيڪڏهن اسين AM جو استعمال ڪندي

هر هڪ شاگرد جي حاصل ڪيل مارڪن جي سراسري لھون ته پوءِ اسين ڏسون ٿا ته ٻنهي شاگردن جي مارڪن جا AM 56 آهن پر ڇا ٻنهي شاگردن جي ڪارڪردگي ماپڻ لاءِ اهو ڪافي آهي جواب نه آهي. شاگرد A جي مارڪن ۾ سراسري جي چوڌاري وڏي گهٽ وڌائي آهي. جڏهن ته شاگرد B جون مارڪون سراسري جي وڌيڪ ويجهيون آهن. سراسري جي چوڌاري ٿوري گهٽ وڌائي يا تبديلي يا ڦٽلاو يا پکڙجڻ جي ڪري، شاگرد B جي ڪارڪردگي شاگرد A کان وڌيڪ مستحڪم يا هم آهنگ يا قابل اعتبار آهي. سراسرين جي سڀني قسمن، جيڪي اسان سکيا آهن جو استعمال ڪندي، اسين شاگردن جي مارڪن جون سراسريون ڏسي سگهون ٿا

سراسري	A.M.	مڌيان	ڪثرتي سراسري	G.M.	H.M.
شاگرد A جون مارڪون	56	50	ڪابه نه	49 لڳ ڀڳ	43 لڳ ڀڳ
شاگرد B جون مارڪون	56	55	ڪابه نه	56 لڳ ڀڳ	56 لڳ ڀڳ

مارڪن ۾ تبديلي جي ڪري، شاگرد A جون سراسريون هڪ ٻئي کان به گهڻو مختلف آهن. شاگرد B جون سراسريون هڪٻئي جي وڌيڪ ويجهو آهن.



مستحڪم ۽ هم آهنگ ڪارڪردگي جي ڪري اسين شاگرد A جي پيٽ ۾ شاگرد B جون ايندڙ مضمون ۾ مارڪن جي اڳڪٿي ڪرڻ لاءِ بهتر حالت ۾ آهيون. مواد جي گهٽ وڌائي يا تبديلي جو علم فيصلا يا اڳڪٿي ڪرڻ ۾ وڏي اهميت رکي ٿي. انهي ڪري مواد جي بهتر سمجھ لاءِ، اهو ڏاڍو اهم آهي ته اسين سراسريون لهڻ کان علاوه گهٽ وڌائي يا پڪڙجڻ جو درجو لهون. پڪڙجڻ جا پيمانو اهو ظاهر ڪن ٿا ته مواد سراسري يا مرڪزي نقطي جي چوڌاري ڪيتري حد تائين پڪڙيل آهي. پڪڙجڻ جو پيمانو يا ماپون مواد ۾ سراسر تبديلي کي ظاهر ڪري ٿو. استحڪام يا هم آهنگي يا اعتبار جي نقط نظر سان، اهو پن يا وڌيڪ ڊيٽا سيٽن جي پيٽ ڪرڻ لاءِ گهڻو استعمال ڪبا آهن. جيڪڏهن مواد ۾ وڌيڪ گهٽ وڌائي آهي ته پوءِ استحڪام يا هم آهنگي يا اعتبار گهٽ هوندو جيڪڏهن اسانجو واسطو رڳو هڪ ڊيٽا سيٽ جي گهٽ وڌائي يا تبديلي سان آهي ته پوءِ اسين پڪڙجڻ جا ماپا ڊيٽا سيٽ جي ايڪن ۾ لهنداسين ۽ انهن ماپن کي پڪڙجڻ جا قطعي پيمانو (Absolute measures of dispersion) چئبو آهي. پن يا وڌيڪ ساڳي قسم يا ايڪن، مشاهدن جو ساڳيو تعداد ۽ برابر يا ويجهن سراسري وارن ڊيٽا سيٽن جي گهٽ وڌائي يا تبديلي جي پيٽ پڻ پڪڙجڻ جي قطعي پيمانن سان ڪري سگهجي ٿي. ٻه يا وڌيڪ مختلف قسم يا ايڪن، مشاهدن جي مختلف تعداد ۽ مختلف سراسرين وارن ڊيٽا سيٽن جي پيٽ ڪرڻ لاءِ اسين پڪڙجڻ جا نسبتي پيمانو (Relative Measures of dispersion) استعمال ڪندا آهيون جيڪي مواد جي ايڪن ۾ نه هوندا آهن. پر تبديلي جو نسبتي ورتاءُ ڏيکارين ٿا.

(i) 22.4 وسعت جي وصف، سڃاڻپ ۽ ماپ ڪرڻ. تغير، سراسري انحراف ۽ معياري انحراف لهڻ:

هتي اسين پڪڙجڻ (Dispersion) جا ڪجهه اهم پيمانن تي غور ڪنداسين.

(a) وسعت (Range)

مواد جي وسعت مان مراد آهي ته ٻه انتهائي مشاهدن جو فرق. غير گروهه مواد لاءِ، وسعت (R) سڀ کان وڏي مشاهدي (x_L) ۽ سڀ کان ننڍي مشاهدي (x_S) جي وچ ۾ فرق آهي.

$$\text{يعني ته } R = x_L - x_S \quad (1)$$

گروهه مواد لاءِ، وسعت R آخري جماعت جي UCB (يعني UCB_F) ۽ شروعاتي جماعت جي LCB يعني LCB_I) جي وچ ۾ فرق آهي

$$\text{يعني ته } R = UCB_F - LCB_I \quad (2)$$

فارمولن (1) ۽ (2) مان مطلق يا قطعي وسعت (Absolute Range) لهبي آهي، نسبتي وسعت (Relative Range) اسين مساوات (1) ۽ (2) ۾ ترتيبوار $x_L + x_S$ ۽ $UCB_F + LCB_I$ سان ونڊ ڪنداسين تي جيئن پيٽ ٿي سگهي.

نوٽ ڪيو ته:

- نهايت مختلف مشاهدن واري مواد جي گهٽ وڌائي کي وسعت پوري ريت نه ماپندي آهي
- تعددن ۽ ٻين پيراميٽرن جو استعمال ڪرڻ بنا وسعت رڳو مواد جي پڇاڙي وارن مشاهدن جو استعمال ڪندي آهي.

مثال 1: ڏنل ڊيٽا سيٽن جي وسعت لهو.

$$X = \{3, 8, 10, 7, 5, 14, 2, 12, 8\}, W = \{27.90, 34.70, 54.40, 18.92, 47.60, 39.68\}$$

$$Z = \{1, 3, 2, 4, 3, 2, 43\}, Y = \{8, 8, 8, 8, 8\}$$

نتيجن جو مطلب پڻ ٻڌايو

$$\text{حل: اسان کي خبر آهي ته غير گروهه مواد لاءِ } R = x_L - x_S$$

$$R_Z = 43 - 1 = 42, R_Y = 8 - 8 = 0, R_X = 14 - 2 = 12, R_W = 54.40 - 18.92 = 35.48$$

تنهنڪري، اسين ڊيٽا سيٽ W جي وسعت جو مطلب هن ريت ڪڍي سگهون ٿا. ”ڊيٽا سيٽ W ۾ سڀ مشاهدا پڇاڙي واري مشاهدن 18.92 ۽ 54.40 جي وچ ۾ 35.48 جي فاصلي اندر موجود آهن.“ ڊيٽا سيٽن X ۽ W ۾ مشاهدا پڇاڙي وارين رڳن جي وچ ۾ پوري طرح پڪڙيل آهن. تنهنڪري وسعت گهٽ وڌائي يا تبديلي کي با معنيٰ انداز ۾ ظاهر ڪري ٿو. سيٽ Y جي وسعت ٻڙي آهي. ڇاڪاڻ ته سڀ مشاهدا ساڳيا آهن ۽ انهن ۾ ڪابه گهٽ وڌائي نه آهي. سيٽ Z ۾ مشاهدن جي اڪثريت 1 ۽ 4 جي وچ ۾ آهي پر هڪ انتهائي مختلف مشاهدي 43 جي ڪري وسعت 42 گمراه ڪندڙ آهي.



مثال 2: وسعت جو استعمال ڪندي هيٺ ڏنل پنج مضمونن ۾ ٻن شاگردن جي مارڪن جي گهٽ وڌائي جي پيٽ ڪريو ۽ نتيجن جو مطلب ڪيو

شاگرد A جون مارڪون	90	30	85	50	25
شاگرد B جون مارڪون	63	50	60	55	52

حل: ٻنهي شاگردن وارو مواد غير گروهه آهي مارڪن جون مطلق وسعتون آهن:
 $R_A = 90 - 25 = 65$ مارڪون ۽ $R_B = 63 - 50 = 13$ مارڪون

هتي $x_L + x_S$ ٻنهي شاگردن لاءِ ساڳيو آهي. انهي ڪري هتي نسبي وسعت ڪارائتي نه آهي. مطلق وسعت جي بنياد تي شاگرد A جي ڪارڪردگي شاگرد B جي پيٽ ۾ وڌيڪ گهٽ وڌائي ظاهر ڪري ٿي. انهي ڪري شاگرد B جي ڪارڪردگي A کان وڌيڪ موافق آهي.

مثال 3: وسعت جو استعمال ڪندي، پنج مختلف ڪمپنين جون ٺهيل ساڳئي قسم جي پنج بيشيرن جي قيمت ۽ عمر جي گهٽ وڌائي معلوم ڪريو. نتيجن جو مطلب پڻ ڪيو.

قيمت (هزارن ۾)	8	13	18	23	30
عمر سالن ۾	1.3	1.5	1.8	2.5	3.5

حل: بيشيرن جي قيمت (P) ۽ عمر (L) وارو مواد غير گروهه آهي. اهو مواد قسم ۽ ايڪن ۾ به مختلف آهي ٻنهي ڊيٽاسيٽن لاءِ $x_L + x_S$ به مختلف آهن: انهي ڪري اسين گهٽ وڌائي جي پيٽ ڪرڻ لاءِ نسبي وسعت جو استعمال ڪريون ٿا

$$R_P = \frac{P_L - P_S}{P_L + P_S} = \frac{30 - 8}{30 + 8} = \frac{22}{38} = 0.5789$$

$$R_L = \frac{L_L - L_S}{L_L + L_S} = \frac{3.5 - 1.3}{3.5 + 1.3} = \frac{2.2}{4.8} = 0.4583.$$

بيشيرن جي عمرن ۾ نسبي تبديلي جي پيٽ ۾ پنج مختلف ڪمپنين جي ٺاهيل بيشيرن جي قيمتن ۾ نسبي تبديلي وڌيڪ آهي.


مثال 4: ٻن شهرن ڪراچي ۽ مورو مان بنا ڪنهن قاعدي جي چونڊيل ڪجهه ڪٽنبن جي گروهه مواد جو استعمال ڪندي هڪ ڪٽنب جي موبائيلن جي تعداد جي وسعت جي پيٽ ڪريو. ڇا اهو ڪافي آهي ته وسعت جي بنياد تي تبديلي جي پيٽ ڪجي

موبائيلن جو تعداد	0	1	2	3	4	5	6	7
ڪٽنبن جو تعداد (ڪراچي)	1	7	15	12	5	2	2	1
ڪٽنبن جو تعداد (مورو)	4	13	8	5	2	1	0	1

حل: غير مسلسل جماعتن واري گروهه مواد ۾ جماعتن جي وچ ۾ وڌي $d=1$ آهي. انهي ڪري وسعت آهي: موبائيلن جي تعداد جي وسعت ساڳي آهي يعني ته $R = UCB_P - LCB_L = (7 + 0.5) - (0 - 0.5) = 7.5 + 0.5 = 8$ ڪراچي ۽ مورو ۾ هڪ ڪٽنب جي موبائيلن جي تعداد جي وسعت لاءِ، شهرن ۾ ڪٽنبن جي تعداد (تعداد) تي غور نه ڪيو ويو آهي. ڪراچي ۽ مورو جي هڪ سراسر ڪٽنب جي موبائيلن جي تعداد جي وچ ۾ گهٽ وڌائي بلڪل مختلف آهي پر اهو وسعت سان ظاهر نٿو ٿي سگهي

مثال 5: هيٺين مواد جو استعمال ڪندي هڪ ڏڪان جي بجلي جي استعمال kWh ۾ جي وسعت لھو

بجلي جو استعمال	68-87	88-107	108-127	128-147	148-167	168-187	188-207
ڏينهن جي تعداد	10	13	15	10	4	6	2



حل: مسلسل جماعتن واري گروهی مواد ۾ جماعتن جي وچ ۾ وڌي $d = 1$ آهي تنهنڪري

$$R = UCB_p - LCB_l = \left[207 + \frac{1}{2} \right] - \left[68 - \frac{1}{2} \right] = 207.5 - 67.5 = 140 \text{ kWh.}$$

هتي R ۾ جماعتن جي تعدد جو استعمال نٿو ٿئي انهيءَ ڪري گمراه ڪن ٿي سگهي ٿو.

(b) تغير، سراسري انحراف ۽ معاري انحراف (Variances, Mean deviation and Standard Deviation)

مواد ۾ پڪڙجڻ جو ملهه بهتر طريقي سان لهڻ لاءِ تغير، سراسري انحراف ۽ معياري انحراف جي

تصورن ۾ رڳو پڪڙي مشاهدن جي بدران اسين تعددن سان گڏ سڀ مشاهدا استعمال ڪريون ٿا

سراسري (عام طرح سان A.M) جي چوڌاري مشاهدي x_i جو انحراف هن ريت بيان ڪيو آهي

(1) $D_i = x_i - \bar{x}$ سراسري جي چوڌاري انحراف منفي، مثبت يا بڙي ٿي سگهن ٿا پر انحرافن جو جوڙ لهڻ ڪارائتو نه آهي ڇاڪاڻ ته جوڙ اُپت هميشه بڙي ايندي.

اهو مسئلو حل ڪرڻ لاءِ، اسان کي منفي انحرافن کان لازمي بچڻو پوندو ۽ اهو ٻن طريقن سان ٿيندو اسين چورس ٿيل انحرافن يا قطعي انحرافن جو استعمال ڪري سگهون ٿا.

$$D_i^2 = (x_i - \bar{x})^2 \quad (2)$$

$$|D_i| = |x_i - \bar{x}| \quad (3)$$

چورس ٿيل انحراف هميشه غير منفي هوندا آهن. هڪ حقيقي عدد جو قطعي ملهه به هميشه غير منفي هوندو آهي. مثال طور $|3| = 3, |-22| = 22, |0| = 0, |-1.5| = 1.5$

ان ٻنهي طريقن سان اسين پڪڙجڻ جا وڌيڪ موزون پيمانا بيان ڪريون ٿا.

تغير (s^2 يا Var) A.M جي چوڌاري مشاهدن جي چورس ٿيل انحرافن جي سراسري آهي. سراسري

(يا قطعي) انحراف A.M, (M.D) کان مشاهدن جي قطعي انحرافن جي سراسري آهي. ڇاڪاڻ ته پڪڙجڻ عام طرح

سان مواد جي اصل ايڪن ۾ بامعني هوندو آهي ۽ تغير ۾ چورس ايڪا هوندا آهن انهي ڪري معياري

انحراف لهڻ لاءِ اسين ان جو ٻيو مول معلوم ڪريون ٿا معياري انحراف (S.D يا S) تغير جو مثبت ٻيو مول آهي

غير گروهی مواد لاءِ جنهن جا مشاهدا $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ هجن ۽ انهن جو: A.M. $= \bar{x}$

$$Var = s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n} \quad (4)$$

$$M.D. = \frac{\sum |x - \bar{x}|}{n} \quad (5)$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \quad \text{جڏهن ته} \quad S.D. = s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}} \quad (6)$$


گروهی مواد لاءِ، جنهن ۾ x_i جماعتي نشان ۽ f_i جماعتي تعدد آهن ته پوءِ

$$Var = s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2 f}{\sum f} \quad (7)$$

$$M.D. = \frac{\sum |x - \bar{x}| f}{\sum f} \quad (8)$$

$$\bar{x} = \frac{\sum xf}{\sum f} \quad \text{جڏهن ته} \quad S.D. = s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2 f}{\sum f}} \quad (9)$$

فارمولا (4) - (9) قطعي ملهن لاءِ استعمال ٿين ٿا. مواد جي ڀيٽ لاءِ، مواد جي ايڪن ۾ $\bar{x}$ سان ونڊ ڪندي نسبتي ماپا معلوم ڪبا آهن.



مثال 1: شاگرد A ۽ B جي مارڪن جو تغير، سراسري انحراف ۽ معياري انحراف لھو. ڪھڙو شاگرد تسلسل سان ڪارڪردگي ڏيکاري ٿو.

شاگرد A جون مارڪون	90	30	85	50	25
شاگرد B جون مارڪون	63	50	60	55	52

حل: ٻنهي شاگردن جون مارڪون غير گروهي مواد ڏيکارين ٿيون. سڀ کان اڳ ۾ اسين مارڪن جي سراسري لھون ٿا.

شاگرد A لاءِ (x) ۽ شاگرد B لاءِ (y) اسان وٽ آھي.

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{280}{5} = 56 \quad \text{۽} \quad \bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{280}{5} = 56$$

جيئن ته سراسريون برابر آهن تنهنڪري اسين تغير، سراسري انحراف ۽ معياري انحراف جا قطعي پڪڙجڻ وارا فارمولا استعمال ڪريون ٿا. هيٺين جدولن ۾ اهي حساب ڏيکاريل آهن

$$Var_A = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n} = \frac{3670}{5} = 734.$$

$$(M.D.)_A = \frac{\sum |x - \bar{x}|}{n} = \frac{126}{5} = 25.2.$$

$$(S.D.)_A = \sqrt{734} = 27.0924.$$

x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$	$ x - \bar{x} $
90	34	1156	34
30	-26	676	26
85	29	841	29
50	-6	36	6
25	-31	961	31
جوڙ آيت = 280	0	3670	126

$$Var_B = \frac{\sum (y - \bar{y})^2}{n} = \frac{118}{5} = 23.6.$$

$$(M.D.)_B = \frac{\sum |y - \bar{y}|}{n} = \frac{22}{5} = 4.4.$$


$$(S.D.)_B = \sqrt{23.6} = 4.8578.$$

y	$y - \bar{y}$	$(y - \bar{y})^2$	$ y - \bar{y} $
63	7	49	7
50	-6	36	6
60	4	16	4
55	-1	1	1
52	-4	16	4
جوڙ آيت = 280	0	118	22

سڀني فارمولن سان اسان ڏسون ٿا ته شاگرد A جي مارڪن جي گهٽ وڌائي شاگرد B جي مارڪن جي گهٽ وڌائي کان تمام وڌيڪ آهي تنهنڪري شاگرد B جي ڪارڪردگي وڌيڪ تسلسل واري آهي

مثال 2: مختلف ڪمپنين جون ٺاهيل پنج ساڳي قسم جي بيشيرن جي قيمت ۽ عمر جا معياري انحراف معلوم ڪندي انهن جي گهٽ وڌائي جي پيٽ ڪريو نتيجن جو مطلب پڻ ڪيو.

قيمت (هزارن ۾)	8	13	18	23	30
عمر (سالن ۾)	1.3	1.5	1.8	2.5	3.5



حل: قيمت (P) ۽ عمر (L) جو مواد غير گروهي آهي. اهي مواد قسم ۽ ايڪن ۾ به مختلف آهن. سڀ کان اڳ ۾ اسين سراسريون لھون ٿا.

$$\bar{x}_P = \frac{\sum x_P}{n} = \frac{92}{5} = 18.4 \text{ هزار}$$

$$\bar{x}_L = \frac{\sum x_L}{n} = \frac{10.6}{5} = 2.12 \text{ سال}$$

جيئن ته سراسريون مختلف آهن. تنهنڪري اسين پيٽ لاءِ نسبي معياري انحراف وارو فارمولو استعمال ڪريون ٿا. P ۽ L لاءِ حساب هيٺين جدولن ۾ ڏيکاريل آهن

$$s_P = \sqrt{\frac{\sum (x_P - \bar{x}_P)^2}{n}} = \sqrt{\frac{293.2}{5}} = 7.658 \text{ هزار}$$

$$s_P = \frac{s_P}{\bar{x}_P} = \frac{7.658}{18.4} = 0.416.$$

قيمت (P)	$x_P - \bar{x}_P$	$(x_P - \bar{x}_P)^2$
8	-10.4	108.16
13	-5.4	29.16
18	-0.4	0.16
23	4.6	21.16
30	11.6	134.56
جوڙ ٻهٽ = 92	0	293.2

$$s_L = \sqrt{\frac{\sum (x_L - \bar{x}_L)^2}{n}} = \sqrt{\frac{25.68}{5}} = 2.266 \text{ سال}$$

$$s_L = \frac{s_L}{\bar{x}_L} = \frac{2.266}{2.12} = 1.069.$$

عمر (L)	$x_L - \bar{x}_L$	$(x_L - \bar{x}_L)^2$
1.3	-0.82	1.69
1.5	-0.62	2.25
1.8	-0.32	3.24
2.5	0.38	6.25
3.5	1.38	12.25
جوڙ ٻهٽ = 10.6	0	25.68


بيترين جي عمر وارو نسبي انحراف قيمت واري. کان وڌيڪ آهي ان جو مطلب آهي ته قيمتن وارو مواد، عمرن واري مواد جي پيٽ ۾ وڌيڪ تسلسل وارو آهي. اسين ڏسون ٿا ته جيڪڏهن نسبي فارمولا استعمال نه ڪجن ته نتيجا مختلف ۽ غلط ٿي سگهن ٿا.

مثال ٽڙي مشروب واري مواد جو تغير، سراسري انحراف ۽ معياري انحراف لھو

ٽڙي مشروب جي مقدار (لٽرن ۾)	1.48	1.49	1.50	1.51	1.52
ٻوٽلن جو تعداد	2	7	5	5	1

حل: غير مسلسل جماعتن وارو غير گروهي مواد آهي. هيٺين جدول ۾ حساب ڏيکاريل آهن.

مقدار (x)	ٻوٽلن جو تعداد (f)	xf	$(x - \bar{x})$	$(x - \bar{x})^2$	$ x - \bar{x} $	$(x - \bar{x})^2 f$	$ x - \bar{x} f$
1.48	2	2.96	-0.018	0.0003240	0.018	0.000648	0.036
1.49	7	10.43	-0.008	0.0000640	0.008	0.000448	0.056
1.5	5	7.5	0.002	0.0000040	0.002	0.00002	0.01
1.51	5	7.55	0.012	0.0001440	0.012	0.00072	0.06
1.52	1	1.52	0.022	0.0004840	0.022	0.000484	0.022
ڪل	20	29.96	--	--	--	0.00232	0.184



$$Var = s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2 f}{\sum f} = \frac{0.00232}{20} = 0.000116 \text{ (لتر)}^2 \quad \bar{x} = \frac{\sum xf}{\sum f} = \frac{29.96}{20} = 1.498 \text{ لتر}$$

$$S.D. = s = \sqrt{0.000116} = 0.01078 \text{ لتر} \quad M.D. = \frac{\sum |x - \bar{x}| f}{\sum f} = \frac{0.184}{20} = 0.0092 \text{ لتر}$$

ٿڌي مشروب جي مقدارن ۾ گهٽ وڌائي تمام گهٽ يا نظر انداز ڪرڻ جهڙي آهي
مثال 4: بجلي جي استعمال واري مواد جو سراسري انحراف ۽ معياري انحراف لھو

(kWh) بجلي جو استعمال	68-87	88-107	108-127	128-147	148-167	168-187	188-207
ڏينھن جو تعداد	10	13	15	10	4	6	2

حل: هيٺين جدول ۾ حسابن جو خلاصو ڏنل آهي جڏهن ته x جماعتي نشان کي ظاهر ڪري ٿو

جماعتي نشان (x)	f	xf	$(x - \bar{x})$	$(x - \bar{x})^2$	$ x - \bar{x} $	$(x - \bar{x})^2 f$	$ x - \bar{x} f$
68-87	10	775	-44.167	1950.724	44.167	19507.24	441.67
88-107	13	1267.5	-24.167	584.0439	24.167	7592.571	314.171
108-127	15	1762.5	-4.167	17.36389	4.167	260.4583	62.505
128-147	10	1375	15.833	250.6839	15.833	2506.839	158.33
148-167	4	630	35.833	1284.004	35.833	5136.016	143.332
168-187	6	1065	55.833	3117.324	55.833	18703.94	334.998
188-207	2	395	75.833	5750.644	75.833	11501.29	151.666
ڪل	60	7270	--	--	--	65208.35	1606.672

پھريان اسان کي سراسري ڪپي جيڪا آهي

$$\bar{x} = \frac{\sum xf}{\sum f} = \frac{7270}{60} = 121.667 \text{ kWh.}$$

هاڻي جوڙ اڀتن جو استعمال ڪندي سراسري انحراف ۽ معياري انحراف آهن

$$M.D. = \frac{\sum |x - \bar{x}| f}{\sum f} = \frac{1606.672}{60} = 26.778 \text{ kWh.}$$

$$S.D. = s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2 f}{\sum f}} = \sqrt{\frac{65208.35}{60}} = 32.967 \text{ kWh.}$$

مثال 5: ڪراچي ۽ مورو مان ڪجهه بنا قاعدي چونڊيل خاندانن کان انهن جي موبائيلن جو تعداد پڇيو ته ان جا نتيجا هن ريت آهن مواد جون سراسريون 6.133 ۽ 5.177 موبائيل في خاندان ۽ انهن جا ترتيبوار معياري انحراف 3.408 ۽ 1.412 پيٽ ڪري ڏيکاريو ته ڪهڙي شهر ۾ موبائيل في خاندان جي استعمال ۾ تسلسل آهي.

حل: ڪراچي K مورو جون موبائيل في خاندان واريون سراسريون مختلف آهن. جيڪي هي آهن موبائيل في خاندان $x_K = 5.773$ ۽ موبائيل في خاندان $\bar{x}_M = 6.133$ معياري انحراف هيٺين ريت آهن موبائيل في خاندان $s_K = 1.412$ ۽ موبائيل في خاندان $s_M = 3.408$ جيئن ته ٻنهي شهرن لاءِ سراسريون مختلف آهن تنهنڪري اسين نسبي ماپا استعمال ڪريون ٿا

$$s_M = \frac{s_M}{\bar{x}_M} = \frac{3.408}{6.133} = 0.555 \quad \text{۽} \quad s_K = \frac{s_K}{\bar{x}_K} = \frac{1.412}{5.773} = 0.246$$

ٻنهي شهرن جا نسبي معياري انحراف ڏسندي. اسين اهو نتيجو ڪيون ٿا ته ڪراچي جي هڪ خاندان جي موبائيلن جي تعداد جي نسبي گهٽ وڌائي مورو جي هڪ خاندان کان گهٽ آهي انهي ڪري ڪراچي ۾ موبائيل جي استعمال جي سراسري في خاندان مورو کان وڌيڪ ۽ استعمال وڌيڪ تسلسل وارو آهي.



مشق 22.5

1. هڪ ڪلاس ۾ غير حاضر شاگردن جي تعداد جي وسعت، تغير، سراسري انحراف ۽ معياري انحراف لھو. اھي ٻار گذريل ست ڏينھن کان ھن ريت غير حاضر ھئا. 3, 5, 3, 2, 4, 1, 8.
2. 6 وارين ۾ ٻن رانديگرن جي اسڪورن جي وسعت، سراسري انحراف، تغير ۽ معياري انحراف لھو ڪھڙو رانديگرو ڏيک ٿيڪ تسلسل وارو آھي.

A-رانديگر	12	15	0	185	7	19
B-رانديگر	47	12	76	48	4	51

3. ڇھ ڪٽنبن جي آمدني ۽ خرچ جي وسعت ۽ معياري انحراف استعمال ڪندي انھن جي پڪڙجڻ جي پيٽ ڪريو. نتيجن جو مطلب پڻ ڪيو

آمدني (ھزارن ۾)	10	20	30	40	50	60
خرچ (ھزارن ۾)	7	21	23	34	36	53

4. هڪ فٽبال جي مند ۾ ٽيمن A ۽ B جا اسڪور ڪيل گول هيٺ ڏنل آهن. نسبتي معياري انحراف ۽ سراسري انحراف کي استعمال ڪريو ته جيئن خبر پوي ته ڪهڙي ٽيم وڌيڪ تسلسل سان ڪارڪردگي ڏيکاري.

اسڪور ڪيل گول	0	1	2	3	4
ٽيم A جي ڪيڏيل راندين جو تعداد	27	9	8	5	4
ٽيم B جي ڪيڏيل راندين جو تعداد	17	9	6	5	3

5. ڏاتو جي 50 ٽڪرن جي مايي جي ورهاست واري جدول هيٺ ڏنل آهي. وسعت، تغير، معياري انحراف انحراف لھو.

ٽڪرن جو مايو (ڪلوگرامن ۾)	7.1-7.3	7.4-7.6	7.7-7.9	8.0-8.2	8.3-8.5	8.6-8.8	8.9-9.1
ٽڪرن جو تعداد	3	5	9	14	11	6	2

جائزي واري مشق 22

1 صحيح جواب تي نشان لڳايو

- (i). حسابي سراسري مواد جي _____ مشاهدن تي منحصر ڪندو آهي.
(a) وچين (b) پڇاڙي وارن. (c) سڀني (d) ڪوبه نه
- (ii). لھڻ لاءِ پھريان غير گروھي مواد کي ترتيب ۾ آڻڻو پوندو آھي.
(a) AM (b) ڪثرتي سراسري (c) مڌيان (d) وسعت
- (iii). مسلسل تعددي جدول ۾ جماعتن جو تعداد 5 ۽ _____ جي وچ ۾ ھوندي آھي.
(a). 10 (b). 15 (c). 20 (d). 25
- (iv). _____ جو استعمال ڪندي، گراف وسيلي، گروھي مواد جي ڪثرتي سراسري لھبي آھي.
(a) بار چارٽ (b) ڪالمي نقشو. (c) Ogive (d) گھڻ پاسو
- (v). جيڪڏھن مواد ۾ ٻين کان مختلف مشاھدا ھجن ته _____ ”گمراھ ڪن ھوندو آھي.“
(a) AM (b). وسعت (c) مڌيان (d). ڪثرتي سراسري
- (vi). جيڪڏھن جو {0, 90, k, 10, 100} جو A.M. 40 آھي ته پوءِ $k =$ _____
(a). 0 (b). 90 (c). 10 (d). 100
- (vii). مڌيان ۽ چوٽائي ڪندڙ مشاھدا فطري طور _____ آھن.
(a). حسابي (b). مقامي (c). منطقي (d) ڪوبه نه
- (viii). مٿيون چوٽائي ڪندڙ مشاھدو مواد کي _____ نسبت ۾ ورھائي ٿو.
(a). 50%-50% (b). 25%-25% (c). 75%-25% (d). 40%-60%
- (ix). جيڪڏھن مواد ۾ ھڪ عدد ٻڙي جي برابر آھي ته پوءِ _____ معلوم نه ڪري سگھبو.
(a). A.M. (b). G.M. (c). H.M. (d). مڌيان
- (x). جيڪڏھن مواد ۾ سڀ عدد برابر آھن ته پوءِ _____ آھي سڀئي.
(a). A.M.=G.M.=H.M. (b). وسعت = 0 (c). S.D. = 0 (d).



خلاصو


- مقداري مواد مان مراد عدد آهن ۽ ان جا ٻه قسم آهن هڪ غير مسلسل (رڳو سڄا عدد) ۽ ٻيو مسلسل مواد (حقيقي عدد)
- خاصيتي مواد مان مراد بدلجندڙ جون خاصيتون آهي ۽ ان جا ٻه قسم آهن هڪ ناليوارو (بغير ترتيب جي) ۽ ٻيو قطاري (ترتيب وارو).
- فائديمند معلومات معلوم ڪرڻ لاءِ، مواد جي تعدادي ورهاست ۾ گروهه بندي ڪئي ويندي آهي.
- تعدادي ورهاست ۾ جماعتون ۽ ترتيبوار تعددون هونديون آهن.
- هڪ ٽپڪي سان بيان ڪيل جماعتون غير مسلسل آهن. جڏهن ته عددن جي هڪ حد سان بيان ڪيل جماعتون، مسلسل جماعتون آهن
- تبليي نشان يا رقم لکڻ وارن طريقن سان مشاهدن کي جماعتن ۾ ورهايو ويندو آهي.
- اسٽرچ (1926) جو اصول استعمال ڪندي، جماعتن جو تعداد لهي سگهجي ٿو.
- مواد جي سڀ کان وڏي مشاهدي ۽ سڀ کان ننڍي مشاهدي جي فرق کي وسعت چئبو آهي
- هڪ جماعت ۾ جيترا مشاهدا اچي سگهن ٿا ان تعداد کي جماعتي وقفو يا ويڪر چئبو آهي
- هڪ جماعت جي شروعاتي ۽ آخري ٽپڪن کي جماعتي حدون چئبو آهي.
- ڪن به ٻن لڳاتار جماعتي حدن جي سراسري ڪيڏ سان حقيقي جماعتي حدون حاصل ڪيون آهن.
- ڪن به ٻن ۾ وارين جماعتن جي وچ واري فاصلي کي جماعتن جي وچ واري وڌي چئبو آهي.
- نسبتي ۽ في سيڪڙو تعددون ترتيبوار 0 کان 1 ۽ 0 کان 100 تائين هونديون آهن.
- هڪ مخصوص جماعت تائين، سڀني تعددن جي جوڙو اُپٽ کي مجموعي تعداد چئبو آهي.
- ڪالمي نقشو ۾ وارن مستطيلن جو گراف آهي. انهن مستطيلن جا پايا حقيقي جماعتي حدن تي هوندا آهن ۽ انهن جون اوچائيون جماعتي تعددن سان متناسب هونديون آهن.
- تعدادي گهٽ پاسو انهن ٽپڪن کي ليڪ ٽڪرن سان ملائڻ سان ٺهندو آهي جن جا x محدود جماعتي نشان هوندا آهن ۽ y محدود تعددون هونديون آهن
- ogive يا مجموعي تعدادي گهٽ پاسو انهن ٽپڪن کي ملائڻ سان ٺهندو آهي. جن جا محدود آهن (مجموعي تعددون، حقيقي جماعتي حدون)
- مرڪزي رجحان جو پيمانو مواد جي اها صلاحيت آهي جنهن سان مواد هڪ ٽپڪي جي چوڌاري ميٽر ڪندو آهي
- $G.M.A.M$ ۽ $H.M$ سڀني مشاهدن جي برابري تي بيٺل هوندا آهن.
- مڌيان ترتيب ڏنل ڊيٽا سيٽ جو سڀ کان وڌيڪ حصو آهي.
- مڌيان جو بنياد اڪثريت وارو اصول آهي ۽ اهو سڀ کان وڌيڪ ايندر مشاهدو آهي.
- $A.M. \geq G.M. \geq H.M.$ جيڪڏهن مڌيان $AM =$ ته پوءِ مواد همشڪلي ٿيندو ٻي صورت ۾ مواد غير همشڪلي ٿيندو.
- ڪالمي نقشو استعمال ڪندي، گراف وسيلي ڪثرتي سراسري جو هنڌ ڳولي سگهجي ٿو ۽ ان جو اندازو پڻ لڳائي سگهجي ٿو
- O give جو استعمال ڪندي، گراف وسيلي مڌيان ۽ چوٽائي ڪندڙ مشاهدن جا هنڌ ڳولي سگهجن ٿا ۽ انهن جو اندازو پڻ لڳائي سگهجي ٿو.
- پڪڙجڻ جي پيماني مان مراد مواد ۾ پڪيڙ يا تبديلي جي مقدار هوندي آهي.
- جيڪڏهن مواد ۾ پڪڙجڻ وڌيڪ آهي ته پوءِ مواد ۾ استحڪام يا تسلسل گهٽ هوندو.
- ٻن پڇاڙي وارن مشاهدن جي فرق وسيلي وسعت مواد ۾ پڪڙجڻ جي ماپ ڪندي آهي.
- غير گروهه مواد ۾ سراسري جي چوڌاري سڀني انحرافن جي جوڙو اُپٽ پڙي ٿيندو.
- AM جي چوڌاري مواد جي چورس ٿيل انحرافن جي AM کي تغير چئبو آهي. $A.M$ جي چوڌاري مواد جي قطعي انحرافن جي AM کي سراسري يا قطعي انحراف چئبو آهي.



شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هن يونٽ جي پڙهڻ کانپوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته

- هيٺين سڌيانن کي انهن جي شامل نتيجن سان گڏ سمجهڻ ۽ گڏيل مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ انهن جو استعمال ڪن
- ❖ گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ هٿپاتيٺيوز جي ڊيگهه جو چورس ٻين پاسن جي ڊيگهه جي چورس جي جوڙ اُپت جي برابر ٿيندو. (فيثا غورث سڌيان)
- ❖ جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي جي هڪ پاسي جو چورس ٻن ٻين پاسن جي چورس جي جوڙ اُپت جي برابر هجي ته اهڙو ٽڪنڊو گوني ڪنڊ ٽڪنڊو ٿيندو. (فيثا غورث سڌيان جو عڪس)




تعارف:

فيثا غورث (Pythagoras) هڪ يوناني فلسفي ۽ رياضي دان اٽڪل 570 قبل مسيح ۾ پيدا ٿيو. هن گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي پاسن جي وچ ۾ هڪ ڏاڍو اهم تعلق دريافت ڪيو. فيثا غورثي سڌيان يا فيثا غورث سڌيان اقليدسي جاميٽري جو هڪ بنيادي تعلق آهي جيڪو گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي ٽن پاسن جي وچ ۾ آهي. هن ان تعلق کي سڌيان جي شڪل ڏني ۽ اهو سڌيان هن جي نالي تي فيثا غورث سڌيان ڪوٺيو آهي. اهو سڌيان مختلف طريقن سان ثابت ٿي سگهي ٿو. هتي اسين ان کي هم شڪل ٽڪنڊن جي تصور کي استعمال ڪندي ثابت ڪنداسين. اسين ان سڌيان جي عڪس کي به بيان ۽ ثابت ڪنداسين ۽ ان کانپوءِ انهن کي عام زندگي جي مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ استعمال ڪنداسين.

23.1.1 فيثا غورث سڌيان (Pythagoras Theorem):

سڌيان 23.1



گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ هيٺا ٽينيزوز جي ڊيگهه جو چورس ٻين پاسن جي ڊيگهه جي چورس جي جوڙ آيت جي برابر ٿيندو.

ملي: $\triangle ABC$ هڪ گوني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي جنهن ۾ گوني ڪنڊ ٽڪي C تي آهي. پاسن $\overline{AC}$, $\overline{AB}$ ۽ $\overline{BC}$ جي ڊيگهه ترتيبوار c , b ۽ a آهي.


گهريل: $c^2 = a^2 + b^2$

جوڙجڪ: چوٽي C کان پاسي $\overline{AB}$ تي هڪ عمود ڪيو. فرض ڪريو ته $m\overline{BD} = x$

ثابتي:

دليل	بيان
$\angle CDB$ گوني ڪنڊ آهي (جوڙجڪ) مشترڪ ڪنڊون $\angle B$ جا پوراڻو ڪندڙ (ڪامپليمينٽ) هم شڪل ٽڪنڊن جي وصف مطابق هم شڪل ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا	$\triangle ABC \leftrightarrow \triangle CBD$ $\angle ACB \cong \angle CDB$ $\angle B \cong \angle B$ $\angle BAC \cong \angle BCD$ ۽ $\therefore \triangle ACB \sim \triangle CBD$ اهڙي طرح $\frac{c}{a} = \frac{a}{x}$ $cx = a^2 \dots (i)$
$\angle ADC$ گوني ڪنڊ آهي (جوڙجڪ) مشترڪ ڪنڊون $\angle A$ جا پوراڻو ڪندڙ هم شڪل ٽڪنڊن جي وصف مطابق هم شڪل ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا	$\triangle ACB \leftrightarrow \triangle ADC$ $\angle ACB \cong \angle ADC$ $\angle A \cong \angle A$ $\angle CBA \cong \angle DCA$ ۽ $\therefore \triangle ACB \sim \triangle ADC$ اهڙي طرح $\frac{c}{b} = \frac{b}{c-x}$ $\Rightarrow c(c-x) = b^2$ يا $c^2 - cx = b^2 \dots (ii)$
مساوات (i) ۽ (ii) کي جوڙ ڪرڻ سان	$cx + c^2 - cx = a^2 + b^2$ $c^2 = a^2 + b^2$

Q.E.D



شامل نتيجو: گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ABC ۾، جنهن جي گوني ڪنڊ B تي آهي.

$$(m\overline{BC})^2 = (m\overline{AC})^2 - (m\overline{AB})^2 \quad \text{i.}$$

$$(m\overline{AB})^2 = (m\overline{AC})^2 - (m\overline{BC})^2 \quad \text{ii.}$$

سڌيان 23.2

(فيثا غورث سڌيان جو عڪس)

جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي جي هڪ پاسي جو چورس ٻن ٻين پاسن جي چورس جي جوڙ آيت جي برابر هجي ته اهڙو ٽڪنڊو گوني ڪنڊ ٽڪنڊو ٿيندو.

ملي:

$$\Delta ABC \text{ ۾، } m\overline{BC} = a, m\overline{AC} = b, m\overline{AB} = c$$

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ اهڙي طرح جو}$$

گهريل: ΔABC هڪ گوني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي.


جوڙجڪ: $\overline{BC}$ تي هڪ عمود $\overline{CD}$ ٺاهيو اهڙي طرح جو $\overline{CD} \cong \overline{CA}$

ٽپڪن B ۽ D کي ملايو.

ثابتي:

دليل	بيان
جوڙجڪ	ΔDCB هڪ گوني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي
فيثا غورث سڌيان	$\therefore (m\overline{BD})^2 = a^2 + (m\overline{DC})^2$
	$\Rightarrow (m\overline{BD})^2 = a^2 + b^2$
ملي	$a^2 + b^2 = c^2$ پر
يڪسانيت جي متعدي خاصيت	$\therefore (m\overline{BD})^2 = c^2$
ٻنهي پاسن جو ٻيو مول ڪڍڻ سان	$\therefore m\overline{BD} = c$
	هاڻي
جوڙجڪ	$\Delta DCB \leftrightarrow \Delta ACB$
مشترڪ پاسو	$\overline{CD} \cong \overline{CA}$
هر هڪ پاسو c جي برابر آهي. (مٿي ثابت ٿيل آهي)	$\overline{BC} \cong \overline{BC}$
پ. پ. پ. $\cong$ پ. پ. پ.	$\overline{BD} \cong \overline{AB}$
يڪسان ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا	$\therefore \Delta DCB \cong \Delta ACB$
جوڙجڪ	$m\angle DCB = m\angle ACB$
يڪسانيت جي متعدي خاصيت	$m\angle DCB = 90^\circ$ پر
$\therefore m\angle ACB = 90^\circ$	$\therefore m\angle ACB = 90^\circ$
	اهڙي طرح، ABC هڪ گوني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي

Q.E.D



شامل نتيجو:

فرض ڪريو ته a ، b ۽ c ڪنهن ٽڪنڊي جا پاسا آهن اهڙي طرح جو پاسو c سڀ کان ڊگهو آهي. ته پوءِ

- جيڪڏهن $a^2 + b^2 = c^2$ ته پوءِ ٽڪنڊو، گوني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي.
- جيڪڏهن $a^2 + b^2 > c^2$ ته پوءِ ٽڪنڊو، سوڙهي ڪنڊ ٽڪنڊو آهي
- جيڪڏهن $a^2 + b^2 < c^2$ ته پوءِ ٽڪنڊو، ويڪري ڪنڊ ٽڪنڊو آهي

مثال 1:

هڪ ٽڪنڊي جي پاسن جون ماپون مليل آهن. انهن مان ڪهڙا گوني ڪنڊ ٽڪنڊن کي ظاهر ڪن ٿا.

- $c = 13\text{cm}$ ۽ $b = 12\text{cm}$ ، $a = 5\text{cm}$
- $c = 8\text{cm}$ ۽ $b = 7\text{cm}$ ، $a = 6\text{cm}$
- $c = 15\text{cm}$ ۽ $b = 12\text{cm}$ ، $a = 9\text{cm}$

حل:

$$\begin{aligned} \text{i. جيئن ته } (13)^2 &= (5)^2 + (12)^2 \\ 169 &= 25 + 144 \\ 169 &= 169 \end{aligned}$$

فيثا غورث سڌيان جي عڪس مطابق، a ، b ۽ c گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جا پاسا آهن.

$$\begin{aligned} \text{ii. جيئن ته } (8)^2 &\neq (6)^2 + (7)^2 \\ 64 &\neq 36 + 49 \\ 64 &\neq 85 \end{aligned}$$

فيثا غورث سڌيان جي عڪس مطابق، a ، b ۽ c گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جا پاسا نه آهن.

$$\begin{aligned} \text{iii. جيئن ته } (15)^2 &= (12)^2 + (9)^2 \\ 225 &= 144 + 81 \\ 225 &= 225 \end{aligned}$$

فيثا غورث سڌيان جي عڪس مطابق، a ، b ۽ c گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جا پاسا آهن.

مثال 2:


هڪ ٽاور لاءِ لنگر واري رسي لڳائڻ جي ضرورت آهي. ٽاور جي اوچائي 96 فٽ آهي. لنگر واري رسي 105 فٽ ڊگهي آهي معلوم ڪريو ته اها ٽاور کان ڪيترو پري لڳائي پوندي.


حل:

فرض ڪريو ته لنگر واري رسي ٽاور کان x فٽ جي فاصلي تي لڳائي وئي آهي. فيثا غورث سڌيان جي مطابق


$$\begin{aligned} (105)^2 &= (96)^2 + (x)^2 \\ \Rightarrow 11025 &= 9216 + x^2 \\ \Rightarrow x^2 &= 1809 \\ \Rightarrow x &= \sqrt{1809} = 42.53 \text{ فٽ} \end{aligned}$$

اهڙي طرح گهربل فاصلو لڳ ڀڳ 42.53 فٽ آهي.





آمنه جو گهر



مثال 3:

آمنه جي گهر کان احمد جي گهر وڃڻ لاءِ ٻه رستا آهن. هڪ رستو وات C وارو آهي ۽ ٻئي رستي لاءِ 2 km واري وات A کان ٿيندي 1.5 km واري وات B ڪٽبي. معلوم ڪريو ته سڌي وات C وارو رستو ڪيترو ننڍو آهي. A ۽ B جي وچ واري ڪنڊ 90° آهي جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي.

حل: فرض ڪريو ته وات C جي ڊيگهه x آهي

فيثا غورث سڌيان جي مطابق

$$x^2 = (2)^2 + (1.5)^2$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{(2)^2 + (1.5)^2} = \sqrt{6.25} = 2.5 \text{ km}$$

ٻيو رستو استعمال ڪندي، هن کي هي فاصلو طي ڪرڻو پوندو: $3.5 \text{ km} = 2 + 1.5$

انهن ٻنهي رستن جي وچ ۾ فرق $1 \text{ km} = 3.5 - 2.5$

مشق 23

1. ٽڪنڊي جي پاسن جون ماپون هيٺ ڏنل آهن تصديق ڪريو ته ٽڪنڊو گوني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي.





i. $a = 6, b = 8, c = 10$

ii. $a = 16, b = 30, c = 34$

iii. $a = 13, b = \sqrt{56}, c = 15$

iv. $a = 15, b = 20, c = 25$



2. هيٺين شڪلين ۾ نامعلوم رقمون لھو.




3. هڪ ٽڪنڊي جي ٽن پاسن جون ماپون 9.5 cm ، 7.5 cm ۽ $x \text{ cm}$ آهن. x جي ڪهڙي قيمت تي اهي پاسا گوني ڪنڊ ٽڪنڊي کي ظاهر ڪندا.

4. ABC هڪ ٻيڙ پاسو ٽڪنڊو آهي جنهن ۾ $m\overline{AB} = m\overline{AC} = 12 \text{ cm}$ ۽ $m\overline{BC} = 10 \text{ cm}$. A کان $\overline{BC}$ تائين عمودي فاصلو لھو.

5. هڪ ڏاڪڻ جو هيٺيون حصو (پايو) پٽ کان 6 فٽن جي فاصلي تي آهي جيڪڏهن ڏاڪڻ جو مٿاهون حصو (چوٽي) پٽ تي 8 فٽن جي اوچائي تي رکيل آهي ته پوءِ ڏاڪڻ جي ڊيگهه لھو.



6. پاسي واري شڪل ۾ x جو ملهه لھو.



7. $\triangle ABC$ ۾ $\angle ADB$ هڪ گوني ڪنڊ آهي جيئن پر واري شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. h, a, b ۽ $m\overline{CD} = 5$ جي ڊيگهه لھو جيڪڏهن ايڪا $m\overline{AD} = 7$.

8. هڪ مستطيلي تيراڪي لاءِ تلاءُ جا پاسا 50m ۽ 30m ڊگھا آهن ٻن سامھون وارن ڪنڊن چوٿين جي وچ واري ڊيگهه ڇا آهي.

9. ٽپور پاسي، ٽڪنڊي جي هر هڪ پاسي جي ڊيگهه 8 ايڪا آهي. ڪنهن به هڪ عمود جي ڊيگهه لھو.

10. هڪ ٽڪنڊي جي پاسن جي ڊيگهه $x+4$ ۽ x آهي جيڪڏهن سڀ کان ڊگھي پاسي جي ڊيگهه 20 آهي x جون ڪهڙيون قيمتون گوني ڪنڊ ٽڪنڊو ٺاهينديون.

11. هڪ منتظم 18m سڌو اوڀر ڏانهن وڃي ٿو ۽ ان کانپوءِ 24m سڌو اتر ڏانهن وڃي ٿو. شروعاتي ٽپڪي کان هن جي هاڻوڪي هنڌ تائين فاصلو لھو.

12. هڪ مستطيل ABCD ۾ $m\overline{BC} + m\overline{CD} = 17\text{cm}$ ۽ $m\overline{BD} + m\overline{AC} = 26\text{cm}$. مستطيل جي ڊيگهه ۽ ويڪر معلوم ڪريو.

جائزي واري مشق 23

1. درست جواب ڳوليو.

i. مستطيل جي اُڀر جي ماپ 6.5cm آهي جيڪڏهن ان جي ويڪر 2.5cm آهي ته پوءِ ان جي ڊيگهه _____ آهي.


- (a) 9cm (b) 4cm
(c) 6cm (d) 3cm

ii. هيٺين مان ڪهڙا گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جا پاسا آهن

- (a) 3, 4, 5 (b) 2, 3, 4
(c) 5, 6, 7 (d) 4, 5, 6




iii. هڪ گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي وڏي ۾ وڏي ڪنڊ _____ آهي:

- (a) 100° (b) 90°
(c) 80° (d) 110°



- iv. گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾، هٿپاتيٺيوز _____ جي سامهون وارو پاسو آهي.
- (a) سوڙهي ڪنڊ (b) گوني ڪنڊ
(c) ويڪري ڪنڊ (d) ڪوبه نه
- v. جيڪڏهن ڪنهن گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جا پاسا a, b, c آهن ۽ سڀ کان وڏو پاسو c آهي ته پوءِ
- (a) $c^2 = a^2 + b^2$ (b) $b^2 = c^2 + a^2$
(c) $a^2 = b^2 + c^2$ (d) $c^2 = a^2 - b^2$
- vi. جيڪڏهن گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي ٻن پاسن جون ڊيگهون 5cm ۽ 12cm آهن ته پوءِ هٿپاتيٺيوز _____ آهي:
- (a) 16 (b) 15
(c) 14 (d) 13
- vii. جيڪڏهن ٻيڙ پاسي گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جو هٿپاتيٺيوز $3\sqrt{2}$ cm آهي ته پوءِ هر هڪ پاسي جي ڊيگهه _____ آهي.
- (a) 2cm (b) 5cm
(c) 3cm (d) 1cm

2. فيثاغورث سڌيان جي وضاحت ڪريو.
3. هڪ ڊگهي ڏاڪڻ، آبي پٽ تي رکيل آهي. ڏاڪڻ جو پايو. پٽ کان 7m جي فاصلي تي آهي. معلوم ڪريو ته ڏاڪڻ پٽ تي ڪيتري اوچائي تي رکيل آهي.
4. هيٺين مان هر هڪ شڪل ۾ نامعلوم رقمن کي معلوم ڪريو.



خلاصو


- گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾، هٿپاتيٺيوز جي ڊيگهه جو چورس ٻين پاسن جي ڊيگهه جي چورس جي جوڙ آيت جي برابر آهي.
- جيڪڏهن ٽڪنڊي جي هڪ پاسي جو چورس ٻين پاسن جي چورس جي جوڙ آيت جي برابر آهي ته پوءِ ٽڪنڊو گوني ڪنڊ ٽڪنڊو ٿيندو.



شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هن يونٽ جي پڙهڻ کانپوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته

- هيٺيان سڌيان انهن جي شامل نتيجن سان گڏ سمجهڻ ۽ گڏيل مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ انهن جو استعمال ڪن.
- ❖ ٽڪنڊي جي هڪ پاسي جي پوروچوٽ، ليڪ جيڪا ٻين ٻن پاسن کي ڪپي ٿي، اها ٻنهي پاسن کي تناسب ۾ ورهائي ٿي.
- ❖ جيڪڏهن ڪا ليڪ ڪنهن ٽڪنڊي جي ٻن پاسن کي متناسب ٽڪرن ۾ ورهائي ٿي ته پوءِ اها ٽڪنڊي جي ٽين پاسي جي پوروچوٽ ٿيندي.
- ❖ ٽڪنڊي جي ڪنهن ڪنڊ جو اندريون اڌ ڪندڙ سامهون واري پاسي کي، ڪنڊ جي پاسن جي ڊيگهه جي نسبت ۾ ورهائي ٿو.
- ❖ جيڪڏهن ٻه ٽڪنڊا هم شڪل آهن، ته مطابقت رکندڙ پاسن جون ڊيگهون متناسب هونديون.



24.1 نسبت ۽ تناسب (Ratio and proportion):

هن باب ۾، اسين ٽڪنڊن جي هم شڪلي سان گڏوگڏ ٽڪنڊي جي پاسن جي نسبت ۽ تناسب سان واسطو رکندڙ سڌيان پڙهنداسين انهي ڪري سڀ کان اڳ ۾ اسان کي نسبت، تناسب ۽ هم شڪلي جي تصورن جو دؤر ڪرڻو آهي.

نسبت (Ratio):

ساڳي قسم ۽ ساڳي ايڪن وارين، مقدارن جي ڀيٽ کي نسبت چئبو آهي a ۽ b جي نسبت کي $a:b$ يا $\frac{a}{b}$ سان ظاهر ڪبو آهي جڏهن ته a کي مُنڍي (Antecedent) ۽ b کي پُڇڙ (Consequent) چئبو آهي.

مثال طور:

25 لٽر ۽ 5 لٽر جي نسبت 25:5 يا 5:1 آهي.

تناسب (Proportion):

ٻن نسبتن جي برابري کي تناسب چئبو آهي جيڪڏهن ٻه نسبتون $a:b$ ۽ $c:d$ برابر آهن. ته پوءِ اسين هن ريت لکنداسين: $a:b = c:d$ يا $a:b::c:d$ ۽ ان کي تناسب چوندا آهيون تناسب $a:b = c:d$ ۾ a ۽ d کي ٻاهريان رڪن (Extremes) جڏهن ته b ۽ c کي اندريان رڪن (Means) چئبو آهي.


تناسب ۾، وچين رڪنن جي ضرب اُٻت ٻاهرين رڪنن جي ضرب اُٻت جي برابر هوندي آهي.

هم شڪل ٽڪنڊا (Similar Triangles):

ٻه ٽڪنڊا ABC ۽ PQR هم شڪل ٽڪنڊا ڪوٺبا جيڪڏهن انهن جون مطابقت رکندڙ ڪنڊون يڪسان هجن.


نشانين ۾ اسين هن ريت لکنداسين $\Delta ABC \sim \Delta PQR$

ڏنل شڪل ۾ $\Delta ABC \sim \Delta XYZ$



هم شڪل ٽڪنڊن لاءِ هيٺيون سڌيان ڏاڍو اهم آهي.

”جيڪڏهن ٻه ٽڪنڊا هم شڪل آهن ته پوءِ انهن جا مطابقت رکندڙ پاسا متناسب هوندا“ اسين اهو سڌيان آخر ۾ ثابت ڪنداسين




سڌيان 24.1

ٽڪنڊي جي هڪ پاسي جي پوروچوٽ، ليڪ جيڪا ٻين ٻن پاسن کي ڪپي ٿي، اها ٻنهي پاسن کي تناسب ۾ ورهائي ٿي.

ملي: $\triangle ABC$ ۾ $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ۽ $\overline{DE}$ ٻين پاسن $\overline{AB}$ ۽ $\overline{AC}$ کي ترتيبوار ٽڪن D ۽ E تي ڪپي ٿي.

گهربل: $\frac{m\overline{AD}}{m\overline{DB}} = \frac{m\overline{AE}}{m\overline{EC}}$



جوڙجڪ: ڊيگه جو ايڪو اهڙي طرح ڪنيو وڃي جو $p = m\overline{AD}$ ايڪا ۽ $q = m\overline{DB}$ ايڪا جڏهن ته p ۽ q قدرتي عدد آهن. $\overline{AD}$ کي p يڪسان ليڪ ٽڪرن ۾ ورهائيو ۽ $\overline{BD}$ کي q يڪسان ليڪ ٽڪرن ۾ ورهائيو.

انهي ڪري $\frac{m\overline{AD}}{m\overline{DB}} = \frac{p}{q}$ ورهاست وارن ٽڪن مان $\overline{BC}$ جي پور وچوٽ ليڪون ڪڍيون وڃن.


ثابتي:

دليل	بيان
جوڙجڪ	پوروچوٽ ليڪن سان $\overline{AD}$ کي p يڪسان ٽڪرن ۾ ورهائيو ويو آهي
پورو چوٽ ليڪون ڪپيندڙ ليڪ تي برابر تعداد ۾ يڪسان ٽڪر ٺاهين ٿيون	$\overline{AE}$ پڻ ساڳي پور وچوٽ ليڪن سان p يڪسان ٽڪرن ۾ ورهائيو ويو آهي
جيئن ته $\overline{BD}$ پوروچوٽ ليڪن سان q يڪسان ٽڪرن ۾ ورهائيو ويو آهي.	ساڳي ريت $\overline{EC}$ پڻ q يڪسان ٽڪرن ۾ ورهائيو ويو آهي
جيئن ته $\overline{AE}$ ۽ $\overline{EC}$ ترتيبوار p ۽ q يڪسان ٽڪرن ۾ ورهائيل آهن (مٿي ثابت ٿيل آهي)	هائي
جوڙجڪ	$\frac{m\overline{AE}}{m\overline{EC}} = \frac{p}{q}$
مساوات جي متعدي خاصيت	پر
	$\frac{m\overline{AD}}{m\overline{DB}} = \frac{p}{q}$
	انهي ڪري
	$\frac{m\overline{AD}}{m\overline{DB}} = \frac{m\overline{AE}}{m\overline{EC}}$

Q.E.D

شامل نتيجو 1:

مٿين سڌيان جي شڪل مان اهو ثابت ڪري سگهجي ٿو ته $\frac{m\overline{AB}}{m\overline{DB}} = \frac{m\overline{AC}}{m\overline{EC}}$




شامل نتيجو 2:

مٿي سڏيان جي شڪل مان اهو ثابت ڪري سگهجي ٿو ته $\frac{m\overline{AD}}{m\overline{AB}} = \frac{m\overline{AE}}{m\overline{AC}}$

شامل نتيجو 3:

جيڪڏهن هڪ ليڪ ٻي پاسي ٽڪنڊي جي پايي جي پورو چوٽ آهي ۽ ٻين ٻن يڪسان پاسن کي ڪٽي ٿي ته پوءِ انهن ٻنهي پاسن تي مطابقت رکندڙ ٽڪر يڪسان هوندا.

مثال:



پير واري شڪل $\triangle ABC$ ۾ $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$

$m\overline{AD} = 15\text{cm}$, $m\overline{AE} = 5\text{cm}$ لھو جيڪڏهن
۽ $m\overline{CE} = 25\text{cm}$

حل:

$$\therefore \overline{DE} \parallel \overline{BC}$$

$$\therefore \frac{m\overline{AD}}{m\overline{BD}} = \frac{m\overline{AE}}{m\overline{EC}}$$

$$\frac{m\overline{AD}}{15} = \frac{5}{25} \quad \text{يعني ته}$$


$$\Rightarrow m\overline{AD} = \frac{15 \times 5}{25}$$

$$\Rightarrow m\overline{AD} = 3\text{cm}$$

سڏيان 24.2

جيڪڏهن ڪا ليڪ ڪنهن ٽڪنڊي جي ٻن پاسن کي متناسب ٽڪرن ۾ ورهائي ٿي ته پوءِ اها ٽڪنڊي جي ٽئين پاسي جي پورو چوٽ ٿيندي.

مثال: $\triangle ABC$ ۾، $\overline{AB}$ ۽ $\overline{AC}$ کي ترتيبوار ٽڪن P ۽ Q تي ڪٽي ٿي.




$$\frac{m\overline{AP}}{m\overline{PB}} = \frac{m\overline{AQ}}{m\overline{QC}} \quad \text{اهڙي طرح جو}$$

گهربل: $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$

جوڙجڪ: جيڪڏهن $\overline{PQ}$ پورو چوٽ نه آهي $\overline{BC}$ جي ته

ڪڍو جيڪو $\overline{AC}$ سان ٽڪي K تي ملي جيڪو C کان مختلف آهي.

اهڙي طرح جو $\overline{PQ} \parallel \overline{BK}$



ثابتي:

دليل	بيان
جوڙجڪ	$\triangle ABK$ ۾ $PQ \parallel BK$
ٽڪنڊي جي هڪ پاسي جي پوروچوٽ ليڪ ٻين پاسن کي تناسب ۾ ورهائي ٿي	$\frac{m\overline{AP}}{m\overline{PB}} = \frac{m\overline{AQ}}{m\overline{QK}}$
مليل	پر $\frac{m\overline{AP}}{m\overline{PB}} = \frac{m\overline{AQ}}{m\overline{QC}}$
مساوات جي متعدي خاصيت	انهي ڪري $\frac{m\overline{AQ}}{m\overline{QK}} = \frac{m\overline{AQ}}{m\overline{QC}}$
برابر نسبتن ۾ جيڪڏهن مُنڍ برابر آهن ته پوءِ پيڙڙ به برابر هوندا.	$\Rightarrow m\overline{QK} = m\overline{QC}$
يڪسان ٽڪرن جي وصف مطابق Q ٻنهي ۾ مشترڪ ٽپڪو آهي.	يعني $\overline{QK} \cong \overline{QC}$
اسان جو مفروضو غلط آهي	هي تڏهن ممڪن آهي جڏهن ٽپڪا K ۽ C نه هڪي ايندا انهي ڪري $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$

Q.E.D

شامل نتيجو:

ڪنهن ٽڪنڊي جي ٻن پاسن جي وچين ٽپڪن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر ٿيڻ پاسي جي پوروچوٽ ٿيندو.
مثال: ڀر واري شڪل ۾، $\triangle ABC$ جي ٻن پاسن $\overline{AC}$ ۽ $\overline{BC}$ کي $\overline{DE}$ ترتيبوار ٻن ٽپڪن D ۽ E تي ڪپي ٿو. ڀاڄي واريون ڪنڊون A ۽ B لھو جيڪڏهن $m\angle ADE = 130^\circ$ ۽ $m\angle BED = 100^\circ$ جڏهن ته پاسن جون ڊيگھون مليل آهن جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي.

حل:

جيئن ته $\angle ADE$ ۽ $\angle CDE$ سڀليمينٽري آهن.

تنهنڪري $(\because m\angle ADE = 130^\circ)$ $m\angle CDE = 50^\circ$


ساڳي ريت


$$m\angle DEC = 80^\circ$$

$\therefore \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ يعني ته $\overline{DE}$ ٻن پاسن $\overline{AC}$ ۽ $\overline{BC}$ کي تناسب

۾ ڪپي ٿو

$\therefore \overline{DE} \parallel \overline{AB}$






انهي ڪري $m\angle A = m\angle CDE$ ڇاڪاڻ ته پوروچوٽ ليڪن جون مطابقت رکندڙ ڪنڊون برابر هونديون آهن يعني ته

$$m\angle A = 50^\circ$$


ساڳي ريت

$$m\angle B = m\angle DEC = 80^\circ$$

مشق 24.1



1. $\triangle ABC$ ۾ $\overline{DE} \parallel \overline{AC}$ ، $m\overline{CE}$ لهر جيڪڏهن
 $m\overline{AE} = 5\text{cm}$ ۽ $m\overline{BD} = 6\text{cm}$ ، $m\overline{DC} = 12\text{cm}$



2. $\triangle ABC$ ۾ $\overline{PQ} \parallel \overline{AB}$ ، x جومله لهر جيڪڏهن
 $m\overline{AQ} = 2x+1$ ، $m\overline{PB} = 2$ ، $m\overline{AP} = 5x-3$
 $m\overline{QC} = 3$

3. ثابت ڪريو ته ٽرئپيزيم جي پوروچوٽ پاسن جي پوروچوٽ ڪڍيل ليڪ غير پوروچوٽ پاسن کي تناسب ۾ ڪڍي ٿي.
4. ثابت ڪريو ته هڪ ٽڪنڊي جي ڪنهن پاسي جي وچين ٽڪي مان ڪڍيل ليڪ جيڪا ٻئي پاسي جي پوروچوٽ هجي ته اها ٽيئن پاسي کي اڌ ڪندي.
5. ثابت ڪريو ته ٽرئپيزيم جي ٻن غير پوروچوٽ پاسن کي تناسب ۾ ڪپيندڙ ليڪ ٽيئن پاسي جي پوروچوٽ هوندي.

سڌيان 24.3

ٽڪنڊي جي ڪنهن ڪنڊ جو اندريون اڌ ڪندڙ سامهون واري پاسي کي، ڪنڊ جي پاسن جي ڊيگهه جي نسبت ۾ ورهائي ٿو.

ملي:

$\triangle ABC$ جي $\angle ABC$ جو اڌ ڪندڙ $\overline{BD}$ آهي.

يعني ته


$$\angle 1 \cong \angle 2$$


گهربل:

$$\frac{m\overline{AD}}{m\overline{DC}} = \frac{m\overline{AB}}{m\overline{BC}}$$

جوڙجڪ:

$\overline{BD}$ جي پوروچوٽ ليڪ $\overline{CE}$ ڪيو جيڪا $\overline{AB}$ سان ٽڪي E تي ملي ٿي.






ثابتي:

دليل	بيان
جوڙجڪ	$\therefore \overline{EC} \parallel \overline{BD}$
پوروچوٽ ليڪن جون نسبتي ڪنڊون	$\therefore m\angle E = m\angle 1 \dots (i)$
پوروچوٽ ليڪن جون متبادل ڪنڊون	$m\angle 2 = m\angle 3$
مليل	$m\angle 1 = m\angle 2$
مساوات جي متعدي خاصيت	$m\angle 1 = m\angle 3$ پر
مساوات (i) جو استعمال ڪندي	$m\angle E = m\angle 3$ تنهنڪري
ٽڪنڊي جي يڪسان ڪنڊن جا سامهون وارا	$\triangle BCE$ ۾
پاسا يڪسان هوندا آهن.	$\overline{BC} \cong \overline{BE}$
	$\triangle ACE$ ۾
جوڙجڪ	$\therefore \overline{BD} \parallel \overline{EC}$
ٽڪنڊي جي هڪ پاسي جي پوروچوٽ ليڪ ٻين پاسن کي نسبت ۾ ورهائي ٿي.	$\therefore \frac{m\overline{AD}}{m\overline{DC}} = \frac{m\overline{AB}}{m\overline{BE}}$
	يا
$\overline{BC} \cong \overline{BE}$ (مٿي ثابت ٿيو)	$\frac{m\overline{AD}}{m\overline{DC}} = \frac{m\overline{AB}}{m\overline{BC}}$

Q.E.D

شامل نتيجو: جيڪڏهن ٽڪنڊي جي ڪنهن ڪنڊ جو اندريون اڌ ڪنڊڙ واري پاسي کي اڌ ڪري ٿو ته ٽڪنڊو ٻيڙ پاسو ٽڪنڊو هوندو.

مثال:



پر واري شڪل ۾ $\triangle ABC$ جي ڪنڊ $\angle A$ جو اڌ ڪنڊڙ $\overrightarrow{AD}$ آهي. x جو ملهه لهو

جيڪڏهن $m\overline{CD} = x+1$ cm ، $m\overline{AB} = 4x-1$ cm ، $m\overline{AC} = 15$ cm

$m\overline{BD} = 5$ cm ٽڪنڊي جي قسم پڻ ٻڌايو جڏهن ته $x \in \mathbb{N}$

حل:

$\therefore \angle A$ جو اڌ ڪنڊڙ $\overrightarrow{AD}$ آهي

$$\frac{m\overline{CD}}{m\overline{DB}} = \frac{m\overline{AC}}{m\overline{AB}}$$

$$\frac{x+1}{5} = \frac{15}{4x-1}$$

يعني ته

$$\Rightarrow 4x^2 - x + 4x - 1 = 75$$


$$\Rightarrow 4x^2 + 3x - 76 = 0$$

$$\Rightarrow 4x^2 + 19x - 16x - 76 = 0$$

$$\Rightarrow x(4x+19) - 4(4x+19) = 0$$

$$\Rightarrow (x-4)(4x+19) = 0$$

$$\Rightarrow x-4 = 0 \quad \text{يا} \quad 4x+19 = 0$$



$$\Rightarrow x = 4 \quad \left| \quad \Rightarrow x = \frac{-19}{4} \right.$$

$$\frac{-19}{4} \notin \mathbb{N} \quad \therefore$$

$\therefore$ اسين $\frac{-19}{4}$ کي نظر انداز ڪنداسين

انهيءَ کري هائي

$$x = 4$$

$$m\overline{AB} = 4x - 1$$

$$= 4 \times 4 - 1$$

$$= 15$$


$$m\overline{AB} = m\overline{AC} = 15 \text{ cm} \quad \therefore$$

$$m\overline{BC} = x + 1 + 5 = 10 \text{ cm} \quad \text{۽}$$

$\therefore \triangle ABC$ ٻيڙ پاسو ٽڪنڊو آهي.

سڌيان 24.4

جيڪڏهن ٻه ٽڪنڊا هم شڪل آهن، ته مطابقت رکندڙ پاسن جون ڊيگهون متناسب هونديون. **مليل:**



$\triangle ABC$ ۽ $\triangle XYZ$ هم شڪل ٽڪنڊا آهن.

يعني ته $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle XYZ$ ۾

$$\angle A \cong \angle X$$

$$\angle B \cong \angle Y$$

$$\angle C \cong \angle Z$$

۽

$$\frac{m\overline{AB}}{m\overline{XY}} = \frac{m\overline{BC}}{m\overline{YZ}} = \frac{m\overline{AC}}{m\overline{XZ}}$$


گهربل:

جوڙجڪ:

$\overline{AB}$ مان، $\overline{AD} \cong \overline{XY}$ ڪپيو ۽ $\overline{AC}$ مان $\overline{AE} \cong \overline{XZ}$ ڪپيو. $\overline{DE}$ کي ٺاهيو.

ثابتي:

دليل	بيان
جوڙجڪ	$\triangle ADE \leftrightarrow \triangle XYZ$ ۾
مليل	$\overline{AD} \cong \overline{XY}$
جوڙجڪ	$\angle A \cong \angle X$
پ. ک. پ مفروضو	$\overline{AE} \cong \overline{XZ}$
يڪسان ٽڪنڊن جون مطابقت رکندڙ ڪنڊون	$\triangle ADE \cong \triangle XYZ$
مليل	$\angle ADE \cong \angle Y$
متعدي خاصيت	$\angle B \cong \angle Y$
	$\angle ADE \cong \angle B$
	پر تنهنڪري انهي کري



نسبتي ڪنڊون $\angle B$ ۽ $\angle ADE$ ۾ ڪنڊون آهن.

سڌيان 1 (شامل نتيجو)

$$m\overline{AE} = m\overline{XZ} \quad \text{۽} \quad m\overline{AD} = m\overline{XY}$$

مٿئين طريقي سان

(i) ۽ (ii) مان

$$\overline{DE} \parallel \overline{BC}$$

$$\frac{m\overline{AB}}{m\overline{AD}} = \frac{m\overline{AC}}{m\overline{AE}}$$

$$\frac{m\overline{AB}}{m\overline{XY}} = \frac{m\overline{AC}}{m\overline{XZ}} \dots (i) \quad \text{يا}$$

$$\frac{m\overline{AB}}{m\overline{XY}} = \frac{m\overline{BC}}{m\overline{YZ}} \dots (ii) \quad \text{ساڳي ريت}$$

$$\frac{m\overline{AB}}{m\overline{XY}} = \frac{m\overline{BC}}{m\overline{YZ}} = \frac{m\overline{AC}}{m\overline{XZ}} \quad \text{انهي ڪري}$$

Q.E.D

شامل نتيجو:

ٻن ٽڪنڊن جي مطابقت ۾ جيڪڏهن هڪ ٽڪنڊي جون ٻه ڪنڊون ٻيئي ٽڪنڊي جي ٻن ڪنڊن سان يڪسان هجن ته پوءِ انهن جا مطابقت رکندڙ پاسا تناسب ۾ هوندا.

مثال 1:

ڏنل شڪل ۾، $\triangle ABC$ ۽ $\triangle PQR$ هم شڪل آهن.

x ۽ y جا ملهه لھو جيڪڏهن $m\overline{BC} = 12\text{cm}$ ، $m\overline{AB} = 6\text{cm}$ ،

$m\overline{PQ} = 3\text{cm}$ ۽ $m\overline{PR} = 7\text{cm}$

حل:

$\triangle ABC$ ۽ $\triangle PQR$ هم شڪل ٿڪندا آهن.

$\therefore$ انهن جون مطابقت رکندڙ ڪنڊون برابر آهن.

$$\frac{m\overline{AB}}{m\overline{PQ}} = \frac{m\overline{BC}}{m\overline{QR}} = \frac{m\overline{AC}}{m\overline{PR}} \quad \text{يعني ته}$$

$$\Rightarrow \frac{6}{3} = \frac{12}{x} = \frac{y}{7} \quad (\text{ڏنل ماپن جو استعمال ڪندي})$$


$$\Rightarrow \frac{6}{3} = \frac{12}{x} \quad \text{۽} \quad \frac{6}{3} = \frac{y}{7}$$


$$2 = \frac{12}{x} \quad \text{يا} \quad 2 = \frac{y}{7}$$

$$2x = 12 \quad \text{يا} \quad 14 = y$$

$$\Rightarrow x = 6\text{ cm} \quad \text{يا} \quad y = 14\text{ cm}$$

انهي ڪري x ۽ y جا ملهه ترتيبوار 6cm ۽ 14cm آهن.






مثال 2:

ڏنل شڪل ۾، $\triangle ABC$ ۽ $\triangle PQR$ هم شڪل آهن ۽ $\frac{m\overline{AB}}{m\overline{PQ}} = \frac{x}{y}$ جڏهن ته h_1 ۽ h_2 ڏنل ٽڪنڊن جون اوچائيون آهن.

ثابت ڪريو ته:

$$\frac{\text{Area of } \triangle ABC}{\text{Area of } \triangle PQR} = \frac{x^2}{y^2}$$

ثابتي:



$$\frac{m\overline{AB}}{m\overline{PQ}} = \frac{x}{y} \quad \text{اسان وٽ آهي}$$

$\therefore \triangle ABC$ ۽ $\triangle PQR$ هم شڪل آهن

$$\therefore \frac{m\overline{AC}}{m\overline{PR}} = \frac{m\overline{BC}}{m\overline{QR}} = \frac{m\overline{AB}}{m\overline{PQ}} = \frac{x}{y} \quad \dots (i)$$

۽ $\triangle ADC \leftrightarrow \triangle PSR$

$$m\angle A = m\angle P \quad (\text{ڏنل})$$

$$\therefore m\angle D = m\angle S = 90^\circ \quad \text{۽}$$

$$\therefore \triangle ADC \sim \triangle PSR$$

انهي ڪري

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{m\overline{AC}}{m\overline{PR}} = \frac{x}{y} \quad (\text{مساوات (i) جو استعمال ڪندي})$$

هاڻي

$$\begin{aligned} \frac{\text{Area of } \triangle ABC}{\text{Area of } \triangle PQR} &= \frac{x^2}{y^2} = \frac{\frac{1}{2}(m\overline{AB})h_1}{\frac{1}{2}(m\overline{PQ})h_2} \\ &= \frac{m\overline{AB}}{m\overline{PQ}} \times \frac{h_1}{h_2} \\ &= \frac{x}{y} \times \frac{x}{y} \quad \left(\because \frac{h_1}{h_2} = \frac{x}{y} \text{ ۽ } \frac{m\overline{AB}}{m\overline{PQ}} = \frac{x}{y} \right) \\ &= \frac{x^2}{y^2} \end{aligned}$$


انهيءَ ڪري ثابت ٿيو.

مٿين مثال مان اسين نتيجو ڪيون ٿا ته



ٻن هم شڪل ٽڪنڊن جي ايراضي جي نسبت، ڪن به ٻن مطابقت رکندڙ پاسن جي نسبت جي چورس جي برابر آهي.





مشق 24.2



1. پاسي واري شڪل ۾، $\triangle ABC$ جي $\angle A$ جو اڌ ڪندڙ $\overrightarrow{AD}$ آهي. x جو ملهه لهو جيڪڏهن $m\overline{AC} = 11 - x$ ، $m\overline{AB} = x + 9$ ، $m\overline{BD} = 3x + 2$ ۽ $m\overline{CD} = 2x + 3$. ٽڪنڊي جي قسم پڻ ٻڌايو.



2. پاسي واري شڪل ۾، $\triangle ABC$ ۽ $\triangle PQR$ هم شڪل آهن. x ۽ y جو ملهه لهو جيڪڏهن پاسن جون ڊيگهون شڪل ۾ ڏيکاريل آهن.



3. فرض ڪريو ته A_1 ۽ A_2 ترتيبوار ٻن هم شڪل ٽڪنڊن $\triangle ABC$ ۽ $\triangle PQR$ جون ايراضيون آهن جيئن ته شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. معلوم ڪريو A_2 جيڪڏهن $A_1 = 28 \text{ cm}^2$ ، $m\overline{PQ} = 2x \text{ cm}$ ۽ $m\overline{AB} = 4x \text{ cm}$.

4. ٻن هم شڪل ٽڪنڊن جي مطابقت رکندڙ پاسن جي نسبت $2 : x - 5$ ۽ انهن جي ايراضين جي نسبت $1 : 9$ آهي. x جو ملهه لهو.


5. ثابت ڪريو ته ٻن گوني ڪنڊ ٽڪنڊن جا پاسا متناسب هوندا جيڪڏهن هڪ ٽڪنڊي جي سوڙهي ڪنڊ ٻئي جي سوڙهي ڪنڊ جي برابر هجي.

6. هڪ گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ گوني ڪنڊ کان هٽائينيوڙ تي ڪڍيل عمود ٽڪنڊي کي ٻن ٽڪنڊن ۾ ورهائي ٿو. ثابت ڪريو. ته انهن مان هر هڪ اصل ٽڪنڊي جو هم شڪل آهي.

جائزي واري مشق 24

1. درست جواب تي نشان لڳايو

- i. تناسب ۾، وچين رُڪن جي ضرب اُپٽ ٻاهرين رُڪنن جي _____ جي برابر آهي.
 (a) جوڙ اُپٽ (b) فرق (c) ونڊ اُپٽ (d) ضرب اُپٽ
- ii. _____ هميشه هم شڪل هوندا آهن.
 (a) ٽپور پاسو ٽڪنڊا (b) سوڙهي ڪنڊ ڪنڊا (c) اٽپور پاسو ٽڪنڊا (d) گوني ڪنڊ ٽڪنڊا
- iii. ٽڪنڊن جي هم شڪلي جي علامت _____ آهي.
 (a) = (b) $\cong$ (c) ~ (d) $\leftrightarrow$



- iv. جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي جي پايي جي پوروچوٽ ليڪ هڪ پاسي کي 3 : 2 ۾ ورهائي ٿي ته پوءِ اها ٻيئي پاسي کي _____ ۾ ورهائيندي.
- (a) 3:2 (b) 2:3 (c) 2:6 (d) 5:3
- v. جيڪڏهن هڪ ليڪ ٽڪنڊي جي ٻن پاسن کي ساڳي نسبت ۾ ڪپي ٿي ته پوءِ اها ٻيئي پاسي جي _____ هوندي.
- ڪوبه نه (d) ٺهڪندر ليڪ (c) غير پوروچوٽ ليڪ (b) پوروچوٽ ليڪ (a)
- vi. $\triangle ABC$ ۾ $\angle A$ جو اڌ ڪندڙ $\overline{BC}$ کي _____ نسبت ۾ ورهائي ٿو جيڪڏهن $m\overline{AB} = 6\text{cm}$ ۽ $m\overline{AC} = 8\text{cm}$.
- (a) 5:8 (b) 3:4 (c) 1:1 (d) 5:7
- vii. ٽپور پاسي ٽڪنڊي جي هڪ ڪنڊ جو اڌ ڪندڙ سامهون واري پاسي کي _____ ۾ ورهائي ٿو.
- (a) 2:3 (b) 3:2 (c) 1:1 (d) 5:2
- viii. ٻن هم شڪل ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا _____ هوندا آهن.
- ڪوبه نه (d) متناسب (c) غير مساوي (b) برابر (a)
- ix. جيڪڏهن هم شڪل ٽڪنڊن جي ٻن مطابقت رکندڙ پاسن جي نسبت 5:7 آهي ته پوءِ انهن جي ايراضن جي نسبت _____ جي برابر هوندي.
- (a) 5:7 (b) 7:5 (c) 25:7 (d) 25:49
- x. جيڪڏهن ٻن هم شڪل ٽڪنڊن جي ايراضن جي نسبت 36 : 121 آهي ته پوءِ انهن جي مطابقت رکندڙ پاسن جي نسبت _____ ٿيندي.
- (a) 6:10 (b) 6:11 (c) 11:6 (d) 10:6
- xi. جيڪڏهن هم شڪل ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا x : 2 نسبت ۾ آهن ۽ ايراضن جي نسبت 4:9 آهي ته پوءِ $x =$ _____.
- ڪوبه نه (d) ٻئي ۽ a b (c) -3 (b) 3 (a)
- xii. ٻه ٽپور پاسا ٽڪنڊا _____ پڻ هوندا آهن.
- هڪجيترا ٽڪنڊا (d) متناسب (c) هم شڪل ٽڪنڊا (b) يڪسان ٽڪنڊا (a)

خلاصو

- ◀ ٻن ساڳي مقدارن جي پيٽ کي نسبت چئبو آهي.
- ◀ نسبت $a:b$ ۾ a کي منڍ چئبو آهي ۽ b کي پُڇڙ چئبو آهي.
- ◀ ٻن نسبتن جي برابري کي تناسب چئبو آهي.
- ◀ تناسب ۾ وچين رڪنن جي ضرب اُپٽ ٻاهرين رڪنن جي ضرب اُپٽ جي برابر هوندي آهي.
- ◀ ٻه ٽڪنڊا هم شڪل ڪوٺبا جيڪڏهن اُهي مساوي ڪنڊن وارا ٽڪنڊا هجن.
- ◀ جيڪڏهن ٻه ٽڪنڊا هم شڪل آهن ته پوءِ انهن جا مطابقت رکندڙ پاسا متناسب هوندا.
- ◀ ٽڪنڊي جي هڪ پاسي جي پور وچوٽ ليڪ جيڪا ٻين ٻن پاسن کي ڪپي ٿي اها ليڪ انهن ٻنهي پاسن کي تناسب ۾ ڪپيندي.
- ◀ جيڪڏهن هڪ ليڪ ٽڪنڊي جي ٻن پاسن کي ساڳي نسبت ۾ ڪپي ٿو ته پوءِ اهو ٽيئن پاسي جي پوروچوٽ هوندو.
- ◀ ٽڪنڊي جي ڪنهن ڪنڊ جو اندريون اڌ ڪندڙ سامهون واري پاسي کي، ڪنڊ جي پاسن جي ڊيگهه جي نسبت ۾ ورهائي ٿو.




شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هن يونٽ جي پڙهڻ کانپوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته

◀ هيٺين سڌيان کي انهن جي شامل نتيجن سان گڏ سمجهڻ ۽ گڏيل مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ انهن جو استعمال ڪن


- ❖ ٽن غير هم ليڪ ٽپڪن مان صرف ۽ صرف هڪ گول گذري سگهي ٿو
- ❖ گول جو مرڪز مان نڪرندڙ ليڪ جيڪا زهه (جيڪو قطر نه آهي) کي اڌو اڌ ڪري ٿي. اها زهه ٽي عمودي هوندي.
- ❖ گول جي مرڪز مان زهه ٽي عمود، ان زهه کي اڌو اڌ ڪندو.
- ❖ جيڪڏهن هڪ ئي گول جا ٻه زهه يڪسان آهن ته پوءِ اهي مرڪز کان هڪ ئي فاصلي تي هوندا.
- ❖ گول جا ٻه زهه جيڪي مرڪز کان هڪجيتري فاصلي تي آهن، ته اهي يڪسان آهن.



تعارف (Introduction) :


گذريل ڪلاس ۽ يونٽن ۾، اسان جاميٽري کي تفصيل سان پڙهيو آهي جنهن ۾ ٽڪنڊا ۽ چوڪنڊا شامل هئا جيڪي سڀ ليڪ ٽڪرن سان ٺهندا. ليڪ ٽڪرن ۾ وڪڙ نه هوندا آهن. هتي اسين ثابتي سان ڳڏاڻا سڏيان ۽ ان سان لاڳاپيل مثالن تي ڌيان ڏينداسين جن جو تعلق گول سان آهي.

حقيقي دنيا جي شين جي شڪلين کي سمجهڻ ۾ گول اهم ڪردار ادا ڪن ٿا. گولن جي بنا، اسين گولائي واري رستي تي گاڏي جي حرڪت، گرهن جي مدارن ۾ شروعاتي واڌارو، ڪنهن جوهر (Atom) ۾ اليڪٽران جي حرڪت، واچوڙن جون شڪليون وغيره کي سمجهڻ جي قابل نه هونداسين. اڳتي وڌيل (Advanced) شڪلين کي پڙهڻ لاءِ گول بنياد ٺاهن ٿا. اهي شڪليون آهن. بيضوي شڪليون، گولا، سلينڊر، ۽ مخروط جيڪي وٿن جي ٿڌن، پاڻي جي قطرن، تارن، ٽڙن، ڦوڪڻن، گول سنبوسن (پائيز)، ڦيٽن، بال بيئرنگ وغيره ۾ استعمال ٿيندا آهن. حرڪت ڪندڙ ٽپڪو جنهن رستي تي هلي ٿو ان رستي کي ڏنگي ليڪ (Curve) چئبو آهي. هڪ کليل ڏنگي ليڪ (Open curve) جا شروعاتي ۽ پڇاڙي وارا ٽپڪا مختلف هوندا آهن. هڪ بند ڏنگي ليڪ (Closed curve) جنهن ٽپڪي کان شروع ٿئي ٿي ان تي ختم ٿئي ٿي. يا جنهن جا شروعاتي ۽ پڇاڙي وارا ٽپڪا نه هجن، اها ڏنگي ليڪ جيڪا پنهنجي پاڻ کي نه ڪپي، ان کي سادي ڏنگي ليڪ (Simple curve) چئبو آهي ٻي صورت ۾ اها غير سادي ڏنگي ليڪ ڪوٺبي. اها ڏنگي ليڪ جيڪا سادي هئڻ سان گڏوگڏ بند به هجي ته ان کي سادي بند ڏنگي ليڪ چئبو آهي. مثال طور شڪل (i) ۾ ڏنگي ليڪن کي ڏسو.




شڪل (i)، کليل، بند، سادي، ۽ غير سادي ڏنگي ليڪون

گول هڪ سادي بند ڏنگي ليڪ آهي ۽ ان جا سڀ ٽپڪا هڪ مقرر ٽپڪي کان ساڳي فاصلي تي آهن. ان مقرر ٽپڪي کي مرڪز چئبو آهي. گول جي حد (Boundary) جي ڏيکڻ کي گول جو گهيرو چئبو آهي. هڪ ليڪ ٽڪر جيڪو گول جي مرڪز ۽ گول جي گهيرو جي ڪنهن به ٽپڪي کي ملائي ان کي رداسي ٽڪر (Radial segment) چئبو آهي ۽ ان جي ڏيکڻ کي گول جو رداس چئبو آهي. اهي ٽپڪا جيڪي گول جي اندر هجن اهي گول جو اندريون (Interior of circle) ٺاهين ٿا ۽ اهي ٽپڪا جيڪي ٻاهر هجن اهي گول جو ٻاهريون (Exterior of circle) ٺاهين ٿا. هڪ ليڪ ٽڪر جيڪو گول جي ڪن به ٻن ٽپڪن کي ملائي انکي گول جو زهه (Chord) چئبو آهي. اهو زهه جيڪو گول جي مرڪز مان گذري تنهن کي قطر (Diameter) يا مرڪزي زهه چئبو آهي ۽ ان جي ڏيکڻ، گول جي سڀني زهن جي ڏيکڻ کان سڀ کان وڏي هوندي آهي. اهي اصطلاحون شڪل (ii) ۾ واضح ڪجن ٿيون.




شڪل (ii)




جيڪڏهن r گول جو رداس آهي ته پوءِ ان جو قطر، گهيرو ۽ ايراضي ترتيبوار $2r$ ، $2\pi r$ ۽ πr^2 آهن. جڏهن ته π (يوناني اکرپائي) هڪ غير ناطق عدد آهي. π گول جي گهيري جي ان جي قطر سان نسبت آهي. ان جو لڳ ڀڳ ملهه $22/7$ آهي پر اهو ان جي برابر نه آهي. حقيقت ۾ $\pi = 3.141592653\dots$ اسين ڏسون ٿا ته $22/7 = 3.142857142\dots$ جو ملهه π جي ملهه سان رڳو ڏهائي جي ٻن درجن تائين ساڳيو آهي.

گول جي گهيري جي ڪنهن حصي کي گول جو قوس (Arc) چئبو آهي. هڪ زهه گول جي اندرين علائقي (Interior) کي نيڪ ٻن حصن يا ڦاڪن يا سيگمينٽس (Segments) ۾ ورهائي ٿو. قطر گول کي ٻن برابر سيگمينٽس ۾ ورهائي ٿو. سيگمينٽ جي حدبندي هڪ قوس ۽ لاڳاپيل زهه سان ٿيندي آهي. ڪنهن خاص زهه لاءِ، گول جي اندرين علائقي جي وڏي حصي واري سيگمينٽ کي وڏي سيگمينٽ (Major segment) چئبو آهي. ۽ ٻيئي واري کي ننڍي سيگمينٽ (Minor segment) چئبو آهي. انهن سان مطابقت وارا قوس ترتيبوار وڏو قوس (Major arc) ۽ ننڍو قوس (Minor arc) ڪوٺبا آهن. گول جي اندرين علائقي جو حصو جيڪو ڪنهن قوس ۽ ٻن رداسي ٽڪرن سان گهيريل هجي، ان کي گول جو سيڪٽر (Sector of a circle) چئبو آهي. سيڪٽر جا ٻه قسم هوندا آهن. وڏو سيڪٽر (Major sector) ۽ ننڍو سيڪٽر (Minor Sector) لفظ Subtend جي معنيٰ آهي ”جڪڙڻ“ ۽ اهو عام طرح سان گول ۾ زهه يا قوس جي هيٺيان ڪنهن ٽپڪي تي ڪنڊ ٺاهڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي. مرڪزي ڪنڊ (Central angle) اها ڪنڊ هوندي آهي جيڪا ڪو قوس گول جي مرڪز تي ٺاهي ٿو. يعني گول جو مرڪز مرڪزي ڪنڊ جي چوٽي (Vertex) هوندي آهي. شڪل (iii) اهي تصور واضح ڪري ٿي.




شڪل (iii)

گول جو مقام ۽ ماپ معلوم ڪرڻ لاءِ ترتيبوار مرڪز ۽ رداس استعمال ٿيندا آهن. ٻه گول يڪسان ٿيندا جيڪڏهن انهن جا رداس برابر هجن. ساڳيئي مرڪز وارا ٻه گول هم مرڪز (Concentric) گول ڪوٺبا. هڪ ئي ليڪ تي موجود ٽپڪا هم ليڪ (Collinear) چورائبا آهن ٻي صورت ۾ غير هم ليڪ (Non-collinear) ڪوٺبا. هڪ ئي گول تي موجود ٽپڪن کي هم مدار (Concyclic) ٽپڪا چئبو آهي. اهڙو گول جيڪو ڪنهن ٽڪنڊي جي تنهي چوٽين مان گذري ان کي گهيريونڊڙ گول (Circum circle) چئبو آهي. اهو چوڪنڊو جنهن جون سڀ چوٽيون ڪنهن گول تي هجن ته ان کي هم مدار چوڪنڊو (Cyclic Quadrilateral) چئبو آهي. اهي سڀ اصطلاح شڪل (iv) ۾ واضح ڪجن ٿا.



شڪل (iv)



25.1 گول جا زهه (Chords of a Circle):

سڌيان 25.1: تن غير هم ليڪ ٽپڪن مان صرف ۽ صرف هڪ گول گذري سگهي ٿو.

ملي:

فرض ڪريو ته A, B ۽ C تي غير هم ليڪ ٽپڪا آهن.

گهربل:

ٽپڪن A, B ۽ C مان صرف ۽ صرف هڪ گول گذري سگهي ٿو.

جوڙجڪ:

ليڪ ٽڪر $\overline{AB}$ ۽ $\overline{BC}$ ڪيو $\overline{AB}$ ۽ $\overline{BC}$ جا ترتيبوار عمودي اڌ ڪندڙ $\overleftrightarrow{ED}$ ۽ $\overleftrightarrow{GF}$ ڪيو. $\overleftrightarrow{ED}$ ۽ $\overleftrightarrow{GF}$ هڪٻئي کي ٽپڪي O تي ڪپين ٿا. $\overline{OA}$, $\overline{OB}$ ۽ $\overline{OC}$ ڪيو.

ثابتي:


دليل	بيان
$\overleftrightarrow{ED}$ عمودي اڌ ڪندڙ آهي $\overline{AB}$ جو ۽ O هڪ ٽپڪو آهي $\overleftrightarrow{ED}$ تي.	$\overleftrightarrow{ED}$ جا سڀ ٽپڪا A ۽ B کان هڪجيتري فاصلي تي آهن يعني $m\overline{OA} = m\overline{OB}$... (i)
$\overleftrightarrow{GF}$ عمودي اڌ ڪندڙ آهي $\overline{BC}$ جو ۽ $\overleftrightarrow{GF}$ ٽپڪي O مان گذري ٿي.	$\overleftrightarrow{GF}$ جا سڀ ٽپڪا B ۽ C کان هڪجيتري فاصلي تي آهن يعني $m\overline{OB} = m\overline{OC}$... (ii)
$\overleftrightarrow{ED}$ ۽ $\overleftrightarrow{GF}$ غير پورو چوٽ ليڪون آهن.	ٽپڪو O , $\overleftrightarrow{ED}$ ۽ $\overleftrightarrow{GF}$ جو هڪ ئي ميلاپ وارو ٽپڪو آهي ... (iii)
(i) ۽ (ii) مان	ٽپڪو O , هڪجيتري فاصلي تي آهي A, B ۽ C کان يعني ته
متعدي خاصيت	(iv) ... $m\overline{OA} = m\overline{OB} = m\overline{OC} = r$
$\overline{OA}$, $\overline{OB}$ ۽ $\overline{OC}$ رداسي ٽڪر آهن ۽ (iii) مان	رڳو مرڪز O ۽ رداس r وارو گول ٽپڪن A, B ۽ C مان گذري ٿو. ... (v)
ملي	(vi) ... A, B ۽ C غير هم ليڪي ٽپڪا آهن انهيءَ ڪري هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول وجود رکي ٿو جنهن جو مرڪز O ۽ رداس r آهي ۽ جيڪو غير هم ليڪ ٽپڪن A, B ۽ C مان گذري ٿو

Q.E.D

شامل نتيجو: گول جا ڪي به ٽي ڌار ڌار ٽپڪا غير هم ليڪ هوندا آهن.

نوٽ 1: سڌيان 25.1 ان گول جي وجود ۽ يڪتائي جو مظاهرو ڪري ٿو جيڪو ڪن به ٽن غير هم ليڪ ٽپڪن مان ڪلي سگهجي.

نوٽ 2: ٽي کان وڌيڪ تعداد وارا ٽپڪا جيڪي هڪ گول تي آهن اهي غير هم ليڪ هوندا.



مثال 1:

ثابت ڪيو ته صرف ۽ صرف هڪ ئي گول ڪنهن ٽڪنڊي جي ٽنهي ڇوٽين مان گذري سگهي ٿو.

مليل:


$\triangle ABC$ جنهن جون ڇوٽيون A, B ۽ C آهن.

گهربل:

صرف ۽ صرف هڪ گول $\triangle ABC$ جي ڇوٽين مان گذري سگهي ٿو.

جوڙجڪ:

$\triangle ABC$ جي پاسن $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ ۽ $\overline{AC}$ جا ترتيبوار عمودي اڌ ڪندڙ $\overleftrightarrow{DE}$, $\overleftrightarrow{FG}$ ۽ $\overleftrightarrow{HI}$ ڪيو جيڪي ٽپڪي O تي ڪپين ٿا. $\overline{OA}$, $\overline{OB}$ ۽ $\overline{OC}$ ڪيو.



ثابتي:

دليل	بيان
$\overleftrightarrow{DE}$, $\overleftrightarrow{FG}$ ۽ $\overleftrightarrow{HI}$ غير پورو ڇوٽ ليڪون آهن ۽ O انهن سڀني تي موجود آهي. وصف مطابق	O رڳو هڪ ئي ميلاب وارو ٽپڪو آهي $\overleftrightarrow{DE}$, $\overleftrightarrow{FG}$ ۽ $\overleftrightarrow{HI}$ جو.
گھيريندڙ مرڪز جي وصف مطابق $\overline{OA}$, $\overline{OB}$ ۽ $\overline{OC}$ رداسي ٽڪر آهن.	$\triangle ABC$ جو گھيريندڙ مرڪز O آهي. ٽپڪو O , $\triangle ABC$ جي ڇوٽين کان هڪجيتري فاصلي تي آهي.
	يعني ته $m\overline{OA} = m\overline{OB} = m\overline{OC} = r$ وارو گول، $\triangle ABC$ جي ڇوٽين مان گذري ٿو.

Q.E.D

مثال 2:

ثابت ڪريو ته چوڪنڊي جي ڇوٽين مان صرف ۽ صرف هڪ ئي گول گذري سگهي ٿو.

مليل:


هڪ چوڪنڊو $ABCD$


گهربل:

چوڪنڊي $ABCD$ جي ڇوٽين مان صرف ۽ صرف هڪ ئي گول گذري ٿو.

جوڙجڪ:

$\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ ۽ $\overline{AD}$ جا عمودي اڌ ڪندڙ ترتيبوار $\overleftrightarrow{IJ}$, $\overleftrightarrow{GH}$ ۽ $\overleftrightarrow{EF}$ ڪيو. اهي سڀ ٽپڪي O تي ملن ٿا. $\overline{OA}$, $\overline{OB}$, $\overline{OC}$ ۽ $\overline{OD}$ ٺاهيو.





ثابتي:


دليل	بيان
$\overleftrightarrow{EF}$ عمودي اڌ ڪندڙ آهي $\overline{AB}$ جو.	$\overleftrightarrow{EF}$ جا سڀ ٽپڪا A ۽ B کان هڪجيتري فاصلي تي آهن.
O موجود آهي $\overleftrightarrow{EF}$ تي.	(i) $\overline{OA} \cong \overline{OB}$ ∴
مٿيون ساڳيو طريقو	(ii) $\overline{OB} \cong \overline{OC}$ ساڳي ريت،
مٿيون ساڳيو طريقو	(iii) $\overline{OC} \cong \overline{OD}$
مٿيون ساڳيو طريقو	(iv) $\overline{OD} \cong \overline{OA}$
O انهن سڀني ليڪن تي موجود آهي.	$\overleftrightarrow{EF}, \overleftrightarrow{GH}, \overleftrightarrow{IJ}$ ۽ $\overleftrightarrow{KL}$ جو رڳو هڪ ئي ميلاپ وارو ٽپڪو O آهي.
(i) کان (iv) مان	ٽپڪو O چوڪنڊي جي چوٽين A, B, C ۽ D کان هڪجيتري فاصلي تي آهي. انهيءَ ڪري
$\overline{OA}, \overline{OB}, \overline{OC}, \overline{OD}$ رڍاسي ٽڪر ٺاهن ٿا.	$m\overline{OA} = m\overline{OB} = m\overline{OC} = m\overline{OD} = r$
	مرڪز O ۽ رڍاس r وارو هڪ ئي گول چوڪنڊي جي چوٽين A, B, C ۽ D مان گذري ٿو.

Q.E.D

مشق 25.1

1. ڇا هڪ گول ٽن هم ليڪ ٽپڪن مان گذري سگهي ٿو. دليل سان واضح ڪريو.
2. ڇا توهان ڪنهن چار غير هم ليڪ ٽپڪن مان هڪ گول ڪڍي سگهو ٿا. دليل سان واضح ڪريو.
3. ثابت ڪري ڏيکاريو ته صرف ۽ صرف هڪ گول چورس جي چوٽين مان گذري سگهي ٿو.
4. ثابت ڪري ڏيکاريو ته صرف ۽ صرف هڪ گول پور پنج ڪنڊي جي چوٽين مان گذري سگهي ٿو.
5. ٽي ڳوٺ اهڙي ريت واقع آهن جو A جي اوڀر ۾ 6Km جي فاصلي تي B آهي ۽ B جي اتر ۾ 8Km جي فاصلي تي C آهي. مسٽر يا فت پٽي، پلڪار ۽ ونڊڻي پلڪار جو استعمال ڪندي مسجد جو مقام لھو ته جيئن هر هڪ ڳوٺ مان سڀ ساڳي فاصلي جو پنڌ ڪن. اهو پڻ معلوم ڪريو ته هر هڪ ڳوٺاڻي کي گهڻو پنڌ ڪرڻو پوندو.

سڌيان 25.2: گول جي مرڪز مان نڪرندڙ ليڪ جيڪا زهر (جيڪو قطر نه آهي) کي اڌو اڌ ڪري ٿي. اهڙهه تي عمود هوندي.




ملي: هڪ گول جنهن جو مرڪز O تي آهي ۽ $\overline{AB}$ هڪ زهر آهي جيڪو مرڪز مان نٿو گذري يعني O اهو قطر نه آهي. هڪ سڌي ليڪ OC جيڪا $\overline{AB}$ کي ٽپڪي C تي اڌو اڌ ڪري ٿي.

يعني ته $m\overline{AC} = m\overline{BC}$

گهربل: $\overline{OC} \perp \overline{AB}$


جوڙجڪ: $\overline{OA}$ ۽ $\overline{OB}$ ٺاهيو.



ثابتي:

دليل	بيان
ساڳي گول جا رداس مليل مشتري پاسو پ. پ. پ. پ. پ. پ. پ. يڪسان ٿڪڻن جون مطابقت رکندڙ ڪنڊون سپليمينٽري ڪنڊن جو موضوع (i) ۽ (ii) مان عمود جي وصف مطابق	$\Delta OCA \leftrightarrow \Delta OCB$ $m\overline{OA} = m\overline{OB}$ $m\overline{AC} = m\overline{BC}$ $m\overline{OC} = m\overline{OC}$ $\Delta OCA \cong \Delta OCB$ $m\angle OCA = m\angle OCB \dots (i)$ $m\angle OCA + m\angle OCB = 180^\circ \dots (ii)$ $m\angle OCA = 90^\circ = m\angle OCB$ $\overrightarrow{OC} \perp \overline{AB}$ اهڙيءَ طرح

Q.E.D



سڌيان 25.3: گول جي مرڪز مان زهه تي عمود، ان زهه کي اڌو اڌ ڪندو.
مليل: هڪ گول جنهن جو مرڪز O تي آهي ۽ $\overline{AB}$ ان جو زهه آهي. مرڪز O کان عمود $\overline{OC}$ ملي ٿو $\overline{AB}$ سان ٽپڪي C تي يعني $\overline{OC} \perp \overline{AB}$ انهيءَ ڪري $\angle OCA$ ۽ $\angle OCB$ گوني ڪنڊون آهن.
گهريل: $\overline{OC}$ اڌو اڌ ڪري ٿو $\overline{AB}$ کي ٽپڪي C تي.
جوڙجڪ: $\overline{OA}$ ۽ $\overline{OB}$ ڪيو.
ثابتي:

دليل	بيان
مليل ساڳي گول جا رداسي ٽڪر مشتري پاسو ه. پ. ه. پ. ه. پ. يڪسان ٿڪڻن جا مطابقت وارا پاسا $\overline{AB}$ جو وچيون ٽپڪو C آهي.	$\Delta AOC \leftrightarrow \Delta BOC$ $m\angle OCA = 90^\circ = m\angle OCB$ $\overline{OA} \cong \overline{OB}$ $\overline{OC} \cong \overline{OC}$ $\Delta AOC \cong \Delta BOC$ انهيءَ ڪري $\overline{AC} \cong \overline{BC}$ $\overline{OC}$ ، زهه $\overline{AB}$ کي اڌو اڌ ڪري ٿو.

Q.E.D

شامل نتيجو 1:

هڪ گول جي زهه جو عمودي اڌ ڪندڙ گول جي مرڪز مان گذرندو.


شامل نتيجو 2:

گول جي مرڪز ۽ زهه جي وچ ۾ گهٽ ۾ گهٽ فاصلو ان جي وچين ٽپڪي کان هوندو آهي.

نوٽ:

سڌيان 25.2 ۽ 25.3 گول جي زهه ۽ مرڪز مان گذرندڙ ان جي اڌ ڪندڙ ليڪ ٽڪر جي وچ ۾ تعلق کي نمايان ڪن ٿا.


انهن سڌيان ۽ فيثاغورث سڌيان جي مدد سان اسين گول جي زهه جي ڊيگهه لهي سگهون ٿا.



مثال 1:

هڪ زه جي ڊيگهه لھو جنھن جو گول جي مرڪز کان عمودي فاصلو 5cm آھي ۽ رداس 9cm آھي.

حل:



هڪ گول کڻو جنھن جو مرڪز O ۽ زھ AB آھي. مرڪز O کان عمود، زھ AB سان ٽپڪي C تي ملي ٿو جيئن ڀر واري شڪل ۾ ڏيکاريل آھي. $\triangle OCA$ ۾ فيثا غورث سڏيان جو استعمال ڪندي، اسان وٽ آھي.

$$(m\overline{OA})^2 = (m\overline{OC})^2 + (m\overline{AC})^2 \quad \text{يا} \quad 9^2 = 5^2 + (m\overline{AC})^2$$

$$\therefore m\overline{AC} = \sqrt{81 - 25} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14} \text{ cm.}$$


آخر ۾

$$\begin{aligned} \text{(جيئن } \overline{OC} \text{ ليڪ ٽڪر } \overline{AB} \text{ کي اڌو اڌ ڪري ٿو)} \quad \overline{AB} = 2(m\overline{AC}) \\ = 2(2\sqrt{14}) = 4\sqrt{14} = 14.967 \text{ cm} \end{aligned}$$

مثال 2:

جيڪڏھن گول جي هڪ زه جي ڊيگهه 8cm آهي ۽ گول جي مرڪز کان زه تائين عمودي فاصلو 3cm آهي ته پوءِ گول جو رداس ڇا ٿيندو؟

حل:



هڪ گول کڻو جنھن جو مرڪز O آھي ۽ ان جو زھ AB آھي. مرڪز کان عمود 8cm ڊيگهه واري زھ AB سان ٽپڪي C تي ملي ٿو جيئن ته ڀر واري شڪل ۾ ڏيکاريل آھي $\triangle OCA$ ۾ فيثا غورث سڏيان استعمال ڪندي، اسان وٽ آھي.

$$(m\overline{OA})^2 = (m\overline{OC})^2 + (m\overline{AC})^2$$

$$x^2 = 3^2 + 4^2 \quad \text{يا} \quad (\overline{OC} \text{ اڌو اڌ ڪري ٿو } \overline{AB} \text{ کي})$$

$$x^2 = 25 \Rightarrow x = 5, \text{ منفي عدد کي نظر انداز ڪندي}$$

$$\text{اهڙيءَ طرح } m\overline{OA} = x = 5 \text{ cm رداس}$$

مشق 25.2


1. ثابت ڪري ڏيکاريو ته گول جا قطر هڪٻئي کي اڌو اڌ ڪن ٿا.
2. ثابت ڪري ڏيکاريو ته گول جي مرڪز کان زه جي وچئين ٽپڪي تي ٺهندڙ ڪنڊ گوني ڪنڊ هوندي.
3. جيڪڏھن زھ جي ڊيگهه 8cm آھي ۽ گول جي مرڪز کان زھ تائين عمودي فاصلو 3cm آھي ته پوءِ گول جو گھيرو ۽ گول جي ايراضي لھو.
4. زھ جي ڊيگهه لھو جيڪو گول جي مرڪز کان k فاصلي تي آھي ۽ سندس رداس r ھيٺين ريت آھي.
 - a. $k = 4 \text{ cm}, r = 9 \text{ cm}$
 - b. $k = 3 \text{ cm}, r = 6 \text{ cm}$
5. گول جو رداس ڇا ٿيندو جيڪڏھن 10cm ڊيگهه واري زھ جو گول جي مرڪز کان فاصلو 3cm آھي.



سڌيان 25.4:

جيڪڏهن هڪ ئي گول جا ٻه زهر يڪسان آهن ته پوءِ اهي مرڪز کان هڪ ئي فاصلي تي هوندا.

مليل:



هڪ گول جنهن جو مرڪز O آهي. ان جا ٻه زهر $\overline{AB}$ ۽ $\overline{CD}$ يڪسان آهن

جڏهن ته $\overline{OE} \perp \overline{AB}$ ۽ $\overline{OF} \perp \overline{CD}$.

گهربل:

$$\overline{OE} \cong \overline{OF}$$

جوڙجڪ:

$$\overline{OA} \text{ ۽ } \overline{OC} \text{ ڪيو}$$

ثابتي:

دليل	بيان
عمود $\overline{OE}$ ، زهر $\overline{AB}$ کي اڌو اڌ ڪري ٿو	$m\overline{AE} = \frac{1}{2}m\overline{AB}$... (i)
عمود $\overline{OF}$ ، زهر $\overline{CD}$ کي اڌو اڌ ڪري ٿو	$m\overline{CF} = \frac{1}{2}m\overline{CD}$... (ii)
$\overline{AB} \cong \overline{CD}$ (مليل آهي)	$\therefore m\overline{AB} = m\overline{CD}$... (iii)
(i)، (ii) ۽ (iii) جو استعمال ڪندي	$\therefore \overline{AE} \cong \overline{CF}$
ساڳيئي گول جا رداسي ٽڪر	گوني ڪند ٽڪنڊن جي مطابقت
مٿي ثابت ٿيل آهي	$\triangle AEO \leftrightarrow \triangle CFO$
ه. پ. ه. پ	$\overline{OA} \cong \overline{OC}$
يڪسان ٽڪنڊن جا مطابقت وارا پاسا	$\overline{AE} \cong \overline{CF}$
	$\triangle AEO \cong \triangle CFO$
	$\Rightarrow \overline{OE} \cong \overline{OF}$

Q.E.D

شامل نتيجو:


گول جا ٻه يڪسان زهرن مرڪز تي برابر ڪنڊون ٺاهين ٿا.

نوٽ 1:


سڌيان 25.4 ٻن زهرن جي يڪسانيت ۽ مرڪز کان انهن جي فاصلي جي وچ ۾ لاڳاپي کي واضح ڪري ٿو.

نوٽ 2:

جيڪڏهن ٻه زهر يڪسان نه آهن ته پوءِ اهي مرڪز کان هڪجيتري فاصلي تي نه هوندا.



سڌيان 25.5: گول جا ٻه زهه جيڪي مرڪز کان هڪجيتري فاصلي تي آهن، ته اهي يڪسان آهن.
مليل: هڪ گول جنهن جو مرڪز O آهي گول جا ٻه زهه $\overline{AB}$ ۽ $\overline{CD}$ مرڪز O کان هڪجيتري فاصلي تي



آهن. يعني ته $\overline{OE} \cong \overline{OF}$ ان جو مطلب اهو به آهي ته $\overline{OE} \perp \overline{AB}$ ۽ $\overline{OF} \perp \overline{CD}$

گهربل:

$$\overline{AB} \cong \overline{CD}$$

جوڙجڪ:

$$\overline{OA} \text{ ۽ } \overline{OC} \text{ ڪيو}$$

ثابتي:

دليل	بيان
ساڳئي گول جا رداسي ٽڪر مليل ه. پ. ه. پ. يڪسان ٽڪنن جا مطابقت رکندڙ پاسا عمود $\overline{OE}$ زهه $\overline{AB}$ کي اڌو اڌ ڪري ٿو عمود $\overline{OF}$ زهه $\overline{CD}$ کي اڌو اڌ ڪري ٿو (i)، (ii) ۽ (iii) جو استعمال ڪندي	گوني ڪنڊ ٽڪنن جي مطابقت $\Delta AEO \leftrightarrow \Delta CFO$ $\overline{OA} \cong \overline{OC}$ $\overline{OE} \cong \overline{OF}$ $\therefore \Delta AEO \cong \Delta CFO$ انهيءَ ڪري (i) $\dots m\overline{AE} = m\overline{CF}$ (ii) $\dots m\overline{AE} = \frac{1}{2}m\overline{AB}$ (iii) $\dots m\overline{CF} = \frac{1}{2}m\overline{CD}$ $\therefore \frac{1}{2}m\overline{AB} = \frac{1}{2}m\overline{CD}$ $\therefore \overline{AB} \cong \overline{CD}$

Q.E.D

شامل نتيجو: جيڪڏهن گول جا ٻه زهه مرڪز تي برابر ڪنڊون ٺاهين ٿا ته پوءِ اهي يڪسان آهن.


نوٽ 1: سڌيان 25.5 عڪس آهي 25.4 جو

نوٽ 2: جيڪڏهن گول جا ٻه زهه مرڪز کان هڪجيتري فاصلي تي نه آهن ته پوءِ اهي يڪسان نه هوندا.

مثال 1:

ثابت ڪري ڏيکاريو ته جيڪڏهن هڪ گول جا ٻه زهه هڪٻئي کي ڪپين ٿا ته پوءِ انهن جي ٽڪرن جون ضرب اپتون برابر ٿينديون.


مليل: مرڪز O واري گول جا ٻه زهه $\overline{AB}$ ۽ $\overline{PQ}$ هڪٻئي کي ٽڪي M تي ڪپين ٿا



$$(m\overline{AM}) \times (m\overline{MB}) = (m\overline{PM}) \times (m\overline{QM})$$

گهربل:


جوڙجڪ: $\overline{AP}$ ۽ $\overline{BQ}$ ڪيو.



ثابتي:

دليل	بيان
ساڳيئي قوس PB جون ڪنڊون	$\angle PAM \cong \angle BQM \quad \dots \quad (i)$
ساڳيئي قوس AQ جون ڪنڊون	$\angle APM \cong \angle QBM \quad \dots \quad (ii)$
(i) ۽ (ii) مان: (ڪ . ڪ ~ ڪ . ڪ)	$\triangle APM \sim \triangle QBM$
هر شڪل ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا	$\frac{m\overline{AM}}{m\overline{QM}} = \frac{m\overline{PM}}{m\overline{BM}} \quad \dots \quad (iii)$
آمهون سامهون ضرب ڪرڻ سان	$(m\overline{AM}) \times (m\overline{BM}) = (m\overline{PM}) \times (m\overline{QM})$

Q.E.D



مثال 2:

ثابت ڪري ڏيکاريو ته هڪ گول ۾ قطر سڀ کان وڏو زه هوندو آهي.

مليي: هڪ گول جنهن جو مرڪز O آهي ان جو هڪ قطر AB آهي. $\overline{AB}$ کانسواءِ، $\overline{CD}$ گول جو ڪو ٻيو زه آهي.


گهربل: $m\overline{AB} > m\overline{CD}$

جوڙجڪ: $\triangle OCD$ مڪمل ڪرڻ لاءِ $\overline{OC}$ ۽ $\overline{OD}$ ڪيو ثابتي:

دليل	بيان
ٽڪنڊي جي ٻن پاسن جي جوڙ ايت تئين پاسي کان وڌي هوندي آهي.	$\triangle OCD,$ $m\overline{OC} + m\overline{OD} > m\overline{CD} \quad \dots \quad (i)$
$\overline{OC}$ ۽ $\overline{OD}$ رداسي ٽڪرا آهن ۽ قطر جي وصف مطابق	$m\overline{OC} + m\overline{OD} = m\overline{AB} \quad \dots \quad (ii)$
(i) ۽ (ii) جو استعمال ڪندي	$m\overline{AB} > m\overline{CD} \quad \dots \quad (iii)$
(iii) مان ۽ ڪنهن به زه $\overline{CD}$ لاءِ سواءِ قطر جي	زه $\overline{AB}$ جي ڊيگهه، جيڪو قطر پڻ آهي وڌي آهي گول جي ڪنهن ٻئي زه $\overline{CD}$ جي ڊيگهه کان


Q.E.D

مثال 3:



هڪ گول جي ٻن يڪسان زهن جي وچ ۾ فاصلو لھو جڏهن ته هر هڪ زه جي ڊيگهه 6cm ۽ گول جو گھيرو 10π cm آهي.

حل: مرڪز O واري گول جا 6m ڊيگهه وارا ٻه يڪسان زه $\overline{AB}$ ۽ $\overline{PQ}$ آهن ۽ رداس r آهي جيئن پرواري شڪل ۾ ڏيکاريل آهي اسان کي $m\overline{CD}$ ڪپي.



$$m\overline{OB} = r = \frac{C}{2\pi} = \frac{10\pi}{2\pi} = 5\text{cm.}$$

گوني ڪنڊ ٽڪنڊي $\triangle OCB$ ۽ فيثاغورث سڌيان استعمال ڪندي، اسان وٽ آهي

$$(m\overline{OB})^2 = (m\overline{OC})^2 + (m\overline{CB})^2$$

$$5^2 = (m\overline{OC})^2 + \left(\frac{1}{2}m\overline{AB}\right)^2$$

$$5^2 = (m\overline{OC})^2 + 3^2 \Rightarrow m\overline{OC} = \sqrt{25-9} = \sqrt{16} = 4\text{cm}$$

ڇاڪاڻ ته ٻه يڪسان زهه گول جي مرڪز کان هڪجيتري فاصلي تي هوندا آهن. انهيءَ ڪري

$$m\overline{OD} = m\overline{OC} = 4\text{cm}$$

آخر ۾

$$m\overline{CD} = m\overline{OC} + m\overline{OD} = 4 + 4 = 8\text{cm}$$

مشق 25.3

1. ثابت ڪريو ته ٻن يڪسان گولن جا ٻه يڪسان زهه انهن جي مرڪزن کان هڪ جيتري فاصلي تي هوندا آهن.
2. ثابت ڪري ڏيکاريو ته ٻن يڪسان گولن جا ٻه زهه جيڪي مرڪز کان هڪجيترو فاصلو رکن ٿا اهي يڪسان هوندا.
3. رداس r واري هڪ گول ۾ α ڊيگهه وارن ٻن يڪسان زهن جي وچ ۾ فاصلو لھو جڏهن ته α ۽ r جون قيمتون هيٺ ڏنل آهن







(a). $\alpha = 7\text{cm}$ and $r = 6\text{cm}$ (b). $\alpha = 5\text{cm}$ and $r = 4\text{cm}$

(c). $\alpha = 2\text{cm}$ and $r = 4\text{cm}$ (d). $\alpha = 4\text{cm}$ and $r = 9\text{cm}$

4. رداس r واري گول ۾ α ۽ β واري ڊيگهه جي ٻن پورو چوٽ زهه جي وچ ۾ فاصلو معلوم ڪريو جڏهن ته α ۽ β جون قيمتون هيٺ ڏنل آهن.

a. $\alpha = 6\text{cm}, \beta = 8\text{cm}, r = 5\text{cm}$ b. $\alpha = 3\text{cm}, \beta = 6\text{cm}, r = 14\text{cm}$

5. جيڪڏهن مرڪز O واري گول جا ٻه زهه $\overline{AB}$ ۽ $\overline{CD}$ هڪٻئي کي ٽپي P تي ڪپين ٿا ته پوءِ هيٺين ۾ x جو ملهه لھو.







جائزي واري مشق 25

1. درست جواب تي نشان لڳايو

- i. سڀ گول هميشه _____ هوندا آهن.
- (a) يڪسان (b) هم شڪل
(c) چھڻا (d) ڪو به نه
- ii. هيٺين شڪل ۾ مرڪز D ۽ E وارا گول _____ آهن.



- iii. ڏنل شڪل ۾، زه AB جي ڊيگهه _____ آهي.
- (a) يڪسان (b) هم شڪل
(c) ٻئي (a) ۽ (b) (d) ڪو به نه




- (a) 4cm (b) 6cm (c) 8cm (d) 15cm
- iv. هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول _____ ٽپڪن مان گذرندو آهي.
- (a) هم ليڪي (b) غير هم ليڪي (c) غير مشترڪ (d) ڪو به نه

v. ”جيڪڏهن ڪنهن گول جا ٻه زه يڪسان آهن ته پوءِ اهي مرڪز کان هڪجيتري فاصلي تي هوندا.“
ان بيان جو مفروضو آهي :

- (a) گول جا ٻه زه مرڪز کان هڪ جيتري فاصلي تي آهن
(b) گول جا ٻه زه يڪسان آهن
(c) هڪ گول جا ٻه زه هوندا آهن
(d) گول جو مرڪز زه کان هڪجيتري فاصلي تي هوندو آهي.

vi. ”جيڪڏهن ڪنهن گول جا ٻه زه يڪسان آهن ته پوءِ اهي مرڪز کان هڪجيتري فاصلي تي هوندا.“
ان بيان جو نتيجو آهي :

- (a) گول جا ٻه زه مرڪز کان هڪ جيتري فاصلي تي آهن
(b) گول جا ٻه زه يڪسان آهن
(c) هڪ گول جا ٻه زه هوندا آهن
(d) گول جو مرڪز زه کان هڪ جيتري فاصلي تي هوندو آهي.



- vii. هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول ٽن غير هم ليڪ ٽپڪن مان گذري ٿو. ان بيان جو مفروضو آهي.
- (a) ٽي ٽپڪا غير هم ليڪ آهن (b) هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول ٽن ٽپڪن مان گذري ٿو.
 (c) ٽن ٽپڪن مان ٻه گول گذرندا (d) ٽي ٽپڪا هم ليڪ آهن.
- viii. ”هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول ٽن غير هم ليڪ ٽپڪن مان گذري ٿو“ ان بيان جو نتيجو آهي.
- (a) ٽي ٽپڪا غير هم ليڪ آهن (b) هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول ٽن ٽپڪن مان گذري ٿو.
 (c) ٽن ٽپڪن مان ٻه گول گذرندا (d) ٽي ٽپڪا هم ليڪ آهن.
- ix. گول هڪ _____ ڏنگي ليڪ جي مثال آهي.
- (a) سادي ۽ بند (b) سادي ۽ کليل
 (c) غير سادي ۽ بند (d) غير سادي ۽ کليل

خلاصو

- ◀ گول هڪ سادي بند ڏنگي ليڪ آهي.
- ◀ گول جا سڀ ٽپڪا هڪ مقرر ٽپڪي کان هڪ ئي فاصلي تي هوندا آهن. اهو مقرر ٽپڪو مرڪز ڪوٺبو آهي ۽ مستقل فاصلي کي گول جو رداس چئبو آهي.
- ◀ گول جو رداسي ٽڪر هڪ اهڙو ليڪ ٽڪر آهي جيڪو گول جي مرڪز کان ان جي ڪنهن به ٽپڪي تائين هوندو آهي.
- ◀ گول جي ڪن به ٻن ٽپڪن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر کي زه چئبو آهي. مرڪز مان گذرندڙ زه کي گول جو قطر يا مرڪزي زه چئبو آهي.
- ◀ رداس r واري گول جو قطر، گهيرو ۽ ايراضي ترتيبوار $2\pi r$ ، $2\pi r^2$ ۽ πr^2 آهي.
- ◀ گول جي گهيري جي ڪنهن به حصي کي قوس چئبو آهي. انهن جا ٻه قسم آهن. وڏو قوس ۽ ننڍو قوس.
- ◀ سيڪٽر گول علائقي جا اهي حصا آهن جيڪي ٻن رداسي ٽڪرن ۽ قوس سان گهيريل هجن، ان جا ٻه قسم آهن وڏي سيڪمينٽ ۽ ننڍي سيڪمينٽ.
- ◀ سڀ گول هڪٻئي جا همشڪل هوندا آهن.
- ◀ ٻه گول يڪسان هوندا جيڪڏهن انهن جا رداس برابر هجن.
- ◀ ساڳي مرڪز وارا گول هم مرڪز ڪوٺبا آهن.
- ◀ هڪ ئي گول تي موجود ٽپڪا هم مدار ڪوٺبا آهن.
- ◀ هڪ ۽ صرف هڪ گول ٽن غير هم ليڪ ٽپڪن مان گذري سگهي ٿو.
- ◀ گول جي مرڪز مان گذرندڙ سڌي ليڪ جيڪا زه (جيڪو قطر نه آهي) کي اڌو اڌ ڪري اها ان زه تي عمود هوندي.
- ◀ گول جي مرڪز مان ڪنهن زه تي عمود، ان زه کي اڌو اڌ ڪندو آهي.
- ◀ جيڪڏهن ڪنهن گول جا ٻه زه يڪسان آهن ته پوءِ اهي مرڪز کان هڪ جيتري فاصلي تي هوندا.
- ◀ گول جا ٻه زه جيڪي مرڪز کان هڪجيتري فاصلي تي هجن، اهي يڪسان هوندا.




گول جون ڇهڻي ليڪون

TANGENTS OF A CIRCLE

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)


هن يونٽ جي پڙهڻ کانپوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته

- هيٺيان سڌيان انهن جي شامل نتيجن سان گڏ سمجهڻ ۽ گڏيل مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ انهن جو استعمال ڪن.
- ❖ جيڪڏهن هڪ ليڪ گول جي رداسي ٽڪر جي ٻاهرئين ڇيڙي تي عمود هجي ته اها ليڪ ان ٽپڪي تي گول جي ڇهڻي ليڪ هوندي.
- ❖ ڇهڻ ٽپڪي تي، گول جي ڇهڻي ليڪ ۽ گول جو رداسي ٽڪر ٻئي، هڪٻئي تي عمود هوندا آهن.
- ❖ ڪنهن گول جي هڪ ٻاهرئين ٽپڪي تان گول تي ڪڍيل ٻه ڇهڻي ليڪون، ڏيکيه ۾ برابر هونديون.
- ❖ جيڪڏهن ٻه گول ٻاهريان ڇهن ٿا ته انهن جي مرڪزن جي وچ وارو فاصلو ترتيبوار انهن جي رداسن جي جوڙ آيت يا فرق جي برابر آهي.




تعارف (Introduction):


هتي ڇهڻي ليڪ يا ليڪن سان لاڳاپيل سڌيان ۽ انهن جون ثابتيون زير غور اينديون، رياضي جي هڪ شاخ ڪيلڪيولس (Calculus) ۾ ڊيريويٽو (Derivative) بيان ڪرڻ لاءِ ڇهڻي ليڪ جو تصور پڻ ڏاڍو اهم آهي. هڪ ليڪ گول کي ڪپي سگهي ٿي ۽ نه به. جيڪڏهن ڪا ليڪ گول کي رڳو هڪ ئي ٽپڪي تي ڇهي ٿي ته اها گول جي ڇهڻي ليڪ (Tangent) آهي. ڇهڻي ليڪ ۽ گول جي وچ ۾ مشترڪ ٽپڪي کي ميلاپ وارو ٽپڪو يا ڇهڻ ٽپڪو (Point of tangency or point of contract) چئبو آهي ۽ اها ليڪ جيڪا گول کي ٻن ٽپڪن تي ڪپي ته ان کي ڪپيندڙ ليڪ (Secant) چئبو آهي. ڪپيندڙ ليڪ ۽ گول جي وچ ۾ ميلاپ وارا ٻه ٽپڪا هوندا آهن. شڪل (i) ۾ l_1 ۽ l_2 گول کي نٿيون ڇهن. ليڪون m_1 ۽ m_2 ترتيبوار ٽپڪن P ۽ Q تي ڇهڻي ليڪون آهن. ليڪون n_1 ۽ n_2 ترتيبوار ٽپڪن A، B ۽ C، D تي ڪپيندڙ ليڪون آهن. ڇهڻي ٽپڪي کان ڇهڻي ليڪ جي ڪنهن به ٽپڪي تائين ليڪ ٽڪر کي ڇهڻي ليڪ ٽڪر (Tangent Segment) چئبو آهي. شڪل (ii) ۾ $\overrightarrow{PQ}$ ۽ $\overrightarrow{AB}$ ڇهڻي ليڪ ٽڪر آهن. ڇهڻي ليڪ ٽڪر $\overrightarrow{AB}$ جي ڊيگهه m_{AB} آهي. گول کان ٻاهر موجود ڪنهن به ٽپڪي P مان ٻه ڇهڻي ليڪون $\overrightarrow{PA}$ ۽ $\overrightarrow{PB}$ ڪڍي سگهجن ٿيون جيئن شڪل (iii) ۾ ڏيکاريل آهي.



شڪل (i)




شڪل (ii)




شڪل (iii)

اهي گول جيڪي هڪٻئي کي اندران يا ٻاهريان ڇهن ٿا. انهن ۾ ڇهڻ ٽپڪو مشترڪ هوندو آهي. شڪل (iv) ۾، ٽپڪو P مشترڪ ڇهڻ ٽپڪو آهي انهن گولن جو جنهن جا مرڪز O ۽ M، ۽ N آهن مرڪز O ۽ M وارا گول اندريان ڇهن ٿا. جڏهن ته O ۽ N مرڪزن (يا M ۽ N پڻ) وارا گول ٻاهريان ڇهن ٿا. هڪٻئي کي نه ڇهڻ وارا ٻه گول عام ڇهڻ ليڪون يا مشترڪ ڇهڻي ليڪون رکي سگهن. ٿا پر انهن جا ڇهڻ ٽپڪا مختلف هوندا آهن ٻن نه ڇهڻ وارن گولن جي مشترڪ ڇهڻي ليڪ کي اندرين (يا آڏي) مشترڪ ڇهڻي ليڪ چئبو جيڪڏهن اها انهن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر کي ڪپي، ٻي صورت ۾ ان کي ٻاهرين (يا سڌي طرح) مشترڪ ڇهڻي ليڪ چئبو آهي شڪل (v) ۾ گولن تي ليڪ m هڪ ٻاهرين (يا سڌي طرح) مشترڪ ڇهڻي ليڪ آهي جڏهن ته ليڪ l هڪ اندرين (يا آڏي) مشترڪ ڇهڻي ليڪ آهي.



شڪل (iv)




شڪل (v)



26.1 گول تي ڇهڻي ليڪ يا ليڪون

سڌيان 26.1: جيڪڏهن هڪ ليڪ گول جي رداسي ٽڪر جي ٻاهرئين ڇيڙي تي عمود هجي ته اها ليڪ ان ٽپڪي تي گول جي ڇهڻي ليڪ هوندي.



مليل: هڪ گول جنهن جو مرڪز O ۽ رداس r آهي. رداس $\overline{OP}$ تي عمود $\overleftrightarrow{AB}$ ڪڍيو ويو آهي يعني ٻاهرئين ڇيڙي P تي $\overleftrightarrow{AB} \perp \overline{OP}$.

گهربل: گول جي ٽپڪي P تي $\overleftrightarrow{AB}$ ڇهڻي ليڪ آهي.


جوڙجڪ: $\overline{OQ}$ ڪيو، جڏهن ته $\overleftrightarrow{AB}$ تي P کانسواءِ Q هڪ ٽپڪو آهي.

ثابتي:

دليل	بيان
P تي $\overleftrightarrow{AB} \perp \overline{OP}$ (مليل)	گوني ڪنڊي ٽڪنڊي OPQ ۾ $m\angle OPQ = 90^\circ$
گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ گوني ڪنڊ کانسواءِ ٻيون ڪنڊون سوڙهي ڪنڊون هونديون آهن.	پر $m\angle OQP < 90^\circ$
وڏي ڪنڊ جي سامهون وارو پاسو وڏو هوندو آهي.	انهي ڪري $m\overline{OQ} > m\overline{OP}$
$m\overline{OQ} > r$	انهي ڪري Q گول کان ٻاهر موجود آهي.
Q ڪو ٻيو ٽپڪو آهي P کانسواءِ (جوڙجڪ)	P کانسواءِ $\overleftrightarrow{AB}$ جا سڀ ٽپڪا گول کان ٻاهر آهن
ڇهڻي ليڪ جي وصف مطابق	گول ۽ $\overleftrightarrow{AB}$ جو ميلاپ وارو ٽپڪو رڳو P آهي.
	انهي ڪري $\overleftrightarrow{AB}$ گول جي ٽپڪي P تي هڪ ڇهڻي ليڪ آهي.

Q.E.D.

26.2 سڌيان




ڇهڻ ٽپڪي تي، گول جي ڇهڻي ليڪ ۽ گول جو رداسي ٽڪر ٻئي، هڪٻئي تي عمود هوندا آهن.

مليل: هڪ گول جنهن جو مرڪز O ۽ رداس r ۽ رداسي ٽڪر $\overline{OP}$ آهي. ٽپڪي P تي $\overleftrightarrow{AB}$ هڪ ڇهڻي ليڪ آهي.

گهربل: $\overline{OP} \perp \overleftrightarrow{AB}$

جوڙجڪ: $\overline{OQ}$ ڪيو، جڏهن ته P کانسواءِ Q هڪ ٽپڪو آهي $\overleftrightarrow{AB}$ جو.



ثابتي:

بيان	دليل
تپڪو Q گول کان ٻاهر آهي انهي ڪري $m\overline{OQ} > m\overline{OP} = r$ (i) ...	P کانسواءِ Q ڪو ٻيو تپڪو آهي $\overrightarrow{AB}$ جو $\overline{OP}$ هڪ رداسي ٽڪر آهي $m\overline{OP} = r$ ۽
P کانسواءِ $\overrightarrow{AB}$ جي سڀني تپڪن جو مرڪز کان فاصلو r کان وڌيڪ آهي تنهنڪري P کانسواءِ سڀ تپڪا گول کان ٻاهر آهن	P کانسواءِ Q ڪو ٻيو تپڪو آهي $\overrightarrow{AB}$ جو (جوڙجڪ)
مرڪز O کان $\overrightarrow{AB}$ جي ڪنهن به تپڪي تائين سڀ کان ننڍو ليڪ ٽڪر $\overline{OP}$ آهي.	(i) مان P کانسواءِ $\overrightarrow{AB}$ جي ڪنهن به تپڪي Q لاءِ
انهي ڪري $m\angle OPQ = 90^\circ$ ۽ $\overline{OP} \perp \overrightarrow{AB}$	ٻيون سڀ ڪنڊون سوڙهيون ڪنڊون آهن

Q.E.D.

نوٽ 1:

سڌيان 26.1 ۽ 26.2 ڇهڻ تپڪي تي، گول جي ڇهڻي ليڪ ۽ ان سان واسطيدار رداسي ٽڪر جي وچ ۾ تعلق
کي نمايان ڪن ٿا.

نوٽ 2:

سڌيان 26.1 ۽ سڌيان 26.2 هڪٻئي جا عڪس آهن.

شامل نتيجو 1:

ڇهڻ تپڪي تي، گول جي ڇهڻي ليڪ تي ڪا عمودي ليڪ هميشه گول جي مرڪز مان گذرندي.


شامل نتيجو 2:

گول جي مرڪز، ڇهڻي تپڪي ۽ ڇهڻي ليڪ جي ڪنهن ٻيئي تپڪي سان ٺهيل ٽڪنڊو هڪ گوني ڪنڊ
ٽڪنڊو هوندو

شامل نتيجو 3: گول جي ڪنهن هڪ ڏنل تپڪي مان صرف هڪ ئي ڇهڻي ليڪ ڪڍي سگهجي ٿي.

مثال 1: ثابت ڪري ڏيکاريو ته ڪنهن گول کي گهيريٽڊ پورو چوٽ چوڪنڊو رامبس آهي.

ميليل: هڪ گول جو گهيريٽڊ پورو چوٽ چوڪنڊو $ABCD \parallel^m$ آهي. اهڙي طرح جو $m\overline{AB} = m\overline{CD}$ ۽ $m\overline{AD} = m\overline{BC}$



گهربل: $ABCD \parallel^m$ هڪ رامبس آهي يعني ته $m\overline{AB} = m\overline{BC} = m\overline{CD} = m\overline{AD}$

جوڙجڪ: گول جي تپڪن P, Q, R ۽ S تي ترتيبوار $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CD}$ ۽ $\overline{AD}$

ڇهڻي ليڪ ٽڪر آهن $\overline{OA}, \overline{OS}$ ۽ $\overline{OP}$ ڪڍو.




ثابتي:

دليل	بيان
ساڳي گول جا رداسي ٽڪر جهڙي ليڪ رداسي ٽڪر تي عمود آهي ٽڪنڊي جو مشترڪ پاسو ه. پ. ه. پ. ه. پ.	$\Delta OSA \leftrightarrow \Delta OPA$ $OS \cong OP$ $m\angle OSA = 90^\circ = m\angle OPA$ $OA \cong OA$ $\Rightarrow \Delta OSA \cong \Delta OPA$ $m\overline{AS} = m\overline{AP} \dots (i)$
يڪسان ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا ساڳي طريقي موجب	$\Delta OPB \cong \Delta OQB$ ساڳي ريت $m\overline{BQ} = m\overline{BP} \dots (ii)$
يڪسان ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا ساڳي طريقي موجب	$\Delta OQC \cong \Delta ORC$ $m\overline{QC} = m\overline{RC} \dots (iii)$
يڪسان ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا ساڳي طريقي موجب	$\Delta ORD \cong \Delta OSD$ $m\overline{DS} = m\overline{DR} \dots (iv)$
يڪسان ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا (iv)_(i) مساواتن کي جوڙ ڪندي	$m\overline{AS} + m\overline{BQ} + m\overline{QC} + m\overline{DS}$ هاڻي $= m\overline{AP} + m\overline{BP} + m\overline{RC} + m\overline{DR}$ يا $(m\overline{AS} + m\overline{DS}) + (m\overline{BQ} + m\overline{QC})$ $= (m\overline{AP} + m\overline{BP}) + (m\overline{RC} + m\overline{DR})$
بيهر، ترتيب ڏيندي	$m\overline{AD} + m\overline{BC} = m\overline{AB} + m\overline{CD} \dots (v)$ يا $2m\overline{BC} = 2m\overline{AB} \Rightarrow m\overline{AB} = m\overline{BC} \dots (vi)$ $m\overline{AB} = m\overline{BC} = m\overline{CD} = m\overline{AD}$ انهي ڪري ABCD هڪ رامبس آهي

Q.E.D.

مثال 2: 5cm رداس واري گول جي ڇهڙي ليڪ ٽڪر جي ڊيگهه لھو جنھن جو ڇيڙو گول جي مرڪز کان 13cm پري آھي.



حل: فرض ڪريو ته گول جو مرڪز O آهي ۽ ڇهڙي ٽڪر P آهي.
فرض ڪريو ته Q ڇهڙي ليڪ جو اهو ٽڪر آهي جيڪو مرڪز کان 13cm
جي فاصلي تي آهي جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. شڪل مان، اسان وٽ آهي.

$$m\overline{PQ} = x = ? \text{ ۽ } m\overline{OQ} = 13cm, m\overline{OP} = r = 5cm$$

فيثاغورث سڌيان جو استعمال ڪندي


$$(m\overline{OQ})^2 = (m\overline{OP})^2 + (m\overline{PQ})^2$$

$$(13)^2 = (5)^2 + (x)^2$$

$$169 = 25 + x^2$$


$$x^2 = 169 - 25 = 144 \text{ يا}$$

$$m\overline{PQ} = x = \sqrt{144} = 12cm.$$



مثال 3: ٻن هم مرڪز گولن جا ترتيبوار رداس 5cm ۽ 3cm آهن. وڏي گول جي ٽيڪن کان ننڍي گول تي ڇهڻي ليڪ ٽڪر جي ڊيگهه لھو. وڏي گول جي زھ جي ڊيگهه پڻ لھو جيڪو ننڍي گول کي ڇھي ٿو.

حل: ڏنل رداسن وارا ٻه هم مرڪز گول شڪل ۾ ڏيکاريل آهن جن جو مشترڪ مرڪز O آھي. يعني ته $m\overline{OA} = 3\text{cm}$ ۽ $m\overline{OP} = 5\text{cm}$ سڀ کان اڳ ۾ اسانکي $m\overline{AP}$ ۽ $m\overline{AQ}$ لھڻ جي ضرورت آھي. يعني وڏي گول جي ٽيڪن P ۽ Q کان ننڍي گول تي ڇھڻي ليڪ ٽڪرن جي ڊيگهه.



فيثاغورث سڌيان جو استعمال ڪندي اسان وٽ آھي

$$\begin{aligned} (m\overline{OP})^2 &= (m\overline{OA})^2 + (m\overline{AP})^2 \\ 25 &= 9 + (m\overline{AP})^2 \end{aligned}$$

يعني

$$\Rightarrow (m\overline{AP})^2 = 16$$

$$m\overline{AP} = 4\text{cm} \quad \text{يا}$$

پر رداسي ٽڪر $\overline{OA}$ اڌو اڌ ڪري ٿو زھ $\overline{PQ}$ کي

$$m\overline{AP} = m\overline{AQ} \quad \text{تنهنڪري}$$


$$\Rightarrow m\overline{AQ} = 4\text{cm}$$

آخر ۾ اسان کي وڏي گول جي زھ $\overline{PQ}$ جي ڊيگهه ڪي ٿي جيڪو ننڍي گول کي ڇھي ٿو. جيڪو آھي:

$$m\overline{PQ} = m\overline{AP} + m\overline{AQ} = 8\text{cm}$$

مشق 26.1

1. ثابت ڪري ڏيکاريو ته گول کي گھيريندڙ ٽڪنڊو هڪ ٽپور پاسو ٽڪنڊو آھي.
2. ثابت ڪري ڏيکاريو ته گول کي گھيريندڙ مستطيل هڪ چورس آھي.
3. ٻن هم مرڪز گولن جا ترتيبوار قطر 10cm ۽ 5cm آهن. ٻاهرين گول جي هڪ ٽيڪي کان ننڍي گول تي هڪ ڇهڻي ليڪ ٽڪر جي ڊيگهه لھو. ٻاهرين گول جي ان زھ جي ڊيگهه پڻ لھو جيڪو اندرين گول کي ڇھي ٿو.
4. گول جي مرڪز کان 5cm جي فاصلي تي هڪ ٽيڪو آھي. ان ٽيڪي کان گول جي ڇهڻي ليڪ ٽڪر جي ڊيگهه 4cm آھي. گول جو قطر، گھيرو ۽ ايراضي لھو.
5. 7cm رداس واري گول جي مرڪز کان هڪ ٽيڪو 25cm جي فاصلي تي آھي. ان ٽيڪي کان گول تي هڪ ڇهڻي ليڪ ٽڪر جي ڊيگهه معلوم ڪريو.
6. 3cm رداس واري گول جي مرڪز کان ڪيترو پري هڪ 10cm ڊيگهه وارو ڇهڻي ليڪ ٽڪر گول تي ڪڍي سگھجي ٿو؟



سڌيان 26.3: ڪنهن گول جي هڪ ٻاهرين ٽپڪي تان گول تي ڪڍيل ٻه ڇهڻي ليڪون، ڏيکڻ ۾ برابر هونديون.

ملي: هڪ ٻاهرين ٽپڪي P کان گول جي ٽپڪن A ۽ B تي ٻه ڇهڻي

ليڪون $\overrightarrow{PA}$ ۽ $\overrightarrow{PB}$ آهن

گهربل: $\overrightarrow{PA} \cong \overrightarrow{PB}$

جوڙجڪ: $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ ۽ $\overrightarrow{OP}$ ڪيو

ثابتي:

دليل	بيان
ڇهڻي ليڪ رڌاسي ٽڪر تي عمود آهي	$m\angle OAP = 90^\circ$ ۽ $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{PA}$
ڇهڻي ليڪ رڌاسي ٽڪر تي عمود آهي.	ساڳي ريت $m\angle OBP = 90^\circ$ ۽ $\overrightarrow{OB} \perp \overrightarrow{PB}$
مشترڪ پاسو	گوني ڪنڊ ٽڪنڊن $\triangle OAP \leftrightarrow \triangle OBP$ ۾
ساڳيئي گول جا رڌاسي ٽڪر	$\overrightarrow{OP} \cong \overrightarrow{OP}$
هـ. پ هـ. پ	$\overrightarrow{OA} \cong \overrightarrow{OB}$
يڪسان ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا	$\therefore \triangle OAP \cong \triangle OBP$
	$\therefore \overrightarrow{PA} \cong \overrightarrow{PB}$

Q.E.D.

نوٽ 1: سڌيان 26.3 ظاهر ڪري ٿو ته ڪنهن گول جون ٻه ڇهڻي ليڪون جيڪي هڪ ٻئي کي گول کان ٻاهر ڪنهن ٽپڪي تي ڪپين ته اهي ڏيکڻ ۾ برابر هونديون.


شامل نتيجو 1: ڪنهن گول جون ٻاهرين ٽپڪي کان ڪڍيل ڇهڻي ليڪون مرڪز تي يڪسان ڪنڊون ٺاهن ٿيون.

شامل نتيجو 2: ڪنهن گول جون ٻه پوروچوٽ ڇهڻي ليڪون گول کان ٻاهر ساڳيئي ٽپڪي تي نه ڪپنديون.

نوٽ 2: جيڪڏهن ڪنهن گول جي ڇهڻي ليڪ ۽ ڪپيندڙ ليڪ هڪٻئي کي گول کان ٻاهر ڪپين جيئن ڀر واري شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. ته پوءِ ڇهڻي ليڪ ٽڪر جي ڏيکڻ ۾ چورس برابر هوندو

ڪپيندڙ ليڪ ٽڪر ۽ ان جي ٻاهرين حصي جي ڏيکڻ جي ضرب اُپت جي. يعني ته

$$t^2 = s \cdot e \quad \text{يا} \quad (m\overline{AB})^2 = (m\overline{DB}) \cdot (m\overline{BC})$$




نوٽ 3: جيڪڏهن ٻه ڪپيندڙ ليڪون هڪٻئي کي گول کان ٻاهر ڪپين

ٿيون جيئن ڀر واري شڪل ۾ ڏيکاريل آهي ته پوءِ هڪ ڪپيندڙ ليڪ


ٽڪر ۽ ان جي ٻاهرين حصي جي ڏيکڻ جي ضرب اُپت برابر هوندي،

ٻئي ڪپيندڙ ليڪ ٽڪر ۽ ان جي ٻاهرين حصي جي ڏيکڻ جي ضرب

اُپت جي. يعني ته




$$s_1 e_1 = s_2 e_2 \quad \text{يا} \quad (m\overline{AF}) \times (m\overline{BF}) = (m\overline{CF}) \times (m\overline{DF})$$



مثال 1:

ثابت ڪريو ته ڪنهن گول جي قطر جي چيڙن تي ڪڍيل ڇهڻي ليڪون پورو چوٽ هونديون.



ملي: هڪ گول جنهن جو مرڪز O آهي. $\overleftrightarrow{AB}$ ۽ $\overleftrightarrow{CD}$ ترتيبوار قطر جي

چيڙن P ۽ Q تي ڇهڻي ليڪون آهن

گهربل: $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{CD}$

جوڙجڪ: $\overline{AQ}$, $\overline{DP}$, $\overline{CP}$ ۽ $\overline{BQ}$ ڪڍو

ثابتي:

دليل	بيان
$\overleftrightarrow{AB} \perp \overline{OP}$	$m\angle APO = 90^\circ = m\angle BPO$
$\overleftrightarrow{CD} \perp \overline{OQ}$	$m\angle CQO = 90^\circ = m\angle DQO$
متبادل ڪنڊون	(i) $m\angle CPQ = m\angle BQP$
متبادل ڪنڊون	(ii) $m\angle AQP = m\angle QPD$ ۽
ساڳيون اندريون متبادل ڪنڊون، (i)، (ii)	$\therefore \overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{CD}$

Q.E.D

مثال 2:

ثابت ڪريو ته ٻن گولن جون ٻه سڌي طرح مشترڪ ڇهڻي ليڪون، ڏيکڻ ۾ برابر آهن.


ملي: $\overleftrightarrow{AB}$ ۽ $\overleftrightarrow{CD}$ ٻه سڌي طرح مشترڪ ڇهڻي ليڪون آهن ٻن گولن

تي جن جا مرڪز O ۽ P آهن.

گهربل: $m\overline{AB} = m\overline{CD}$


جوڙجڪ: $\overleftrightarrow{AB}$ ۽ $\overleftrightarrow{CD}$ کي وڌايو ته جيئن اهي هڪ ٽپڪي Q تي ڪپين.

ثابتي:






دليل	بيان
$\odot O$ جي ٻاهرين ٽپڪي Q مان ڪڍيل ڇهڻي ليڪون	$m\overline{AQ} = m\overline{CQ}$ (i)
$\odot P$ جي ٻاهرين ٽپڪي Q مان ڪڍيل ڇهڻي ليڪون	$m\overline{BQ} = m\overline{DQ}$ (ii)
(i) مان (ii) کي ڪٽ ڪندي	$m\overline{AQ} - m\overline{BQ} = m\overline{CQ} - m\overline{DQ}$
شڪل جو استعمال ڪندي.	$\therefore m\overline{AB} = m\overline{CD}$

Q.E.D.



مثال 3:

هيٺين شڪلين ۾ نامعلوم ڊيگهه x لھو.



حل:

(a) ڇهڻي ليڪون $\overline{PQ}$ ۽ $\overline{PR}$ گول جي ٻاهر ٽپڪي P تي ملن ٿيون. تنهنڪري اهي ڊيگهه ۾ لازمي برابر هوندا. يعني $m\overline{PQ} = m\overline{PR}$ انهي ڪري $x = 3\text{cm}$

(b) ڇهڻي ليڪ $\overline{AB}$ ڪپينڊڙ ليڪ $\overline{DC}$ سان گول جي ٻاهر ٽپڪي B تي ملي ٿي. انهي ڪري اسان وٽ آهي.

$$x^2 = 12 \times 3 \Rightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = 6\text{cm} \quad \text{يا} \quad (m\overline{AB})^2 = (m\overline{DB}) \cdot (m\overline{BC})$$









(c) ٻه ڪپينڊڙ ليڪون $\overline{AB}$ ۽ $\overline{ED}$ گول کان ٻاهر ٽپڪي C تي هڪٻئي کي ڪپين ٿيون. انهي ڪري اسان وٽ آهي.

$$(x+8) \times 8 = (10+6) \times 6 \Rightarrow 8x + 64 = 96 \quad \text{يا} \quad (m\overline{AC}) \times (m\overline{BC}) = (m\overline{EC}) \times (m\overline{CD})$$

 آخر ۾ $8x = 96 - 64 \Rightarrow 8x = 32 \Rightarrow x = 4\text{cm}$








مشق 26.2

1. ثابت ڪري ڏيکاريو ته ڪنهن گول جي زھ جي ڇيڙن تي ڪڍيل ڇهڻي ليڪون ان زھ سان برابر ڪنڊون ٺاهينديون.
2. ثابت ڪريو ته جيڪڏهن گول جون ٻه ڇهڻي ليڪون پوروچوٽ آهن ته پوءِ ڇهڻ ٽپڪا گول جي هڪ قطر جا ڇيڙا آهن.
3. ثابت ڪري ڏيکاريو ته جيڪڏهن گول جون ٻه ڇهڻي ليڪون پوروچوٽ نه آهن ته پوءِ ڇهڻ ٽپڪا گول جي هڪ زھ جا ڇيڙا آهن.
4. هيٺين ۾ نامعلوم x جو ملهه لھو.





5. هيٺين ۾ نامعلوم x جو ملهه لھو.



سڌيان 26.4: صورت (A):
جيڪڏهن ٻه گول ٻاهريان ڇهن ٿا ته انهن جي مرڪزن جي وچ وارو فاصلو انهن جي رداسن جي جوڙ آيت جي برابر آهي.


مليل: ٻه گول جن جا مرڪز O ۽ O' آهن ۽ انهن جا رداس ترتيبوار r ۽ r' آهن. اهي گول هڪٻئي کي ٽپي B تي ڇهن ٿا.

گهربل: $m\overline{OO'} = r + r'$


جوڙجڪ: ٻنهي گولن جي هڪ مشترڪ ڇهڻي ليڪ $\overleftrightarrow{AC}$ کڻو جيڪا ٽپي B مان گذري ٿي.
ثابتي:

دليل	بيان
ڇهڻي ليڪ رداسي ٽڪر تي عمود آهي.	(i) ... $m\angle OBC = 90^\circ$ تنهنڪري $\overline{OB} \perp \overleftrightarrow{AC}$
ڇهڻي ليڪ رداسي ٽڪر تي عمود آهي.	(ii) ... $m\angle O'BC = 90^\circ$ تنهنڪري $\overline{O'B} \perp \overleftrightarrow{AC}$
(i) ۽ (ii) کي جوڙ ڪندي	(iii) ... $m\angle OBC + m\angle O'BC = 180^\circ$
(i), (ii) ۽ (ii) مان	B, O ۽ O' هر ليڪ ٽپڪا آهن ۽ B موجود آهي O ۽ O' جي وچ ۾
وصف مطابق	$\therefore m\overline{OB} + m\overline{O'B} = m\overline{OO'}$
$m\overline{O'B} = r'$ ۽ $m\overline{OB} = r$	$m\overline{OO'} = r + r'$ يا

Q.E.D.



سڌيان 26.4: صورت (B): جيڪڏهن ٻه گول اندريان ڇهن ٿا ته انهن جي مرڪزن جي وچ وارو فاصلو انهن جي رڌاسن جي فرق جي برابر آهي.



مليل: ٻه گول جن جا مرڪز O ۽ O' آهن ۽ انهن جا رڌاس ترتيبوار r ۽ r' آهن. اهي گول هڪ ٻئي کي ٽڪي B تي اندريان ڇهن ٿا.

گهربل: $m\overline{OO'} = r - r'$

جوڙجڪ: ٻنهي گولن جي هڪ مشترڪ ڇهڙي لڪ $\overrightarrow{AC}$ کڻو جيڪا ٽڪي B مان گذري ٿي.

ثابتي:

دليل	بيان
ڇهڙي لڪ رڌاسي ٽڪر تي عمود آهي.	(i) $m\angle OBC = 90^\circ$ تنهنڪري $\overline{OB} \perp \overrightarrow{AC}$
ڇهڙي لڪ رڌاسي ٽڪر تي عمود آهي.	(ii) $m\angle O'BC = 90^\circ$ تنهنڪري $\overline{O'B} \perp \overrightarrow{AC}$
(i) ۽ (ii) مان	(iii) $m\angle OBC = m\angle O'BC = 90^\circ$
(i), (ii) ۽ (iii) مان	O, O' ۽ B هر لڪ ٽڪا آهن ۽ O' موجود آهي
وصف مطابق	O ۽ B جي وچ ۾
(iv) مان ۽ $m\overline{OB} = r$, $m\overline{O'B} = r'$	(iv) $m\overline{OO'} = m\overline{OB} - m\overline{O'B}$ $m\overline{OO'} = m\overline{OB} - m\overline{O'B} = r - r'$

Q.E.D.

شامل نتيجو 1:

جيڪڏهن ٻن گولن جي مرڪزن جي وچ وارو فاصلو انهن جي رڌاسن جي جوڙ اُٺ (يا فرق) جي برابر آهي ته پوءِ اهي ٻاهريان (يا اندران) ڇهن ٿا.


شامل نتيجو 2:

جيڪڏهن ٻن گولن جي مرڪزن جي وچ وارو فاصلو انهن جي رڌاسن جي جوڙ اُٺ يا فرق جي برابر نه آهي ته پوءِ گول هڪ ٻئي کي نٿا ڇهن.

مثال 1: جيڪڏهن ٽي گول جوڙن ۾ ٻاهريان ڇهن ٿا ته پوءِ انهن جي مرڪزن کي ملائڻ سان ٺهندڙ ٽڪنڊي جو پيريميٽر، انهن جي رڌاسن جي جوڙ اُٺ جي ٻيڻ جي برابر آهي.


مليل: ٽي گول جن جا مرڪز A, B, C ۽ انهن جا رڌاس ترتيبوار r_1, r_2, r_3 آهن.

اهي گول ٽڪن P, Q, R تي جوڙن ۾ ٻاهريان ڇهن ٿا.



گهربل: $2(r_1 + r_2 + r_3) = \text{جو پيريميٽر } \triangle ABC$

جوڙجڪ: $\triangle ABC$ ٺاهڻ لاءِ P, Q, R مان ترتيبوار $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, ۽ $\overline{AC}$ ٺاهيو.




ثابتي:

دليل	بيان
A ۽ B جي وچ ۾ P موجود آهي.	$m\overline{AB} = m\overline{AP} + m\overline{BP}$ (i)
B ۽ C جي وچ ۾ Q موجود آهي.	$m\overline{BC} = m\overline{BQ} + m\overline{CQ}$ (ii)
A ۽ C جي وچ ۾ R موجود آهي.	$m\overline{AC} = m\overline{AR} + m\overline{CR}$ (iii)
(i)، (ii) ۽ (iii) کي جوڙ ڪندي	$m\overline{AB} + m\overline{BC} + m\overline{AC}$
بيهر ترتيب ڏيڻ سان	$= m\overline{AP} + m\overline{BP} + m\overline{BQ} + m\overline{CQ} + m\overline{AR} + m\overline{CR}$
	$m\overline{AB} + m\overline{BC} + m\overline{AC}$
	$= (m\overline{AP} + m\overline{AR}) + (m\overline{BP} + m\overline{BQ}) + (m\overline{CQ} + m\overline{CR})$
	$m\overline{AB} + m\overline{BC} + m\overline{AC} = (r_1 + r_1) + (r_2 + r_2) + (r_3 + r_3)$
	$= 2r_1 + 2r_2 + 2r_3 = 2(r_1 + r_2 + r_3)$
	انهي ڪري $\Delta ABC = 2(r_1 + r_2 + r_3)$ جو پيريميٽر

Q.E.D.

مثال 2: ٻن ڪپينڊڙ گولن جا رداس 10cm ۽ 8cm آهن جيڪڏهن انهن جي هڪ مشترڪ زهر جي ڊيگهه 6cm آهي. انهن جي مرڪزن جي وچ وارو فاصلو ڇا آهي.
حل: ٻه گول ڪٿو جن جا مرڪز O ۽ O' آهن ۽ انهن جا رداس ترتيبوار 10cm ۽ 8cm آهن جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. شڪل مان اسان وٽ آهي.



$m\overline{OA} = 10\text{cm}$, $m\overline{O'A} = 8\text{cm}$, $m\overline{AB} = 6\text{cm}$, $m\overline{OO'} = ?$
 جيئن ته P اڏو اڌو ڪري ٿو $\overline{AB}$ کي، تنهنڪري $m\overline{AP} = \frac{1}{2} m\overline{AB} = \frac{6}{2} = 3\text{cm}$
 ۾، فيثاغورث سڌيان جو استعمال ڪندي اسان وٽ آهي.

$$10^2 = 3^2 + (m\overline{OP})^2$$

$$\Rightarrow m\overline{OP} = \sqrt{100 - 9} = \sqrt{91}\text{cm}.$$


$\Delta APO'$ ۾ فيثاغورث سڌيان استعمال ڪندي اسان وٽ آهي.

$$8^2 = 3^2 + (m\overline{O'P})^2$$

$$\Rightarrow m\overline{O'P} = \sqrt{64 - 9} = \sqrt{55}\text{cm}$$


آخر ۾ $m\overline{OO'} = m\overline{OP} + m\overline{O'P} = \sqrt{91} + \sqrt{55} = 16.955\text{cm}$ (تقريباً)

مثال 3: ٻن گولن جون ٻه مشترڪ آڏيون ڇهڻي ليڪون ڊيگهه ۾ برابر هونديون آهن. ثابت ڪريو.



ملي: ٻه گول جن جا مرڪز O ۽ O' آهن، انهن جون ترتيبوار مشترڪ آڏيون ڇهڻي ليڪون $\overline{AB}$ ۽ $\overline{CD}$ آهن.

گهربل: $m\overline{AB} = m\overline{CD}$



جوڙجڪ: ڇهڻي ليڪون $\overline{AB}$ ۽ $\overline{CD}$ ٽپڪي P تي ڪپين ٿيون.
ثابتي:

بيان	دليل
$m\overline{AP} = m\overline{CP}$ (i)	گول جي هڪ ٻاهرين ٽپڪي کان ڇهڻي ليڪون
$m\overline{BP} = m\overline{DP}$ (ii)	گول جي هڪ ٻاهرين ٽپڪي کان ڇهڻي ليڪون
$m\overline{AP} + m\overline{BP} = m\overline{CP} + m\overline{DP}$ (iii)	(i) ۽ (ii) کي جوڙ ڪندي
$\Rightarrow m\overline{AB} = m\overline{CD}$	شڪل ۽ مساوات (iii) مان

Q.E.D

مثال 4: ٻه گول هڪٻئي کي ٻاهريان ڇهن ٿا ۽ انهن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر جي ڊيگهه 7cm آهي. جيڪڏهن هڪڙي جو رداس 3cm آهي ته ٻئي گول جي ايراضي ڇا ٿيندي؟
حل: جيئن ته ٻه گول ٻاهريان ڇهن ٿا انهي ڪري

مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر جي ڊيگهه $r_1 + r_2 =$

$$7 = 3 + r_2$$



$$\Rightarrow r_2 = 7 - 3 = 4\text{cm.}$$

هاڻي $r_1 = 3$ ۽ $r_2 = 4$ جي ڊيگهه $\pi r_2^2 = \pi \cdot (4)^2 = 16\pi\text{cm}^2$ ٿيندي


$$= 16 \left(\frac{22}{7} \right) \text{cm}^2 = 50.286\text{cm}^2 \text{ (تقريباً)}$$

مشق 26.3

- جيڪڏهن ٻن گولن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر جي ڊيگهه، انهن جي رداسن جي جوڙ اُپٽ جي برابر آهي ته پوءِ ثابت ڪريو ته گول ٻاهريان ڇهن ٿا.
- هڪ ٽڪنڊو جنهن جون چوٽيون ٽن گولن جا مرڪز آهن. جيڪڏهن ان ٽڪنڊي جو پيريميٽر گولن جي قطرن جي جوڙ اُپٽ جي برابر آهي ته پوءِ ثابت ڪريو ته ٽي گول، جوڙن ۾ ٻاهريان ڇهن ٿا.
- ٻه يڪسان گول جيڪي ٻاهريان ڇهن ٿا جيڪڏهن انهن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر جي ڊيگهه 12cm آهي ته پوءِ انهن جا رداس ۽ گولن جا گهيرا معلوم ڪريو.
- جيڪڏهن ڏنل گول جي هڪ ٻاهرين ٽپڪي P کان گول تي ٻه ڇهڻي ليڪون $\overline{PA}$ ۽ $\overline{PB}$ آهن جيئن شڪلين ۾ ڏيکاريل آهي ته پوءِ نامعلوم ڪنڊ معلوم ڪريو.



- ثابت ڪري ڏيکاريو ته جيڪڏهن ٻه گول ٻاهريان ڇهن ٿا ته پوءِ ڇهڻ ٽپڪو ان ليڪ ٽڪر تي موجود هوندو جيڪو ٻنهي مرڪزن کي ملائي ٿو.



6. جيڪڏهن 2.5cm رداس واري گول جا ٻه زهه هڪٻئي کان 3.9cm پري آهن ۽ هڪ زهه جي ڊيگهه 1.4cm آهي. ته پوءِ ٻئي زهه جي ڊيگهه لھو.

7. جيڪڏهن ٽي گول جوڙن ۾ ٻاهريان ڇهن ٿا ۽ ٻن گولن جا رداس 4cm ۽ 5cm آهن ته پوءِ ٽئين گول جو رداس معلوم ڪريو جيڪڏهن انهن جي مرڪزن مان ٺهندڙ ٽڪنڊي تي جو پيريميٽر 35cm آهي.

جائزي واري مشق 26

1. درست جواب تي نشان هڻو.


i. جيڪڏهن ڪو ٽپڪو گول کان ٻاهر آهي ته پوءِ ان ٽپڪي مان اسين _____ ڇهڻي ليڪ يا ليڪون ڪڍي سگهون ٿا.

- (a) هڪ (b) ٻه (c) ٽي (d) ڪوبه نه

ii. ڇهڻي ليڪ ۽ رداسي ٽڪر جي وچ واري ڪنڊ جيڪا ان جي ٻاهرين ڇيڙي تي ٺهي ٿي اها _____ آهي.

- (a) 45^0 (b) 60^0 (c) 90^0 (d) 120^0

iii. ڇهڻي واري شڪل ۾، E ۽ C مرڪز وارا گول _____



- (a) اندريان ڇهن ٿا (b) ٻاهريان ڇهن ٿا
(c) نٿا ڇهن (d) يڪسان آهن

iv. ڇهڻي واري شڪل ۾، B ۽ C مرڪزن وارن گولن جو / جا _____ ڇهڻ ٽپڪو / ٽپڪا آهن

- (a) هڪٿو به نه (b) هڪ
(c) ٻه (d) هنن مان ڪوبه نه

v. ڇهڻي واري شڪل ۾، E ۽ C مرڪزن وارن گولن جو / جا _____ ڇهڻ ٽپڪو / ٽپڪا آهن.


- (a) هڪٿو به نه (b) هڪ
(c) ٻه (d) هنن مان ڪوبه نه

vi. ڇهڻي واري شڪل ۾ $\overrightarrow{AB}$ _____ آهي.

- (a) ڇهڻي ليڪ (b) ڪپينڊڙ ليڪ
(c) زهه (d) ڪوبه نه

vii. ڇهڻي واري شڪل ۾، $\overleftrightarrow{CDE}$ _____ آهي.

- (a) ڇهڻي ليڪ (b) ڪپينڊڙ ليڪ
(c) زهه (d) ڪوبه نه



viii. ڇهڻي واري شڪل ۾ _____ ڇهڻ ٽپڪو آهي

- (a) A (b) B (c) C (d) D

ix. گول جي ڪنهن قطر جي ڇيڙن تي ڪڍيل ڇهڻي ليڪون هڪٻئي جي _____ آهن.


- (a) پوروچوٽ (b) عمود (c) ڪپينڊڙ (d) ٻئي (b) ۽ (c)

x. ٻن گولن جي مشترڪ ڇهڻي ليڪن جو وڌ ۾ وڌ تعداد _____ آهي جيڪڏهن اُهي اندران ڇهن ٿيون.

- (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

xi. ٻن گولن جي مشترڪ ڇهڻي ليڪن جو وڌ ۾ وڌ تعداد _____ آهي جيڪڏهن اُهي ٻاهريان ڇهن ٿيون.

- (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3




خلاصو

- ◀ هڪ سڌي ليڪ جيڪا گول کي رڳو هڪ ئي ٽپڪي تي ڇهڻي ان کي ڇهڻي ليڪ چئبو آهي ۽ مشترڪ ٽپڪي کي ڇهڻ ٽپڪو يا ميلاپ وارو ٽپڪو چئبو آهي.
- ◀ هڪ سڌي ليڪ جيڪا گول کي ٻن ٽپڪن تي ڪپي ان کي ڪپيندڙ ليڪ چئبو آهي هڪ گول ۽ ڪپيندڙ ليڪ جي وچ ۾ ميلاپ جا ٻه ٽپڪا هوندا آهن.
- ◀ ڇهڻي ليڪ ٽڪر هڪ اهڙو ليڪ ٽڪر آهي. جيڪو ڇهڻ ٽپڪي کان ڇهڻي ليڪ جي ڪنهن ٻيئي ٽپڪي تائين هوندو آهي.
- ◀ اهو ٽڪندو جيڪو گول جي مرڪز، ڇهڻ ٽپڪي ۽ ڇهڻي ليڪ جي ڪي ٻيئي ٽپڪي کي ملائڻ سان ٺهي ته اهو هميشه گوني ڪند ٽڪندو هوندو آهي.
- ◀ جڏهن ٻه گول اندريان يا ٻاهريان ڇهن ته انهن جي وچ ۾ هڪ مشترڪ ڇهڻي ليڪ ۽ هڪ مشترڪ ميلاپ وارو ٽپڪو هوندو آهي.
- ◀ ٻه گول جيڪي هڪ ٻئي کي نٿا ڇهن انهن کي به مشترڪ ڇهڻي ليڪون هونديون آهن:
 - ◀ ٻاهريون (سڌي طرح) ۽ اندريون (آڏيون) مشترڪ ڇهڻي ليڪون.
 - ◀ ٻن گولن جي سڌي طرح لاڳاپيل ڇهڻي ليڪن جون ڊيگهون برابر هونديون آهن.
 - ◀ ٻن گولن جي آڏيون لاڳاپيل ڇهڻي ليڪن جون ڊيگهون برابر هونديون آهن.
 - ◀ گول جي ڪنهن ٽپڪي تي صرف هڪ ئي ڇهڻي ليڪ ڪڍي سگهجي ٿي.
- ◀ جيڪڏهن ڪا ليڪ گول جي رداسي ٽڪر جي ٻاهرين چيٽري تي عمود آهي ته پوءِ اها ان ٽپڪي تي ڇهڻي ليڪ هوندي.
- ◀ گول جي ڇهڻي ليڪ ۽ مرڪز کي ڇهڻ ٽپڪي سان ملائيندڙ ليڪ ٽڪر هڪٻئي تي عمود هوندا آهن.
- ◀ گول جي ڪنهن ٻاهرين ٽپڪي کان گول تي ڪڍيل ٻه ڇهڻي ليڪون ڊيگهه ۾ برابر هونديون آهن.
- ◀ جيڪڏهن ٻه گول ، ٻاهريان ڇهن ٿا. ته پوءِ انهن جي مرڪزن جي وچ وارو فاصلو انهن جي رداسن جي جوڙ اُپٽ جي برابر آهي.
- ◀ جيڪڏهن ٻه گول اندريان ڇهن ٿا ته پوءِ انهن جي مرڪزن جي وچ وارو فاصلو انهن جي رداسن جي فرق جي برابر آهي.

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هي يونٽ پڙهڻ کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- ❖ هيٺين سڌيانن کي انهن جي شامل نتيجن سان گڏ سمجهڻ ۽ گڏيل مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ انهن جو استعمال ڪن.
- ❖ جيڪڏهن هڪ گول (يا يڪسان گولن) جا ٻه قوس يڪسان آهن ته پوءِ مطابقت رکندڙ زھ برابر هوندا.
- ❖ جيڪڏهن هڪ گول (يا يڪسان گولن) جا ٻه زھ برابر آهن ته پوءِ انهن جا مطابقت رکندڙ قوس (وڏا قوس، ننڍا قوس، اڌ گول) يڪسان هوندا.
- ❖ هڪ گول (يا يڪسان گولن) جا برابر زھ مرڪز (يا مطابقت رکندڙ مرڪزن) تي برابر ڪنڊون ٺاهين ٿا.
- ❖ جيڪڏهن هڪ گول (يا ٻن يڪسان گولن) جا زھ مرڪز (يا مطابقت رکندڙ مرڪزن) تي برابر ڪنڊون ٺاهي / ٺاهين ٿا ته پوءِ زھ برابر هوندا.




تعارف: هن يونٽ ۾ اسين گول جي زه ۽ قوسن سان لاڳاپيل سڌيان پڙهنداسين.

سڌيان 1. 27: جيڪڏهن هڪ گول (يا يڪسان گولن) جا ٻه قوس يڪسان آهن ته پوءِ مطابقت رکندڙ زه برابر هوندا.

اسين سڌيان کي

i. هڪ گول لاءِ ثابت ڪنداسين.

ii. ٻن يڪسان گولن لاءِ ثابت ڪنداسين.



i. هڪ گول لاءِ

مليل: مرڪز O وارو گول جنهن ۾ $\widehat{AB}$ ۽ $\widehat{CD}$ يڪسان قوس آهن

يعني ته $\widehat{AB} \cong \widehat{CD}$. مليل يڪسان قوسن جا مطابقت رکندڙ زه

$\overline{AB}$ ۽ $\overline{CD}$ آهن.

گهربل: $\overline{AB} \cong \overline{CD}$

جوڙجڪ: A, B, C, D سان ٽپڪي O کي ملايو.

ثابتي:

دليل	بيان
ساڳي گول جا رداسي ٽڪر	۾ $\triangle OAB \leftrightarrow \triangle OCD$
ساڳي گول جا رداسي ٽڪر	$\overline{OA} \cong \overline{OC}$
ٻن يڪسان قوسن جون مرڪزي ڪنڊون	$\overline{OB} \cong \overline{OD}$
پ-ڪ-پ موضوع	$m\angle 1 = m\angle 2$
يڪسان ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا	$\therefore \triangle OAB \cong \triangle OCD$
	$\overline{AB} \cong \overline{CD}$

Q.E.D

ii. ٻن يڪسان گولن لاءِ

مليل: ٻه يڪسان گول جن جا مرڪز ترتيبوار O ۽ O' آهن.

انهن گولن جا يڪسان قوس $\widehat{AB}$ ۽ $\widehat{CD}$ آهن جڏهن ته $\widehat{AB} \cong \widehat{CD}$

$\overline{AB}$ ۽ $\overline{CD}$ مطابقت رکندڙ زه آهن.


گهربل: $\overline{AB} \cong \overline{CD}$

جوڙجڪ: O کي A ۽ B سان ملايو. جڏهن ته O' کي C ۽ D سان ملايو.

ثابتي:


دليل	بيان
يڪسان گولن جا رداسي ٽڪر	۾ $\triangle OAB \leftrightarrow \triangle O'CD$
يڪسان گولن جا رداسي ٽڪر	$\overline{OA} \cong \overline{O'C}$
ٻن يڪسان قوسن جون مرڪزي ڪنڊون	$\overline{OB} \cong \overline{O'D}$
پ-ڪ-پ موضوع	$m\angle 1 = m\angle 2$
يڪسان ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا	$\triangle OAB \cong \triangle O'CD$
	$\overline{AB} \cong \overline{CD}$

Q.E.D



سڌيان 27.2 (سڌيان 27.1 جو عڪس)

جيڪڏهن هڪ گول (يا يڪسان گولن) جا ٻه زهه برابر آهن ته پوءِ انهن جا مطابقت رکندڙ قوس (وڏا قوس)، ننڍا قوس، اڌ گول (يا يڪسان هوندا).




مليل: ٻه يڪسان گول جن جا مرڪز ترتيبوار O ۽ O' آهن ۽ انهن جا ٻه زهه $\overline{AC} \cong \overline{PR}$ يڪسان آهن يعني ته $\widehat{AC} \cong \widehat{PR}$
گهريل: $\widehat{AC} \cong \widehat{PR}$
جوڙجڪ: O کي A ۽ C سان ملايو. O' کي P ۽ R سان ملايو.
ثابتي:

دليل	بيان
يڪسان گولن جا رداسي ٽڪر	$\Delta AOC \leftrightarrow \Delta PO'R$
يڪسان گولن جا رداسي ٽڪر	$\overline{OA} \cong \overline{O'P}$
مليل	$\overline{OC} \cong \overline{O'R}$
پ. پ. پ. $\cong$ پ. پ. پ.	$\overline{AC} \cong \overline{PR}$
يڪسان ٽڪنڊن جون مطابقت رکندڙ ڪنڊون	$\Delta OAC \cong \Delta PO'R$
	$m\angle AOC = m\angle PO'R$ (i)
	انهي ڪري
مساوات (i) مان	$\widehat{AC} \cong \widehat{PR}$

Q.E.D


مثال 1: هڪ گول جي گهيري تي هڪ ٽپڪو P رداسي ٽڪرن $\overline{OA}$ ۽ $\overline{OB}$ کان هڪجيتري فاصلي تي آهي. ثابت ڪريو ته $m\widehat{AP} = m\widehat{BP}$
حل:



مليل: $\overline{AB}$ زهه آهي ان گول جو جنهن جو مرڪز O آهي، گول جي گهيري جو هڪ ٽپڪو P رداسي ٽڪرن $\overline{OA}$ ۽ $\overline{OB}$ کان هڪجيتري فاصلي تي آهي.
 يعني ته $m\widehat{PR} = m\widehat{PS}$
گهريل: $m\widehat{AP} = m\widehat{BP}$
جوڙجڪ: O کي P سان ملايو. $m\angle 1$ ۽ $m\angle 2$ کي ظاهر ڪريو.
ثابتي:


دليل	بيان
مشتريڪ پاسو	گوني ڪنڊ ٽڪنڊن
مليل	$m\widehat{OP} = m\widehat{OP}$ ۽ $\Delta OPR \leftrightarrow \Delta OPS$
ه. پ. ه. $\cong$ ه. پ.	$m\widehat{PR} = m\widehat{PS}$
يڪسان ٽڪنڊن جون مطابقت رکندڙ ڪنڊون	$\therefore \Delta OPR \cong \Delta OPS$
(i) مان	(i) $m\angle 1 = m\angle 2$ انهي ڪري
يڪسان قوسن جي وصف مطابق	$\Rightarrow \widehat{AP} \cong \widehat{BP}$
	$m\widehat{AP} = m\widehat{BP}$ اهڙي طرح

Q.E.D



سڌيان 27.3: هڪ گول (يا يڪسان گولن) جا برابر زهه مرکز (يا مطابقت رکندڙ مرڪزن) تي برابر ڪنڊون ٺاهين ٿا. اسين اهو سڌيان ثابت ڪنداسين:

(i) هڪ گول لاءِ (ii) ٻن يڪسان گولن لاءِ



(i) هڪ گول لاءِ
مليل: هڪ گول جنهن جو مرڪز O آهي ان جا ٻه زهه $\overline{AB}$ ۽ $\overline{PR}$ يڪسان آهن.

يعني ته $\overline{AB} \cong \overline{PR}$


گهريل: $m\angle AOB = m\angle POR$

جوڙجڪ: O کي A ۽ B سان ملايو ۽ O کي P ۽ R سان پڻ ملايو.

ثابتي:

دليل	بيان
مليل	$\triangle AOB \leftrightarrow \triangle POR$
ساڳي گول جا رداسي ٽڪر	$\overline{AB} \cong \overline{PR} \quad \dots (i)$
ساڳي گول جا رداسي ٽڪر	$\overline{OB} \cong \overline{OR} \quad \dots (ii)$
پ. پ. پ. $\cong$ پ. پ. پ.	$\overline{OA} \cong \overline{OP} \quad \dots (iii) \quad \&$
يڪسان ٽڪنڊن جون مطابق رکندڙ ڪنڊون	$\triangle AOB \cong \triangle POR$ $m\angle AOB = m\angle POR$

Q.E.D



(ii) ٻن يڪسان گولن لاءِ

مليل: ٻه يڪسان گول جن جا مرڪز ترتيبوار O ۽ O' آهن.

۽ $m\angle AOC = m\angle PO'R$ جڏهن ته $\overline{AC}$ ۽ $\overline{PR}$ گولن جا زهه آهن.

گهريل: $m\angle AOC = m\angle PO'R$


جوڙجڪ: قوس PR تي هڪ ٽپڪو S ڪٽو ۽ S کي P ۽ O' ڏانهن

سان ملايو اهڙي طرح جو $\angle AOC \cong \angle PO'S$

ثابتي:

دليل	بيان
جوڙجڪ	فرض ڪريو ته $m\angle AOC \neq m\angle PO'R$
برابر مرڪزي ڪنڊن جا قوس	پر $m\angle AOC = m\angle PO'S$
سڌيان (i) مان	$\therefore \widehat{AC} \cong \widehat{PS} \quad (i)$
مليل	$\therefore m\widehat{AC} = m\widehat{PS} \quad (ii)$
(ii) ۽ (iii) جو استعمال ڪندي	پر $m\widehat{AC} = m\widehat{PR} \quad (iii)$
ڇاڪاڻ ته P مشترڪ ٽپڪو آهي	$\therefore m\widehat{PR} = m\widehat{PS}$
اسانجو مفروضو غلط آهي.	اهو تڏهن ئي ممڪن ٿيندو جڏهن R نه ڪنڊڙ هجي S تي
	$\Rightarrow m\angle AOC = m\angle POR$

Q.E.D



شامل نتيجو 1:


يڪسان گولن ۾ يا ساڳئي گول ۾ جيڪڏهن مرڪزي ڪنڊون برابر آهن ته پوءِ مطابقت رکندڙ سيڪٽر برابر هوندا

شامل نتيجو 2:

يڪسان گولن يا ساڳئي گول ۾، جيڪڏهن ٻه زهه برابر نه آهن ته پوءِ ان سان مطابقت رکندڙ قوس غير مساوي مرڪزي ڪنڊون ناهيندا.

مثال 1:

ثابت ڪريو ته گول جي مرڪزي ڪنڊ جو اندريون اڌ ڪنڊڙ مطابقت رکندڙ قوس کي اڌو اڌ ڪندو.



مليل:

هڪ گول جنهن جو مرڪز O آهي. مرڪزي ڪنڊ AOB جو اندريون اڌ ڪنڊڙ $\overline{OP}$ آهي.

يعني ته $\angle 1 \cong \angle 2$

گهربل:

$\widehat{AP} \cong \widehat{PB}$


جوڙجڪ:

$\overline{AP}$ ۽ $\overline{BP}$ ڪيو.

ثابتي:

دليل	بيان
ساڳي گول جا رڌاس	$\triangle OAP \leftrightarrow \triangle OBP$ ۾
مليل	$m\widehat{OA} = m\widehat{OB}$
مشتڪ پاسو	$m\angle 1 = m\angle 2$
پ. ڪ. پ. مفروضو	$m\widehat{OP} = m\widehat{OP}$ ۽
يڪسان ٽڪنڊن جا	$\therefore \triangle OAP \cong \triangle OBP$
مطابقت رکندڙ پاسا	انهي ڪري $\overline{AP} \cong \overline{BP}$
برابر زهه جا مطابقت رکندڙ قوس	$\Rightarrow \widehat{AP} \cong \widehat{BP}$

Q.E.D



مثال 2:


ثابت ڪريو ته ڪنهن گول ۾، جيڪڏهن ٻه قطر هڪٻئي تي عمود هجن ته پوءِ انهن جي چيڙن کي ملائيندڙ ليڪون چورس ٺاهينديون.

مليل: $\overline{QS}$ ۽ $\overline{PR}$ ان گول جا عمودي قطر آهن جنهن جو مرڪز O آهي.

انهي ڪري PQRS هڪ چوڪنڊو آهي.

گهربل: PQRS هڪ چورس آهي.


جوڙجڪ: ڪنڊن کي نالا ڏيو جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي: $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4, \angle 5, \angle 6$.



ثابتي:

دليل	بيان
مليل	$\overline{QS}$ ۽ $\overline{PR}$ مرڪز O واري گول جا ٻه عمودي قطر آهن.
قطر هڪٻئي تي عمود آهن	$m\angle 1 = m\angle 2 = m\angle 3 = m\angle 4 = 90^\circ$
برابر مرڪزي ڪنڊن جا قوس	$m\widehat{PQ} = m\widehat{QR} = m\widehat{RS} = m\widehat{SP} \dots (i)$
يڪسان قوسن جا مطابقت رکندڙ زھ	$m\overline{PQ} = m\overline{QR} = m\overline{RS} = m\overline{SP} \dots (ii)$
ساڳي گول جا رداسي ٽڪر	گوني ڪنڊ ٽڪنڊي $\triangle POS$ ۾ $m\overline{PO} = m\overline{OS} \dots (iii)$
(iii) مان $\triangle POS$ ٻيڙ پاسو گوني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي.	$\triangle POS$ ٻيڙ پاسو گوني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي $m\angle 5 = 45^\circ \dots (iv)$
مٿين طريقي سان	ساڳي ريت $\triangle POQ$ ٻيڙ پاسو گوني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي. $m\angle 6 = 45^\circ \dots (v)$
ڪنڊن جي جوڙ وارو موضوع	هاڻي $m\angle P = m\angle 5 + m\angle 6$ $m\angle P = 45^\circ + 45^\circ$ $m\angle P = 90^\circ \dots (vi)$
(iv) ۽ (v) مان	يا ساڳي ريت $m\angle Q = m\angle R = m\angle S = 90^\circ \dots (vii)$
مٿين طريقي سان	PQRS هڪ چورس آهي
(ii), (vi) ۽ (vii) جو استعمال ڪندي	


Q.E.D



سٽيان 27.4

جيڪڏهن هڪ گول (يا ٻن يڪسان گولن) جا زهه مرڪز (يا مطابقت رکندڙ مرڪزن) تي برابر ڪنڊون ٺاهي/ ٺاهين ٿا ته ٻو زهه برابر هوندا.

(a) هڪ گول لاءِ



مليل: هڪ گول جنهن جو مرڪز O آهي. $\overline{AB}$ ۽ $\overline{PR}$ ان جا ٻه زهه آهن.

ٻئي زهه برابر مرڪزي ڪنڊون $\angle AOB$ ۽ $\angle POR$ ٺاهين ٿا

يعني ته $\angle POR \cong \angle AOB$

گهربل: $\overline{AB} \cong \overline{PR}$


جوڙجڪ: O کي P ۽ R سان ملايو ۽ O کي A ۽ B سان پڻ ملايو.

ثابتي:

دليل	بيان
ساڳي گول جا رداسي ٽڪر	$\triangle PQR \leftrightarrow \triangle AOB$
ساڳي گول جا رداسي ٽڪر	$\overline{OR} \cong \overline{OB}$ (i)
مليل	$\overline{OP} \cong \overline{OA}$ (ii)
پ. ڪ. پ. مفروضو	$\angle POR \cong \angle AOB$ (iii) ۽
يڪسان ٽڪنڊن جا ٻه مطابقت رکندڙ پاسا	$\triangle PQR \cong \triangle AOB$
	$\overline{AB} \cong \overline{PR}$

Q.E.D

(b) ٻن يڪسان گولن لاءِ



مليل: ٻه يڪسان گول جن جا مرڪز O ۽ O' آهن.

$\overline{AC}$ ۽ $\overline{PR}$ ٻه زهه آهن جيڪي مرڪزن تي برابر

ڪنڊون ٺاهين ٿا. يعني ته $\angle AOC \cong \angle PO'R$

گهربل: $m\overline{AC} = m\overline{PR}$

ثابتي:



دليل	بيان
يڪسان گولن جا رداسي ٽڪر	$\triangle OAC \leftrightarrow \triangle O'PR$
مليل	$\overline{OA} \cong \overline{O'P}$
يڪسان گولن جا رداسي ٽڪر	$\angle AOC \cong \angle PO'R$
پ. ڪ. پ. مفروضو	$\overline{OC} \cong \overline{O'R}$
يڪسان ٽڪنڊن جا ٻه مطابقت رکندڙ پاسا	$\therefore \triangle OAC \cong \triangle O'PR$
	$m\overline{AC} = m\overline{PR}$ انهي ڪري

Q.E.D



مشق 27.1

1. ثابت ڪريو ته، هڪ گول ۾ ٻن پورچوت ۽ برابر زهن جا قوس برابر هوندا.
2. ثابت ڪريو ته ٻن يڪسان گولن ۾ ٻن برابر مرڪزي ڪنڊن جا قوس برابر هوندا.
3. ڀر واري شڪل ۾، O گول جو مرڪز آهي. x ۽ y جو ملهه لھو.



4. ڀر واري شڪل ۾، $m\angle PQR = 35^\circ$ ۽ $m\angle PRQ = 31^\circ$ جو ملهه لھو.



5. ڀر واري شڪل ۾، O گول جو مرڪز آهي. $m\angle AOB = 120^\circ$ ۽ $m\angle BCD = 85^\circ$ جو ملهه لھو.




6. ڀر واري شڪل ۾، $\overline{AB}$ گول جو قطر آهي ۽ $m\angle DAB = 30^\circ$ جو ملهه لھو.

جائزي واري مشق 27

1. درست جواب تي نشان هڻو.

- i. جيڪڏهن هڪ زه 60° جي مرڪزي ڪنڊ ٺاهي ٿو ته پوءِ زه ۽ رداسي ٽڪر _____ آهن.
 - (a) پورو چوٽ
 - (b) عمود
 - (c) يڪسان
 - (d) غير يڪسان
- ii. جيڪڏهن هڪ قوس 45° جي مرڪزي ڪنڊ ٺاهي ٿو ته پوءِ مطابقت رکندڙ زه _____ جي ڪنڊ مرڪز تي ٺاهيندو.
 - (a) 15°
 - (b) 30°
 - (c) 45°
 - (d) 60°
- iii. جيڪڏهن گول جا ٻه زه، ٻه يڪسان مرڪزي ڪنڊون ٺاهين ٿا ته اهي _____ آهن.
 - (a) غير يڪسان
 - (b) عمود
 - (c) يڪسان
 - (d) ڪوبه نه



- iv. گول جي يڪسان مرڪزي ڪنڊن جي سامهون وارا قوس _____ آهن.
- (a) پورچوٽ (b) يڪسان (c) عمود (d) ڪوبه نه
- v. هڪ 6cm ڊگهو زھ 60° جي مرڪزي ڪنڊ ٺاهي ٿو. ان گول جو رداسي ٽڪر _____ ڊگهو آهي.
- (a) 4cm (b) 6cm (c) 5cm (d) 8cm
- vi. ڪنهن گول جو هڪ زھ جيڪو 180° جي مرڪزي ڪنڊ ٺاهي ٿو. ان زھ جي ڊيگهه هميشه _____ هوندي.
- (a) رداسي ٽڪر جي برابر (b) رداسي ٽڪر کان ننڍي (c) رداسي ٽڪر کان بيٺي (d) رداسي ٽڪر جو اڌ
- viii. جيڪڏهن ڪنهن گول جي زھ ۽ رداسي ٽڪر جون ڊيگهون برابر آهن ته پوءِ زھ جي ٺاهيل مرڪزي ڪنڊ _____ ٿيندي.
- (a) 60° (b) 75° (c) 90° (d) 45°
- ix. گول جي ٻن قوسن مان جيڪڏهن هڪ قوس 30° جي مرڪزي ڪنڊ ٺاهي ٿو ته ٻيءَ قوس _____ مرڪزي ڪنڊ ٺاهيندو.
- (a) 60° (b) 90° (c) 75° (d) 30°
- x. قطر گول کي _____ حصن ۾ ورهائي ٿو.
- (a) ٻه (b) ٽي (c) چار (d) اهي سڀ ئي

خلاصو

- ◀ گول يڪسان هوندا جيڪڏهن انهن جا رداس برابر هجن.
- ◀ گول جا برابر زھ مرڪز تي برابر مرڪزي ڪنڊون ٺاهيندا.
- ◀ گول جي ڪن ٻن ٽپڪن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر کي گول جو زھ چئبو آهي.
- ◀ گول ايراضي جو اهو حصو جيڪو هڪ زھ ۽ هڪ قوس سان گهيريل هجي ان کي گول جو سيگمينٽ چئبو آهي.
- ◀ هڪ گول رستي تي حرڪت ڪندڙ ٽپڪي سان ڪڍيل ڏنگي ليڪ کي گول جي گهيرو چئبو آهي.
- ◀ گول جي گهيرو جي ڪنهن حصي کي گول جو قوس چئبو آهي.
- ◀ گول جي مرڪز مان ڪڍيل ليڪ جيڪا ڪنهن زھ کي اڌو اڌ ڪري ته اها ليڪ ان زھ تي عمود هوندي آهي.
- ◀ ڪنهن گول جي مرڪز مان ڪڍيل ليڪ جيڪا هڪ زھ تي عمود آهي ته اها ان زھ کي اڌو اڌ ڪندي آهي.
- ◀ جيڪڏهن هڪ گول (يا يڪسان گولن) جا ٻه قوس برابر هجن ته پوءِ انهن سان مطابقت رکندڙ زھ برابر هوندا.
- ◀ جيڪڏهن هڪ گول (يا يڪسان گولن) جا ٻه زھ برابر آهن ته پوءِ انهن سان مطابقت رکندڙ قوس وڏا قوس، ننڍا قوس، اڌ گول (يڪسان هوندا).
- ◀ هڪ گول (يا يڪسان گولن) جا برابر زھ مرڪز (يا واسطيدار مرڪزن) تي برابر ڪنڊون ٺاهيندا.
- ◀ جيڪڏهن هڪ گول (يا ٻن گولن) جا ٻه زھ مرڪز (يا واسطيدار مرڪزن) تي برابر ڪنڊون ٺاهين ٿا ته پوءِ اهي زھ برابر هوندا.




گول جي سيگمينٽ ۾ ڪنڊون

ANGLES IN A SEGMENT A CIRCLE

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هي يونٽ پڙهڻ کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- هيٺيان سڌيان انهن جي شامل نتيجن سان گڏ سمجهڻ ۽ گڏيل مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ انهن جو استعمال ڪندا.
- هڪ گول جي ننڍي قوس جي مرڪزي ڪنڊ جي ماپ مطابقت رکندڙ وڏي قوس جي ان تي ٺهيل ڪنڊ کان ٻيڻي آهي.
- گول جي سيگمينٽ ۾ ڪي به ٻه ڪنڊون برابر هونديون آهن.
- ❖ اڌ گول ۾ ڪنڊ هميشه گوني ڪنڊ هوندي آهي.
- ❖ اڌ گول کان وڏي سيگمينٽ ۾ ڪنڊ هميشه گوني ڪنڊ کان ننڍي هوندي آهي.
- ❖ اڌ گول کان ننڍي سيگمينٽ ۾ ڪنڊ هميشه گوني ڪنڊ کان وڏي هوندي آهي.
- ❖ ڪنهن به گهيрил چوڪنڊي جون سامهون واريون ڪنڊون سڀليمينٽري آهن.




28.1 گول جي سيگمينٽ ۾ ڪنڊ (Angle in a segment of a circle):

اسين اڳيئي گول سان لاڳاپيل ڪيتريون ئي اصطلاحون پڙهي چڪا آهيون جهڙوڪ زهه، ننڍو قوس ۽ وڏو قوس وغيره. هاڻي، گول جي سيگمينٽ وارين ڪنڊن سان لاڳاپيل سڌيان سمجهڻ لاءِ اسان کي ڪجهه وڌيڪ اصطلاحن کي بيان ڪرڻو پوندو.

وصفون :


i. گول جو سيڪٽر (Sector of a circle):

گول جو سيڪٽر، گول ايراضي جو اهو حصو آهي جيڪو ٻن رداسي ٽڪرن ۽ ان قوس سان گهيريل هوندو آهي. جيڪو اهي ڪپين ٿا. ڏنل شڪل ۾، مرڪز O واري گول جو سيڪٽر AOB آهي.




ii. گول جو سيگمينٽ (Segment of a circle):

گول جو سيگمينٽ گول ايراضي جو اهو حصو آهي. جيڪو هڪ قوس ۽ ان جي زهه سان گهيريل هوندو آهي. هڪ سيگمينٽ کي وڏو سيگمينٽ (Major segment) ڪوٺبو جيڪڏهن ان جو قوس وڏو قوس هجي ساڳي ريت هڪ سيگمينٽ کي ننڍو سيگمينٽ (Minor Segment) ڪوٺبو جيڪڏهن ان جو قوس ننڍو قوس هجي. ڏنل شڪل ۾ ACB ننڍو سيگمينٽ ۽ ADB وڏو سيگمينٽ آهي.



iii. گول جي سيگمينٽ ۾ ڪنڊ (Angle in a segment of circle):


گول جي سيگمينٽ ۾ ڪنڊ اها ڪنڊ هوندي آهي جيڪا گول جي سيگمينٽ جو زهه، سيگمينٽ جي قوس جي ڇيڙن کانسواءِ ان جي ڪنهن ٻئي ٽڪري تي ٺاهيندو آهي. ڏنل شڪل ۾ ننڍي سيگمينٽ ۾ ڪنڊ $\angle ACB$ آهي. جڏهن ته هڪ اها ڪنڊ آهي. جيڪا وڏي سيگمينٽ ADB ۾ آهي.




نوٽ: گول جي سيگمينٽ ۾ ڪنڊ کي سيگمينٽ جي قوس جي گهيريل ڪنڊ يا سولائي خاطر قوس سان ٺهيل ڪنڊ به چئبو آهي.

iv. هڪ قوس جي مرڪزي ڪنڊ (Central angle of an arc):

ڪنهن گول جي هڪ قوس جي مرڪزي ڪنڊ اها ڪنڊ هوندي آهي جيڪا گول جي مرڪز تي اهو قوس ٺاهيندو آهي. شڪل ۾، قوس AB جي مرڪزي ڪنڊ $\angle AOB$ آهي.



➤ شامل نتيجن سان گڏ هيٺين سڌيانن کي سمجهڻ ۽ گڏيل مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ انهن کي استعمال ڪرڻ:



ستيان 28.1:

هڪ گول جي ننڍي قوس جي مرڪزي ڪنڊ جي ماپ مطابقت رکندڙ وڏي قوس جي ان تي ٺهيل ڪنڊ کان ٻيڻي آهي.

يا


ننڍي قوس جي مرڪزي ڪنڊ مطابقت رکندڙ وڏي قوس جي گھيريل ڪنڊ کان ماپ ۾ ٻيڻي آهي.

ملي: مرڪز O واري گول ۾ ننڍي قوس AB جي مرڪزي ڪنڊ آهي. مطابقت

رڪندڙ وڏي قوس ACB جي گھيريل ڪنڊ $\angle ACB$ آهي.

گھربل: $m\angle AOB = 2m\angle ACB$

جوڙجڪ: $\overline{CO}$ ڪيو ۽ ان کي گول جي ٽپڪي D تائين وڌايو.



ثابتي:

دليل	بيان
ساڳي گول جا رداسي ٽڪر	۾ $\triangle AOC$, $\overline{OA} \cong \overline{OC}$
يڪسان پاسن جون سامهون واريون ڪنڊون.	$m\angle OAC = m\angle OCA \dots (i)$
ٽڪنڊي جي ٻاهرين ڪنڊ: اندرين ڪنڊن جي جوڙ اُٻت آهي.	$m\angle AOD = m\angle OAC + m\angle OCA$
مساوات (i) جو استعمال ڪندي	$= 2m\angle OCA \dots (ii)$
ساڳي طريقي سان	$m\angle BOD = 2m\angle OCB \dots (iii)$
ڪنڊن جي جوڙ وارو موضوع	$m\angle AOB = m\angle AOD + m\angle BOD$
(ii) ۽ (iii) جو استعمال ڪندي	$= 2m\angle OCA + 2m\angle OCB$
عام جزو 2 ٻاهر ڪڍيندي.	$= 2(m\angle OCA + m\angle OCB)$
ڪنڊن جي جوڙ وارو موضوع	$m\angle AOB = 2m\angle ACB$


Q.E.D

شامل نتيجو 1:

وڏي قوس جي مرڪزي ڪنڊ جي ماپ مطابقت رکندڙ ننڍي قوس جي گھيريل ڪنڊ کان ٻيڻي آهي.

شامل نتيجو 2:

اڌ گول جي مرڪزي ڪنڊ جي ماپ مطابقت رکندڙ اڌ گول جي گھيريندڙ ڪنڊ کان ٻيڻي آهي.



مثال 1: ڀر واري شڪل ۾، ٽپڪو O گول جو مرڪز آهي. x جي قيمت لھو جيڪڏھن $m\angle AOB = 80^\circ$ ۽

$$m\angle OBC = 25^\circ$$

حل: شڪل ۾ AB جي مرڪزي ڪنڊ $\angle AOB$ آهي ۽ مطابقت رکندڙ $\widehat{ACB}$ جي گھيريل ڪنڊ $\angle ACB$ آهي.

$\therefore$ AB جي مرڪزي ڪنڊ مطابقت رکندڙ $\widehat{ACB}$ جي گھيريل ڪنڊ کان ٻيڻي آهي.

$$\therefore m\angle AOB = 2m\angle ACB$$

$$يعني\ 80^\circ = 2m\angle ACB$$

$$m\angle ACB = 40^\circ$$

جيئن ته اسان کي خبر آهي ته هڪ ٽپڪي جي چوڌاري سڀني ڪنڊن جي جوڙ اُٽ 360° آهي. تنهنڪري

$$80^\circ + y = 360^\circ$$

$$\Rightarrow y = 280^\circ$$

چوڪنڊي AOBC ۾

$$x + y + 25^\circ + m\angle ACB = 360^\circ$$

$$\Rightarrow x + 280^\circ + 25^\circ + 40^\circ = 360^\circ$$

$$\Rightarrow x + 345^\circ = 360^\circ$$


$$x = 15^\circ$$

سڌيان 2.2: گول جي سيگمينٽ ۾ ڪي به ٻه ڪنڊون برابر هونديون آهن.

مليل: مرڪز O واري گول جي ساڳئي سيگمينٽ APQB ۾ $\angle APB$ ۽ $\angle AQB$ ٻه ڪنڊون آهن.

گھريل: $m\angle APB = m\angle AQB$



چوڙجڪ: O کي A ۽ B سان ملايو ته جيئن $\widehat{ACB}$ جي مرڪزي ڪنڊ $\angle AOB$ هجي. **ثابتي:**



دليل	بيان
چوڙجڪ مليل	$\widehat{ACB}$ جي مرڪزي ڪنڊ $\angle AOB$ آهي. $\angle APB$ ۽ $\angle AQB$ هڪ ئي سيگمينٽ جون ڪنڊون آهن هاڻي
وڏي قوس جي مرڪزي ڪنڊ مطابقت رکندڙ ننڍي قوس جي گھيريل ڪنڊ کان ٻيڻي آهي.	$m\angle AOB = 2m\angle APB$
ساڳي طريقي سان	$m\angle AOB = 2m\angle AQB$
متعدي خاصيت سان	$2m\angle APB = 2m\angle AQB$
ٻنهي پاسن کي 2 سان ونڊيندي	$m\angle APB = m\angle AQB$

Q.E.D

شامل نتيجو 1: گول جي وڏي قوس ۾ ڪي به ٻه ڪنڊون برابر هونديون آهن.



مثال: ڀر واري شڪل ۾ مرڪز O واري گول جي ساڳئي سيگمينٽ APQB ۾ $\angle P$ ۽ $\angle Q$ ۾ ڪنڊون آهن x يا $m\angle ABQ$ جي قيمت لھو جڏھن تہ ڪنڊن جون ماپون شڪل ۾ ڏيکاريل آهن.

حل:

$\angle P$ ۽ $\angle Q$ ساڳئي سيگمينٽ تي ڪنڊون آهن

$$m\angle Q = m\angle P \quad \therefore$$

$$(\because m\angle P = 50^\circ) \quad m\angle Q = 50^\circ \quad \text{يعني تہ}$$

۾ $\triangle ABQ$


$$m\angle A + m\angle Q + x = 180^\circ$$

$$30^\circ + 50^\circ + x = 180^\circ \quad \text{يعني تہ}$$

$$\Rightarrow x = 100^\circ$$


مشق 28.1

شڪل 1




1. شڪل 1 ۾، ٽپڪو O گول جو مرڪز آھي x جي قيمت لھو جڏھن تہ $m\angle C = 30^\circ$

شڪل 2



2. شڪل 2 ۾، ٽپڪو O گول جو مرڪز آھي. x جي قيمت لھو جڏھن تہ $m\angle Q = 50^\circ$


شڪل 3




3. شڪل 3 ۾ ٽپڪو O گول جو مرڪز آھي. $x + y$ جو ملھ لھو جڏھن تہ $m\angle D = 30^\circ$

4. ٻن يڪسان گولن جي ٻن يڪسان وڏي قوسن جون گھيريل ڪنڊون يڪسان هونديون آهن اھو ثابت ڪريو.

5. ثابت ڪريو تہ ڪنھن گول ۾ وڏي قوس ۽ ان سان مطابقت رکندڙ ننڍي قوس جون گھيريل ڪنڊون برابر هونديون آهن.



سڌيان (a) 28.3:



اڌ گول ۾ ڪنڊ هميشه گوني ڪنڊ هوندي آهي.

اڌ گول جي گهيريل ڪنڊ هميشه گوني ڪنڊ هوندي آهي.

مليل: مرڪز O واري گول ۾ اڌ گول ADB جي مرڪزي ڪنڊ $\angle AOB$ آهي.

ان سان مطابقت رکندڙ اڌ گول جي گهيريل ڪنڊ $\angle ACB$ آهي.


گهيريل: $\angle ACB$ هڪ گوني ڪنڊ آهي.

ثابتي:

دليل	بيان
اڌ گول جي مرڪزي ڪنڊ	$m\angle AOB = 180^\circ \dots(i)$
اڌ گول جي مرڪزي ڪنڊ مطابقت رکندڙ اڌ گول جي گهيريل ڪنڊ کان ٻيڻي آهي	هاڻي $m\angle AOB = 2m\angle ACB$
مساوات (i) جو استعمال ڪندي	$\Rightarrow 2m\angle ACB = 180^\circ$
ٻنهي پاسن کي 2 سان ونڊيندي	يا $m\angle ACB = 90^\circ$
گوني ڪنڊ جي وصف مطابق	يعني ته $\angle ACB$ گوني ڪنڊ آهي.

Q.E.D

سڌيان (b) 28.3:



اڌ گول کان وڌي سيگمينٽ ۾ ڪنڊ هميشه گوني ڪنڊ کان ننڍي هوندي آهي.

وڌي قوس ۾ گهيريل ڪنڊ سوڙهي هوندي آهي.

مليل: مرڪز O واري گول ۾، اڌ گول کان وڌي سيگمينٽ ACB ۾

ڪنڊ $\angle ACB$ آهي.

مطابقت رکندڙ ننڍي قوس AB جي مرڪزي ڪنڊ $\angle AOB$ آهي.

گهيريل: $\angle ACB$ هڪ سوڙهي ڪنڊ آهي.


ثابتي:

دليل	بيان
ننڍي قوس جي مرڪزي ڪنڊ	$m\angle AOB < 180^\circ \dots(i)$
ننڍي قوس جي مرڪزي ڪنڊ مطابقت رکندڙ وڌي قوس جي گهيريل ڪنڊ کان ٻيڻي آهي.	هاڻي $m\angle AOB = 2m\angle ACB$
مساوات (i) کي استعمال ڪندي	$\Rightarrow 2m\angle ACB < 180^\circ$
ٻنهي پاسن کي 2 سان ونڊيندي	$m\angle ACB < 90^\circ$
سوڙهي ڪنڊ جي وصف مطابق	يعني $\angle ACB$ هڪ سوڙهي ڪنڊ آهي.

Q.E.D



سڌيان (c) 28.3:



اڌ گول کان ننڍي سيگمينٽ ۾ ڪنڊ هميشه گوني ڪنڊ کان وڏي هوندي آهي.

يا
ننڍي قوس ۾ گهيريل ڪنڊ هميشه ويڪري ڪنڊ هوندي آهي.


ملي: مرڪز O واري گول ۾، ننڍي قوس AB جي گهيريل ڪنڊ $\angle ACB$ آهي. مطابق رکندڙ وڏي قوس ADB جي مرڪزي ڪنڊ $\angle AOB$ آهي.

گهيريل: $\angle ACB$ هڪ ويڪري ڪنڊ آهي

ثابتي:

دليل	بيان
وڏي قوس جي مرڪزي ڪنڊ	$m\angle AOB > 180^\circ$... (i)
وڏي قوس جي مرڪزي ڪنڊ مطابق رکندڙ ننڍي قوس جي گهيريل ڪنڊ کان ٻيئي آهي.	هاڻي $m\angle AOB = 2m\angle ACB$
مساوات (i) جو استعمال ڪندي	$\Rightarrow 2m\angle ACB > 180^\circ$
ٻنهي پاسن کي 2 سان ونڊيندي	يا $m\angle ACB > 90^\circ$
ويڪري ڪنڊ جي وصف مطابق	يعني $\angle ACB$ ويڪري ڪنڊ آهي.

Q.E.D



شکل 1

مثال: شکل 1 ۾، ٽپڪو O گول جو مرڪز آهي. x ۽ y جون قيمتون لھو

جيڪڏهن $m\angle BCO = 30^\circ$ ۽ $\overline{AC}$ ۽ $\overline{BD}$ قطر آهن.

حل:

$\overline{BD}$ قطر آهي

$\therefore$

$\angle BCD$ اڌ گول جي گهيريل ڪنڊ آهي.

$\therefore$

انهي ڪري $m\angle BCD = 90^\circ$

$\Rightarrow x + 30^\circ = 90^\circ$

$\Rightarrow x = 60^\circ$

$\overline{AC}$ قطر آهي ۽ اڌ گول جي گهيريل ڪنڊ $\angle CBA$ آهي.

انهي ڪري $m\angle CBA = 90^\circ$

۾ $\triangle ABC$,

$30^\circ + m\angle CBA + y = 180^\circ$

$\Rightarrow 30^\circ + 90^\circ + y = 180^\circ$


$\Rightarrow y = 60^\circ$

گهيريل چوڪنڊو يا مدار چوڪنڊو:

هڪ چوڪنڊي کي گهيريل چوڪنڊو يا مدار چوڪنڊو چئبو جيڪڏهن

ان جون سڀ چوٽيون ساڳي گول تي موجود هجن. شکل ۾ ABCD

هڪ مدار چوڪنڊو آهي.






سڌيان 28.4: گول ۾ ڪنهن به گهيрил چوڪنڊي جون سامهون واريون ڪنڊون سڀليمنٽري آهن.

ملي: مرڪز O واري گول ۾ PQRS گهيريل چوڪنڊو آهي.

گهيڙيل:

$$m\angle Q + m\angle S = 180^\circ$$

$$m\angle P + m\angle R = 180^\circ$$



جوڙجڪ: $\overline{OP}$ ۽ $\overline{OR}$ کڻو ته جيئن $\angle POR$ يا $\angle x$ ، $\widehat{PR}$ جي مرڪزي ڪنڊ آهي ۽



$\angle y$ مطابقت رکندڙ $\widehat{PQR}$ جي مرڪزي ڪنڊ آهي.

ثابتي:

دليل	بيان
وصف مطابق جوڙجڪ وڏي قوس جي مرڪزي ڪنڊ مطابقت رکندڙ ننڍي قوس جي گهيڙيل ڪنڊ کان ٻيڻي هوندي آهي. ٻنهي پاسن کي 2 سان وڌيندي	$\widehat{PR}$ جي گهيڙيل ڪنڊ $\angle a$ يا $\angle S$ آهي مطابقت رکندڙ $\widehat{PQR}$ جي مرڪزي ڪنڊ $\angle y$ آهي $m\angle y = 2m\angle a$ $\Rightarrow m\angle a = \frac{1}{2}m\angle y \dots (i)$
وصف مطابق جوڙجڪ ننڍي قوس جي مرڪزي ڪنڊ مطابقت رکندڙ وڏي قوس جي گهيڙيل ڪنڊ کان ٻيڻي هوندي آهي.	هاڻي $\angle Q$ يا $\angle b$ وڏي قوس $\widehat{PQR}$ جي گهيڙيل ڪنڊ آهي. ۽ مطابقت رکندڙ $\widehat{PR}$ جي مرڪزي ڪنڊ $\angle x$ آهي. $m\angle x = 2m\angle b$ انهيءَ ڪري $m\angle b = \frac{1}{2}m\angle x \dots (ii)$ يعني هاڻي
مساوات (i) ۽ (ii) کي جوڙ ڪرڻ سان عام جزو $\frac{1}{2}$ ٻاهر ڪڍندي هڪ ٽپڪي جي چوڌاري سڀني ڪنڊن جي جوڙ اُٻت 360° آهي.	$m\angle a + m\angle b = \frac{1}{2}m\angle x + \frac{1}{2}m\angle y$ $= \frac{1}{2}(m\angle x + m\angle y)$ $= \frac{1}{2}(360^\circ)$ يعني يا ساڳي ريت $m\angle a + m\angle b = 180^\circ$ $m\angle Q + m\angle S = 180^\circ$ $m\angle P + m\angle R = 180^\circ$
$\angle b \cong \angle Q$ ۽ $\angle a \cong \angle S \therefore$ ساڳي طريقي سان	

Q.E.D

شامل نتيجو: گول ۾ گهيڙيل هڪ پوروچوٽ چوڪنڊو مستطيل هوندو آهي.



مثال: ڏنل شڪل ۾، ٽپڪو O گول جو مرڪز آهي. $\overline{CE}$ ان جو قطر ۽ ABCD مدار چوڪنڊو آهي. x جي قيمت لھو. جيڪڏهن $m\angle ODE = 35^\circ$

حل:

اڌ گول جي گھيريل ڪنڊ $\angle CDE$ آهي.

$$\therefore m\angle CDE = 90^\circ$$

يعني ته $35^\circ + m\angle ADC = 90^\circ$

$$\Rightarrow m\angle ADC = 55^\circ$$

ھاڻي

مدار چوڪنڊي ABCD ۾

$$x + m\angle ADC = 180^\circ$$


$$\Rightarrow x + 55^\circ = 180^\circ$$

$$\Rightarrow x = 180^\circ - 55^\circ$$

$$\Rightarrow x = 125^\circ$$


مشق 28.2

شڪل 1



1. شڪل 1 ۾، گول جو مرڪز O آهي. جڏهن ته $\overline{AC}$ ان جو قطر آهي x جو ملھ لھو.

شڪل 2



2. شڪل 2 ۾ ACB وڏو قوس آهي ان گول جو جنھن جو مرڪز O آهي ۽ BAC جي گھيريل ڪنڊ $\angle C$ آهي $x \in \mathbb{R}$ جو ملھ لھو جڏهن ته

3. هڪ گول ۾، ننڍي قوس جي گھيريل ڪنڊ جي ماپ $7x-1$ آهي. x جي قيمت لھو جڏهن ته $x \in \mathbb{R}$

4. ثابت ڪريو ته گول جي اندر گھيريل رامبس هڪ چورس هوندو.

5. ثابت ڪريو ته مدار چوڪنڊي جي ٻاهرين ڪنڊ، سامھون واري اندرين ڪنڊ جي برابر آهي.



جائزي واري مشق 28

1. درست جواب تي نشان هڻو.

- i. جي گهيрил ڪنڊ ويڪري ڪنڊ آهي.
- (a) اهي سڀ ئي (b) وڏي قوس (c) اڌ گول (d) ننڍي قوس
- ii. قوس ۽ زهر سان گهيريل گول ايراضي آهي.
- (a) گول جو گهيرو (b) سيگمينٽ (c) وڏو قوس (d) سيڪٽر
- iii. جيڪڏهن $2x$ ننڍي قوس جي گهيريل ڪنڊ جي ماپ آهي ته پوءِ مطابقت رکندڙ وڏي قوس جي مرڪزي ڪنڊ _____ آهي.
- (a) x (b) $2x$ (c) $3x$ (d) $4x$
- iv. جيڪڏهن $2x$ ۽ 60° ساڳئي سيگمينٽ جون گهيريل ڪنڊون آهن ته پوءِ $x =$ _____
- (a) 120° (b) 60° (c) 20° (d) 30°
- v. گول جي ننڍي قوس جي گهيريل ڪنڊ _____ آهي.
- (a) عڪسي ڪنڊ (b) گوني ڪنڊ (c) ويڪري ڪنڊ (d) سوڙهي ڪنڊ
- vi. گول جي وڏي قوس جي گهيريل ڪنڊ _____ آهي.
- (a) عڪسي ڪنڊ (b) گوني ڪنڊ (c) ويڪري ڪنڊ (d) سوڙهي ڪنڊ
- vii. مدار چوڪنڊي جي سامهون وارين ڪنڊن جي جوڙ اُپت _____ آهي.
- (a) 90° (b) 180° (c) 270° (d) 360°
- viii. گول جي اندر گهيريل پورو چوٽ چوڪنڊو _____ هوندو آهي.
- (a) رامبس (b) مستطيل (c) ٿرئيزيم (d) پٽنگ
- ix. هڪ قوس جي مرڪزي ڪنڊ مطابقت رکندڙ ٻيئي قوس جي گهيريندڙ ڪنڊ کان _____ هوندي آهي.
- (a) وڏي يا برابر (b) ننڍي يا برابر (c) وڏي (d) ننڍي
- x. هڪ گول جي سيني قوسن جي مرڪزي ڪنڊن جي جوڙ اُپت _____ آهي.
- (a) 90° (b) 180° (c) 360° (d) 1000°

خلاصو

- ◀ هڪ قوس ۽ ٻن رداسي ٽڪرن سان گهيريل گول جي ايراضي کي سيڪٽر چئبو آهي.
- ◀ هڪ قوس ۽ ان جي زهر سان گهيريل گول جي ايراضي کي سيگمينٽ چئبو آهي.
- ◀ گول جي سيگمينٽ ۾ ڪنڊ کي سيگمينٽ جي گهيريل ڪنڊ پڻ چئبو آهي.
- ◀ ڪنهن قوس سان گول جي مرڪز تي ٺهيل ڪنڊ کي مرڪزي ڪنڊ چئبو آهي.
- ◀ وڏي (يا ننڍي) قوس جي مرڪزي ڪنڊ مطابقت رکندڙ ترتيبوار ننڍي (يا وڏي) قوس جي گهيريندڙ ڪنڊ کان ٻيئي هوندي آهي.
- ◀ ڪنهن گول جي ساڳئي سيگمينٽ ۾ ڪي به ٻه ڪنڊون برابر هونديون آهن.
- ◀ اڌ گول جي گهيريندڙ ڪنڊ گوني ڪنڊ هوندي آهي.
- ◀ وڏي قوس جي گهيريندڙ ڪنڊ سوڙهي ڪنڊ هوندي آهي.
- ◀ ننڍي قوس جي گهيريندڙ ڪنڊ ويڪري ڪنڊ هوندي آهي.
- ◀ مدار چوڪنڊي جون سڀ چوٽيون ساڳئي گول تي هونديون آهن.
- ◀ مدار چوڪنڊي جون سامهون واريون ڪنڊون سپليمينٽري ڪنڊون هونديون آهن.

شاگردن جي سکيا جا حاصلات (SLOs)

هي يونٽ پڙهڻ کان پوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- ڏنل گول جي مرڪز جو هنڌ ڳولڻ.
- مليل ٽن غير هم ليڪي ٽپڪن مان گذرندڙ گول ڪڍڻ.
- گول کي پورو يا مڪمل ڪرڻ.
- ❖ مرڪز معلوم ڪندي.
- ❖ مرڪز معلوم ڪرڻ کان سواءِ جڏهن گول جي گهيري جو ڪو حصو مليل هجي.
- مليل ٽڪنڊي کي گول ۾ گهيرڻ.
- ڏنل ٽڪنڊي ۾ گول کي گهيرڻ.
- هڪ ٽڪنڊي جو ٻاهريون گول ڪڍڻ.
- ڏنل گول کي ٽپور پاسي ٽڪنڊي سان گهيرڻ.
- مليل ٽڪنڊي ۾ هڪ ٽپور پاسي ٽڪنڊي کي گهيري ۾ آڻڻ.
- مليل گول ۾ هڪ ٽپور پاسي ٽڪنڊي کي گهيري ۾ آڻڻ.
- ڏنل گول جو گهيريونڊڙ چورس ٺاهيڻ.
- هڪ ڏنل گول جو گهيريونڊڙ پور پاسو ڇهه ڪندو ٺاهيڻ.
- ڏنل گول ۾ هڪ گهيريونڊڙ پور پاسو ڇهه ڪندو ٺاهيڻ.
- مرڪز جو استعمال ڪرڻ بنا، ڏنل ٽپڪي P مان مليل قوس جي ڇهڻي ليڪ ڪڍڻ، جڏهن
- ❖ P قوس جو وچيون ٽپڪو آهي.
- ❖ P قوس جي چيڙي تي آهي.
- ❖ P قوس کان ٻاهر آهي.
- هڪ ٽپڪي P مان، ڏنل گول جي ڇهڻي ليڪ

ڪڍڻ، جڏهن

❖ P گول جي گهيري تي موجود آهي.

❖ P گول کان ٻاهر موجود آهي.

➤ هڪ گول جون ٻه ڇهڻي ليڪون ڪڍڻ جيڪي

هڪٻئي سان ڏنل ڪنڊ تي ملن ٿيون.

➤ ٻن برابر گولن جون.

❖ سڌي طرح گڏيل ڇهڻيون ليڪون يا

ٻاهريون ڇهڻيون ليڪون ڪڍڻ.

❖ آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون يا اندريون

ڇهڻيون ليڪون ڪڍڻ.

➤ ٻه غير مساوي گولن جون

❖ سڌي طرح گڏيل ڇهڻيون ليڪون يا

ٻاهريون ڇهڻيون ليڪون ڪڍڻ.

❖ آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون يا اندريون

ڇهڻيون ليڪون ڪڍڻ.

➤ ٻن غير مساوي ڇهنڊڙ گولن جي ڇهڻي ليڪ

ڪڍڻ.

➤ ٻن غير مساوي ڪپينڊڙ گولن جي ڇهڻي ليڪ

ڪڍڻ.

➤ هڪ گول ڪڍڻ جيڪو


❖ ڏنل ڪنڊ جي ٻنهي ٻانهن کي ڇهڻي.

❖ ميلاپ ڏانهن مائل ٿيندڙ ٻن ليڪن کي

ڇهڻي ۽ انهن ليڪن جي وچ ۾ ڪنهن

ٽپڪي مان گذري.

❖ ميلاپ ڏانهن مائل ٽن ليڪن کي ڇهڻي.



تعارف:

اسان کي خبر آهي ته جاميٽري جي هڪ اهم شاخ عملي جاميٽري آهي جيڪا فن تعمير، ڪمپيوٽر گرافڪس، مصوري وغيره ۾ استعمال ٿئي ٿي. اسان گذريل ڪلاس ۾ اڳيئي ڪنڊن، ٽڪنڊن، مستطيل، پنج ڪنڊو وغيره کي ٺاهڻ سکي چڪا آهيون. اڄو ته گولن ۽ ان سان لاڳاپيل شڪلين جي جوڙجڪ سکون.


29.1 گولن جي جوڙجڪ (Construction of circles):

اسان کي خبر آهي ته پلڪار جو استعمال ڪندي، سولائي سان گول ڪڍي سگهجي ٿو جڏهن ان جو مرڪز ۽ رداس مليل هجن. ان سيڪشن ۾، اسين ان صورت ۾ پڻ گول ڪڍڻ سکنداسين جڏهن مرڪز ۽ رداس مليل نه هجن.

29.1 (i) ڏنل گول جي مرڪز جو هنڌ ڳولڻ:

ڪنهن گول جي مرڪز جو هنڌ ڳولڻ لاءِ اسين ان حقيقت جو استعمال ڪنداسين ته گول جي غير پورو چوٽ زهه جا عمودي اڌ ڪنڊر هميشه هڪ بيئي کي گول جي مرڪز تي ڪپين ٿا. ڏنل گول جي مرڪز جي هنڌ ڳولڻ جو طريقو هيٺين مثال سان واضح ڪجي ٿو.

مثال: شڪل ۾ ڏيکاريل گول جي مرڪز جو هنڌ ڳوليو.



مليل: هڪ گول

گهريل: ڏنل گول جي مرڪز جو هنڌ ڳولڻ

جوڙجڪ جا ڏاڪا:

(i) ڏنل گول جا ٻه غير پورو چوٽ زهه $\overline{AB}$ ۽ $\overline{CD}$ ڪيو.


(ii) زهه $\overline{AB}$ جو عمودي اڌ ڪنڊڙ $\overline{PQ}$ ڪيو.

(iii) زهه $\overline{CD}$ جو عمودي اڌ ڪنڊڙ $\overline{XY}$ ڪيو.

(iv) ٻئي عمودي اڌ ڪنڊڙ $\overline{PQ}$ ۽ $\overline{XY}$ هڪٻئي کي ٽپي O تي ڪپين ٿا. ٽپڪو O ڏنل گول جو مرڪز آهي.

29.1 (ii) مليل ٽن غير هم ليڪي ٽپڪن مان گذرندڙ گول ڪڍڻ:

مليل ٽن غير هم ليڪي ٽپڪن مان گذرندڙ گول ڪڍڻ لاءِ، اسين سڀ کان اڳ ۾ مرڪز جو هنڌ ڳولينداسين ۽ ان کانپوءِ گول ڪڍينداسين جيئن هيٺين مثال ۾ واضح ڪيو ويو آهي.



مثال: ٽي غير هم ليڪي ٽپڪن P, Q, ۽ R مان گذرندڙ گول ڪيو.

مليل: ٽي غير هم ليڪي ٽپڪا P, Q, ۽ R.

گهريل: هڪ گول ڪڍڻ جيڪو ٽپڪن P, Q, ۽ R مان گذري.

جوڙجڪ جا ڏاڪا:


(i) ڪي به ٽي غير هم ليڪي ٽپڪا P, Q, ۽ R ڪٽو

(ii) $\overline{PQ}$ ۽ $\overline{QR}$ ڪيو.

(iii) $\overline{PQ}$ جو عمودي اڌ ڪنڊڙ $\overline{AB}$ ڪيو.

(iv) $\overline{QR}$ جو عمودي اڌ ڪنڊڙ $\overline{CD}$ ڪيو.

(v) ٻئي عمودي اڌ ڪنڊڙ $\overline{AB}$ ۽ $\overline{CD}$ هڪٻئي کي ٽپي O تي ڪپين ٿا جيڪو گهريل گول جو مرڪز آهي.



(vi) مرکز O ۽ رداس $m\overline{OP}$ يا $m\overline{OQ}$ يا $m\overline{OR}$ جي برابر ڪٿي، هڪ گول ڪيو. اهو گول گهربل گول آهي.


29.1 (iii) گول کي پورو يا مڪمل ڪرڻ

- مرکز معلوم ڪندي
- مرکز معلوم ڪرڻ کانسواءِ

جڏهن گول جي گهيري جو ڪو حصو مليل هجي.

(a) **مرکز معلوم ڪندي گول کي پورو ڪرڻ جڏهن گول جي گهيري جو ڪو حصو مليل هجي.**

اسين گول جي ڪن به ٽن غير هم ليڪي ٽپڪن جي مدد سان مرکز ڳوليندي گول ڪڍي سگهون ٿا. جڏهن ان جي گهيري جو ڪو حصو يا قوس مليل هجي. اهو طريقو هيٺين مثال ۾ واضح ڪيل آهي.



مثال: مرکز ڳوليندي هڪ گول کي پورو ڪريو جڏهن ان جو قوس AB مليل آهي.

مليل: گول جي گهيري جو هڪ حصو يا قوس AB مليل آهي.

گهربل: هڪ گول کي پورو ڪرڻ جنهن جو قوس مليل آهي.

جوڙجڪ جا ڏاڪا:

- قوس AB ڪيو.
- $\overline{AB}$ تي A ۽ B کانسواءِ ڪو ٻيو ٽپڪو C ڪٽو.

- $\overline{BC}$ ۽ $\overline{AC}$ ڪيو.

- $\overline{AC}$ جو عمودي اڌ ڪندڙ $\overleftrightarrow{PQ}$ ڪيو.

- $\overline{BC}$ جو عمودي اڌ ڪندڙ $\overleftrightarrow{XY}$ ڪيو.


- ٻئي عمودي اڌ ڪندڙ هڪٻئي کي ٽپڪي O تي ڪپين ٿا جيڪو گول جو مرکز آهي.

- مرکز O ۽ رداس $m\overline{AO}$ يا $m\overline{OB}$ يا $m\overline{OC}$ جي برابر ڪٿي، گول جو باقي رهيل حصو ڪڍو اهڙي طرح اسان وٽ قوس AB جو مڪمل گول آهي.

(b) **مرکز معلوم ڪرڻ کانسواءِ گول کي پورو ڪرڻ جڏهن ان جي گهيري جو ڪو حصو مليل هجي.**

اسين پور پاسو گهڻ ڪندي جي مدد سان مرکز ڳولڻ بنا گول ڪڍي سگهون ٿا جڏهن ڪو قوس مليل هجي.

اسين ٻاهرين ڪنڊن يا اندرين ڪنڊن جي مدد سان پور پاسو گهڻ ڪندو ٺاهينداسين اهي ڪنڊون يڪسان هونديون. هيٺين مثال جي مدد سان ان طريقي کي واضح ڪيو ويو آهي.



مثال: مرکز ڳولڻ بنا هڪ گول کي پورو ڪريو جنهن جو قوس AB مليل آهي.

مليل: هڪ گول جو قوس AB

گهربل: $\overline{AB}$ جو گول پورو ڪرڻ.

جوڙجڪ جا ڏاڪا:


- مليل $\overline{AB}$ جا ٻه يڪسان زهه $\overline{PQ}$ ۽ $\overline{QR}$ ڪيو.

- $\angle Q$ جي يڪسان ٻاهرين ڪنڊ $\angle R$ ڪيو ۽ $\overline{PQ}$ جي يڪسان $\overline{RS}$ ڪيو.

- $\angle R$ جي يڪسان ٻاهرين ڪنڊ $\angle S$ ڪيو ۽ $\overline{PQ}$ جي يڪسان $\overline{ST}$ ڪيو.

- ساڳئي طريقي سان، اسان ٽپڪا S، T، U ۽ V حاصل ڪريون ٿا.

- اهڙي طرح اسان هڪ پور پاسو ڇهه ڪنڊون PQRSTU حاصل ڪيو.



(vi) $\overline{RS}, \overline{ST}, \overline{TU}, \overline{UV}$ ۽ $\overline{VP}$ جا ٽپڪن وارا قوس ٺاهيو. اهي ٽپڪيل قوس گول کي پورو ڪن ٿا.

مشق 29.1

1. گول شي جي مدد سان هڪ گول ڪڍو. ان جي مرڪز جو هنڌ ڳوليو.
2. ٽي غير هم ليڪ ٽپڪا Z, Y, X ڪٿو ۽ هڪ گول ڪڍو جيڪو انهن ٽپڪن مان گذري.
3. ڪنهن گول شي سان هڪ ننڍو قوس AB ڪڍو. مرڪز معلوم ڪندي ان گول کي پورو ڪريو.
4. ڪنهن گول شي سان هڪ وڏو قوس ABC ڪڍو. مرڪز معلوم ڪندي ان گول کي پورو ڪريو.
5. ڪنهن گول شي سان هڪ ننڍو قوس AB ڪڍو. مرڪز معلوم ڪرڻ بنا ان گول کي پورو ڪريو.

29.2 گهٽ ڪنڊن سان ڳنڍيل گول:

ياد ڪريو ته گهٽ ڪنڊو ٽي يا وڌيڪ پاسن واري بند شڪل آهي. مثال طور: ٽڪنڊو، چوڪنڊو، پنج ڪنڊو، ڇهه ڪنڊو وغيره. گهٽ ڪنڊي سان ڳنڍيل گول اهي گول هوندا آهن جيڪي يا ته گهٽ ڪنڊي جي سڀني چوٽين مان گذرن يا ان جي پاسن کي ڇهن.

29.2 (i) مليل ٽڪنڊي کي گول ۾ گهيرڻ:

ٽڪنڊي جو گهيريندڙ گول (Circum Circle of Triangle)

اهو گول جيڪو ڪنهن ٽڪنڊي جي تنهنجي چوٽين مان گذري، ان کي ٽڪنڊي جو گهيريندڙ گول چئبو آهي. ڏنل شڪل ۾ $\triangle ABC$ جو گهيريندڙ گول آهي جنهن جو مرڪز O آهي جيڪو گهيريندڙ مرڪز (Circum-centre) ڪوٺبو آهي.



مثال: $\triangle ABC$ جو گهيريندڙ گول ڪڍو جنهن ۾ $m\overline{AB} = 6\text{cm}$, $m\overline{BC} = 5\text{cm}$ ۽ $m\overline{AC} = 7\text{cm}$


مليل: هڪ ٽڪنڊو ABC جنهن ۾ $m\overline{AB} = 6\text{cm}$, $m\overline{BC} = 5\text{cm}$ ۽ $m\overline{AC} = 7\text{cm}$

گهريل: $\triangle ABC$ جو گهيريندڙ گول ڪڍڻ

جوڙجڪ جا ڏاڪا:


- (i) مليل مواد جي مدد سان $\triangle ABC$ ٺاهيو.
- (ii) $\overline{AB}$ جو عمودي اڌ ڪندڙ $\overline{PQ}$ ڪڍو
- (iii) $\overline{AC}$ جو عمودي اڌ ڪندڙ $\overline{XY}$ ڪڍو.
- (iv) ٻئي عمودي اڌ ڪندڙ $\overline{PQ}$ ۽ $\overline{XY}$ هڪٻئي کي ٽپڪي O تي ڪپين ٿا.
- (v) مرڪز O ۽ رداس $m\overline{OA}$ يا $m\overline{OB}$ يا $m\overline{OC}$ جي برابر ڪٽي هڪ گول ڪڍو جيڪو ٽپڪن A, B, C مان گذري ٿو. اهو $\triangle ABC$ جو گهريل گهيريندڙ گول آهي.





29.2 (ii) ڏنل ٽڪنڊي ۾ گول کي گهيرڻ يا سموئڻ: ٽڪنڊي جو گهيريل گول يا اندريون گول:

(Inscribed circle or in-circle of Triangle)




اهو گول جيڪو ٽڪنڊي جي سڀني پاسن کي چڙهي، ان کي اندريون گول يا گهيريل گول چئبو آهي. ڀر واري شڪل ۾ $\triangle ABC$ جو گهيريل گول آهي جنهن جو مرڪز ٽپڪو O آهي. ان مرڪز کي اندريون مرڪز (In-centre) چئبو آهي.

مثال: $\triangle ABC$ جو گهيريل گول ڪڍو جنهن ۾ $m\overline{AB} = 7\text{cm}$, $m\angle B = 60^\circ$ ۽ $m\overline{BC} = 6\text{cm}$

مليل: هڪ ٽڪنڊو ABC ۾ جنهن $m\overline{AB} = 7\text{cm}$, $m\angle B = 60^\circ$ ۽ $m\overline{BC} = 6\text{cm}$

گهربل: $\triangle ABC$ جو گهيريل گول ڪڍڻ

جوڙجڪ جا ڏاڪا:



(i) ڏنل مواد جي مدد سان $\triangle ABC$ ٺاهيو.

(ii) $\angle A$ جو اندريون اڌ ڪندڙ $\overrightarrow{AX}$ ڪڍو

(iii) $\angle B$ جو اندريون اڌ ڪندڙ $\overrightarrow{BY}$ ڪڍو.

(iv) ٻئي اندريان اڌ ڪندڙ $\overrightarrow{AX}$ ۽ $\overrightarrow{BY}$ هڪٻئي کي ٽپڪي O تي ڪپين ٿا.

(v) ٽپڪي O کان $\overline{AB}$ تي هڪ عمود $\overline{OP}$ ڪڍو. $\overline{AB}$ کي $\overline{OP}$ ٽپڪي L تي ڪپي ٿو.


(vi) مرڪز O ۽ رڌاس $m\overline{OL}$ جي برابر ڪٽي هڪ گول

ڪڍو جيڪو $\triangle ABC$ جي سڀني پاسن کي چڙهي ٿو. اهو گهربل گهيريل گول آهي.

29.2 (iii) هڪ ٽڪنڊي جو ٻاهريون گول ڪڍڻ:

(Escribed Circle or Ex-circle)

هڪ گول جيڪو ڪنهن ٽڪنڊي جي هڪ پاسي کي ٻاهريان چڙهي ۽ ٻن وڌيل پاسن کي اندريان چڙهي ته ان کي ٽڪنڊي جو ٻاهريون گول چئبو آهي.



مليل شڪل ۾، $\triangle ABC$ جو چوٽي A جي سامهون وارو ٻاهريون گول آهي ۽ ان جو مرڪز I_1 آهي جنهن کي ٻاهريون مرڪز (ex-circle) چئبو آهي.

ساڳي ريت $\triangle ABC$ جي چوٽين B ۽ C جي سامهون وارن ٻاهرين گولن جا مرڪز ترتيبوار I_2 ۽ I_3 آهن.

مثال: $\triangle ABC$ جو چوٽي A جي سامهون وارو ٻاهريون گول ڪڍو جڏهن ته $m\overline{AB} = 5\text{cm}$

$m\angle B = 60^\circ$ ۽ $m\angle A = 30^\circ$

مليل: هڪ ٽڪنڊو ABC جنهن ۾ $m\overline{AB} = 5\text{cm}$, $m\angle A = 30^\circ$ ۽ $m\angle B = 60^\circ$



گهربل: $\triangle ABC$ جو چوٽي A جي سامهون وارو ٻاهريون گول ڪڍڻ

جوڙجڪ جا ڏاڪا:

(i) ڏنل مواد جي مدد سان $\triangle ABC$ ٺاهيو.

(ii) C کان پري $\overline{AC}$ کي وڌايو ۽ B کان پري $\overline{AB}$ کي وڌايو ته جيئن ٻه ٻاهريون ڪنڊون

ترتيبوار BCE ۽ CBF ٺهن.



(iii) $\angle A$ جو اندريون اڌ ڪندڙ $\overrightarrow{AX}$ ڪيو.

(iv) $\angle CBF$ جو اندريون اڌ ڪندڙ $\overrightarrow{BY}$ ڪيو.

(v) ٻئي اڌ ڪندڙ $\overrightarrow{AX}$ ۽ $\overrightarrow{BY}$ هڪٻئي کي

ٽپڪي I تي ڪپين ٿا.

(vi) ٽپڪي I کان $\overrightarrow{AF}$ تي عمود $\overrightarrow{IZ}$ ڪيو جيڪو

$\overrightarrow{AF}$ کي ٽپڪي K تي ڪپي ٿو.

(vii) مرڪز I ۽ رداس mIK جي برابر ڪٿي هڪ

گول ڪيو جيڪو $\overrightarrow{BC}$ کي ٻاهريان ۽ $\overrightarrow{AE}$ ۽

$\overrightarrow{AF}$ کي اندريان ڇهي ٿو.

اهو $\triangle ABC$ جو چوٽي A جي سامهون وارو گهربل ٻاهريون گول آهي.

29.2 ڏنل گول کي ٽپور پاسي ٽڪنڊي سان گهيرڻ:

اسين هڪ ٽپور پاسو ٽڪنڊو ٺاهينداسين جيڪو ڏنل گول کي گهيري. ان لاءِ اسين ان حقيقت جو استعمال ڪنداسين ته جيڪڏهن ڪو گول ٽن يڪسان قوسن ۾ ورهايو وڃي ۽ ورهاست وارن ٽپڪن تي ڇهڻ ليڪون ڪڍيون وڃن ته اهي ليڪون ان گول جي گهيريندڙ ٽپور پاسي ٽڪنڊي جا پاسا ٺاهينديون. اهو طريقو هيٺين مثال سان واضح ڪجي ٿو.

مثال: 3cm رداس جو گول ڪيو جنهن جو مرڪز O آهي. ان گول جو گهيريندڙ ٽپور پاسو ٽڪنڊو ٺاهيو.

مليل: 3cm رداس وارو گول جنهن جو مرڪز O آهي.

گهربل: مليل گول جو گهيريندڙ ٽپور پاسو ٽڪنڊو ٺاهڻ

جوڙجڪ جا ڏاڪا:

(i) 3cm رداس جو گول ڪيو جنهن جو مرڪز O آهي.

(ii) مرڪزي ڪنڊ کي ٽن يڪسان قوسن ۾ ورهائيندي،

مليل گول کي ٽن يڪسان قوسن $\overrightarrow{AB}$ ، $\overrightarrow{BC}$ ۽ $\overrightarrow{AC}$ ۾ ورهايو.

(iii) ٽپڪن A، B ۽ C تي گوني ڪنڊون ٺاهيندي انهن ٽپڪن

تي ڇهڻ ليڪون ڪيو.

(iv) اهي ڇهڻ ليڪون هڪٻئي کي ٽپڪن P، Q ۽ R تي

ڪپين ٿيون.

هاڻي PQR گهربل ٽپور پاسو ٽڪنڊو آهي.

(v) 29.2 مليل ٽڪنڊي ۾ هڪ ٽپور پاسي ٽڪنڊي کي سموڻ يا

گهيري ۾ آڻڻ.


اسان کي خبر آهي ته مليل ٽڪنڊي ۾ هڪ ٽپور پاسو

ٽڪنڊو گهيريل چورائبو جيڪڏهن ٽپور پاسي ٽڪنڊي جون

سڀ چوٽيون مليل ٽڪنڊي جي مختلف پاسن تي موجود هجن.

پڻ واري شڪل ۾، $\triangle ABC$ جو گهيريل ٽپور پاسو ٽڪنڊو

PQR آهي.






مثال: $\triangle ABC$ جو گھيريل ٽپور پاسو ٽڪنڊو ٺاهيو جڏهن $m\overline{BC} = 5\text{cm}$ ، $m\overline{AB} = 4\text{cm}$ ۽ $m\overline{AC} = 7\text{cm}$

مليل: هڪ ٽڪنڊو ABC جنهن ۾ $m\overline{BC} = 5\text{cm}$ ، $m\overline{AB} = 4\text{cm}$ ۽ $m\overline{AC} = 7\text{cm}$

گھريل: $\triangle ABC$ جو گھيريل ٽپور پاسو ٽڪنڊو ٺاهڻ

جوڙجڪ جا ڏاڪا:



(i) مليل مواد سان $\triangle ABC$ ٺاهيو.

(ii) $\angle B$ جو اندريون اڌ ڪندڙ $\overrightarrow{BD}$ ڪڍو جڏهن ته $\angle B$ هڪ

مناسب ڪنڊ آهي (عام طرح سان وڌي ڪنڊ)

(iii) اندريون اڌ ڪندڙ $\overrightarrow{BD}$ ڪڍي ٿو $\overline{AC}$ کي ٽپي E تي.


(iv) ٽپي E تي، ٻه ڪنڊون BEP ۽ BEQ ٺاهيو جنهن مان هر

هڪ جي ماپ 30° آهي

(v) $\overrightarrow{EP}$ ۽ $\overrightarrow{EQ}$ ترتيبوار $\overline{BC}$ ۽ $\overline{AB}$ کي ٽپن G ۽ F تي

ڪپين ٿا.

(vi) $\overline{FG}$ ڪڍو.



هاڻي $\triangle ABC$ جو گھريل گھيريل ٽپور پاسو ٽڪنڊو EFG آهي.

29.2 (vi) مليل گول ۾ هڪ ٽپور پاسي ٽڪنڊي کي سموڻ يا

گھيري ۾ آڻڻ:

هڪ گول جو گھيريل ٽپور پاسو ٽڪنڊو.

هڪ ٽپور پاسو ٽڪنڊو گول جو گھيريل ٽپور پاسو ٽڪنڊو چورائبو

جيڪڏهن گول ان جي سڀني چوٽين مان گذري ڀر واري شڪل ۾،

مرڪز O واري گول جو گھيريل ٽپور پاسو ٽڪنڊو ABC آهي.

مثال: هڪ گول جو گھيريل ٽپور پاسو ٽڪنڊو ٺاهيو جڏهن

ته گول جو رداس 3cm ۽ ان جو مرڪز O آهي.

گھريل: مليل گول جو گھيريل ٽپور پاسو ٽڪنڊو ٺاهڻ.

جوڙجڪ جا ڏاڪا:

(i) مرڪز O ۽ رداس 3cm سان هڪ گول ڪڍو.


(ii) گول تي هڪ ٽپو A ڪٽو. مرڪز A ۽ رداس 3cm سان


شروعات ڪندي گول کي ٽپن B, C, D, E ۽ F تي

يڪسان حصن ۾ ورهايو.

(iii) $\overline{AC}$ ، $\overline{AE}$ ۽ $\overline{CE}$ ڪڍو.

هاڻي مليل گول جو گھريل گھيريل ٽپور پاسو ٽڪنڊو AEC آهي.





مشق 29.2


1. $\triangle ABC$ ٺاهيو ۽ هر هڪ صورت ۾ ان جو گھيريندڙ گول ڪيو.
 $m\angle A = 50^\circ$ ۽ $m\overline{AC} = 6\text{cm}$, $m\overline{AB} = 5.5\text{cm}$ (i)
 $m\angle C = 50^\circ$ ۽ $m\overline{BC} = 4.5\text{cm}$, $m\overline{AB} = 6\text{cm}$ (ii)
2. $\triangle PQR$ ٺاهيو ۽ هر هڪ صورت ۾ ان جو گھيريل گول ڪيو.
 $m\overline{RP} = 5.5\text{cm}$ ۽ $m\overline{QR} = 6.5\text{cm}$, $m\overline{PQ} = 5\text{cm}$ (i)
 $m\angle Q = 50^\circ$ ۽ $m\angle P = 60^\circ$, $m\overline{PQ} = 6\text{cm}$ (ii)
3. $\triangle XYZ$ ٺاهيو ۽ هر هڪ صورت ۾ $\angle Y$ جي سامهون وارو ٻاهريون گول ڪيو.
 $m\angle Y = 30^\circ$ ۽ $m\overline{YZ} = 5\text{cm}$, $m\overline{XY} = 4.5\text{cm}$ (i)
 $m\angle Z = 25^\circ$ ۽ $m\overline{YZ} = 6\text{cm}$, $m\overline{XY} = 5.5\text{cm}$ (ii)
4. مرڪز O ۽ رداس 3.5cm سان هڪ گول ڪيو ۽ ان گول جو گھيريندڙ ٽپور پاسو ٽڪندو ٺاهيو.
5. $\triangle PQR$ جو گھيريل ٽپور پاسو ٽڪندو ٺاهيو جڏهن ته
 $m\overline{PR} = 3\text{cm}$ ۽ $m\overline{QR} = 5.5\text{cm}$, $m\overline{PQ} = 4.5\text{cm}$
6. هڪ گول جو گھيريل ٽپور پاسو ٽڪندو ٺاهيو جڏهن ته گول جو مرڪز O ۽ رداس 3.8cm آهي.

29.2 (vii) ڏنل گول جو گھيريندڙ چورس:

چورس يا ڇهه ڪنڊي يا ڪنهن ٻئي گھڻ ڪنڊي جا گھيريندڙ گول ڪيڙ يا گول ۾ انهن گھڻ ڪنڊن کي گھيرڻ کان اڳ ۾ اسان کي گولن سان لاڳاپيل، پور پاسو گھڻ ڪنڊن جي حوالي سان هيٺين سڏيان جي ڄاڻ هئڻ لازمي آهي.

- (i) جيڪڏهن ڪنهن گول جو گھيرو n برابر قوسن ۾ ورهايو وڃي ته پوءِ ونڊيندڙ ٽپڪا، گول ۾ گھيريل پور پاسو n - ڪنڊي جون چوٽيون هونديون آهن.
- (ii) انهن ٽپڪن تي گول جون ڇهڻي ليڪون، گول کي گھيريندڙ پور پاسو n - ڪنڊي جا پاسا هونديون آهن.

ان جو مطلب آهي ته جيڪڏهن اسان کي هڪ چورس، پور پاسو پنج ڪنڊي، پور پاسو ڇهه ڪنڊي وغيره جا گھيريندڙ گول ڪيڙا هجن يا انهن ۾ گھيريل گول ڪيڙا هجن ته پوءِ اسين مليل گول کي ترتيبوار چار، پنج، ڇهه وغيره برابر حصن ۾ ورهائينداسين اچو ته هيٺين مثال جي مدد سان اهو سکون ته ڪيئن هڪ مليل گول جو گھيريندڙ



چورس ڪڍجي.

مثال: هڪ گول جو گھيريندڙ چورس ٺاهيو جڏهن ته گول

جو مرڪز O ۽ رداس 3.5cm آهي.

مليل: هڪ گول جنهن جو مرڪز O ۽ رداس 3.5cm آهي.

گھربل: مليل گول جو گھيريندڙ چورس ٺاهڻ

جوڙجڪ جا ڏاڪا:

- (i) مرڪز O ۽ رداس 3.5cm کڻي هڪ گول ڪيو.
- (ii) هڪ قطر AB ڪيو
- (iii) هڪ ٻيو قطر CD ڪيو جيڪو AB تي عمود هجي.



(iv) ٽپڪن A, B, C ۽ D تي ڇهڻي ليڪون ڪيو.

(v) اهي ڇهڻي ليڪون هڪٻئي کي ٽپڪن P, Q, R ۽ S تي ڪپين ٿيون.

هاڻي PQRS گهريل چورس آهي جيڪو مليل گول جو گهيريندڙ آهي.

اچو ته هيٺين مثال جي مدد سان مليل گول جو گهيريل چورس ٺاهيون.

مثال: هڪ گول ۾ گهيريل چورس ٺاهيو جڏهن ته گول جو مرڪز C ۽ رداس 3cm آهي.

مليل: هڪ گول جنهن جو مرڪز C ۽ رداس 3cm آهي.

گهريل: مليل گول ۾ گهيريل چورس ٺاهڻ.

جوڙجڪ جا ڏاڪا:

(i) مرڪز C ۽ رداس 3cm سان هڪ گول ڪيو.

(ii) هڪ قطر PR ڪيو

(iii) هڪ قطر QS ٺاهيو جيڪو PR تي عمود هجي.

(iv) مليل گول ٽپڪن P, Q, R ۽ S تي چار برابر حصن ۾ ورهائجي ويو آهي.

(v) هاڻي $\overline{SP}$, $\overline{RS}$, $\overline{QR}$, $\overline{PQ}$ ڪيو. هاڻي مليل گول جو گهريل گهيريل

چورس PQRS آهي.

29.2 (viii) **هڪ ڏنل گول جو گهيريندڙ پور پاسو ڇهه ڪندو ٺاهڻ:**

هڪ ڏنل گول جي گهيريندڙ پور پاسو ڇهه ڪندي کي ٺاهڻ جو طريقو هيٺين مثال جي

مدد سان واضح ڪيو ويو آهي.

مثال: مرڪز O ۽ رداس 4cm واري گول جو گهيريندڙ پور پاسو ڇهه ڪندو ٺاهيو.

مليل: هڪ گول جنهن جو مرڪز O ۽ رداس 4cm آهي.

گهريل: مليل گول جو گهيريندڙ پور پاسو ڇهه ڪندو ٺاهڻ.

جوڙجڪ جا ڏاڪا:

(i) مرڪز O ۽ رداس 4cm کڻي هڪ گول ڪيو.

(ii) گول تي ڪو ٽپڪو A کڻو.

(iii) مرڪز A ۽ $m\angle O A$ جي برابر رداس سان شروعات ڪندي

گول کي ڇهه برابر حصن ۾ ورهائڻ لاءِ قوس ڪيو ۽

ونديندڙ ٽپڪا A, B, C, D, E ۽ F آهن

(iv) انهن ونديندڙ ٽپڪن تي گول جون ڇهڻي ليڪون ڪيو.

(v) اهي ڇهڻي ليڪون هڪ ٻيئي کي ٽپڪن P, Q, R, S, T ۽ U تي ڪپين ٿيون.

هاڻي مليل گول جو گهريل پور پاسو ڇهه ڪندو PQIRSTU آهي.

29.2 (ix) **ڏنل گول ۾ هڪ گهيريل پور پاسو ڇهه ڪندو ٺاهڻ.**



هيٺين مثال جي مدد سان، ڏنل گول ۾ هڪ گهيريل پور پاسو ڇهه ڪندو ٺاهڻ جو طريقو

واضح ڪجي ٿو.

مثال: مرڪز O ۽ رداس 4.5 cm واري گول ۾ هڪ گهيريندڙ پور پاسو ڇهه ڪندو ٺاهيو.

مليل: هڪ گول جنهن جو مرڪز O ۽ رداس 4.5 cm آهي.

گهريل: مليل گول ۾ گهيريل پور پاسو ڇهه ڪندو ٺاهڻ.



جوڙجڪ جا ڏاڪا:

- (i) مرڪز O ۽ رداس 4.5cm ڪٿي هڪ گول ڪيو.
 - (ii) گول تي ڪو ٽپڪو A ڪٿو.
 - (iii) مرڪز A ۽ $\widehat{AO}$ يا 4.5cm جي رداس سان شروعات ڪندي ڏنل گول کي ٽپڪن A, B, C, D, E ۽ F تي برابر حصن ۾ ورهائڻ لاءِ قوس ڪيو
 - (iv) $\widehat{AB}, \widehat{BC}, \widehat{CD}, \widehat{DE}, \widehat{EF}$ ۽ $\widehat{FA}$ ڪيو
- هاڻي ABCDEF گهريل پور پاسو ڇهه ڪندو آهي جيڪو مليل گول ۾ گهيريل آهي.

مشق 29.3

1. مرڪز C ۽ 4.2cm رداس واري گول جو گهيريندڙ چورس ٺاهيو.
 2. مرڪز O ۽ 3.6cm رداس واري گول ۾ هڪ گهيريل چورس ٺاهيو.
 3. مرڪز O ۽ 4.8cm رداس واري گول جو گهيريندڙ پور پاسو ڇهه ڪندو ٺاهيو.
 4. مرڪز C ۽ 4.4cm رداس واري گول ۾ گهيريل پور پاسو ڇهه ڪندو ٺاهيو.
 5. مرڪز O ۽ 4.3cm واري گول ۾ گهيريل پور پاسو پنج ڪندو ٺاهيو.
- (اشارو، مرڪز تي پنج يڪسان ڪندون ٺاهيو).

29.3 گول جون ڇهڻ ليڪون (Tangents to a circle):

ياد ڪريو ته گول جي ڇهڻي ليڪ هڪ اهڙي ليڪ آهي جيڪا گول کي صرف هڪ ئي ٽپڪي تي ڇُهي ٿي. ميلاب واري ٽپڪي تي گول جي ڇهڻي ليڪ ۽ رداسي ٽڪر هميشه هڪٻئي تي عمود هوندا آهن.

29.3 (i) مرڪز جو استعمال ڪرڻ بنا، ڏنل ٽپڪي P مان مليل قوس جي ڇهڻي ليڪ ڪيڏن جڏهن.

- P * قوس جو وچيون ٽپڪو آهي.
- P * قوس جي ڇيڙي تي آهي
- P * قوس کان ٻاهر آهي.

صورت 1: جڏهن P قوس جو وچيون ٽپڪو آهي.

مرڪز جو استعمال ڪرڻ بنا، ڏنل ٽپڪي P مان مليل قوس جي ڇهڻي ليڪ ڪيڏن جو طريقو هيٺين مثال سان واضح ڪجي ٿو، جڏهن ته P قوس جو وچيون ٽپڪو آهي.

مثال: هڪ قوس AB ڪٿو. مرڪز جو استعمال ڪرڻ بنا، $\widehat{AB}$ جي


وچين ٽپڪي P مان $\widehat{AB}$ جي ڇهڻي ليڪ ڪيو.

مليل: ٽپڪو P، $\widehat{AB}$ جو وچيون ٽپڪو آهي

گهريل: مرڪز جو استعمال ڪرڻ بنا، P مان $\widehat{AB}$ تي ڇهڻي ليڪ ڪيڏن:

جوڙجڪ جا ڏاڪا:


- (i) هڪ قوس AB ڪٿو
- (ii) $\widehat{AB}$ زهر ڪيو.
- (iii) $\widehat{AB}$ جو عمودي اڌ ڪندڙ $\overleftrightarrow{XY}$ ڪيو جيڪو قوس کي ٽپڪي P تي ڪپي ٿو.
- (iv) ٽپڪي P مان، $\overleftrightarrow{XY}$ تي هڪ عمود $\overleftrightarrow{CD}$ ڪيو اهڙي طرح $\overleftrightarrow{CD}$ هڪ گهريل ڇهڻي ليڪ آهي.



صورت 2: جڏهن P قوس جي چيٽي تي آهي.

مرڪز جو استعمال ڪرڻ بنا، قوس جي چيٽي P مان قوس جي ڇهڻي ليڪ ڪيڏ جو طريقو هيٺين مثال سان واضح ڪجي ٿو.

مثال: هڪ قوس PAB ڪٿو. مرڪز جو استعمال ڪرڻ بنا، $\widehat{PAB}$ جي ڇهڻي ليڪ قوس جي چيٽي P مان ڪيو.



مليل: ٽپڪو P، $\widehat{PAB}$ جو چيٽو آهي گهربل مرڪز جو استعمال ڪرڻ بنا $\widehat{PAB}$ جي ڇهڻي ليڪ قوس جي چيٽي P مان ڪيڏ.


جوڙجڪ جا ڏاڪا:

- (i) مرڪز ۽ رداس پنهنجي مرضي مطابق ڪٽندي هڪ $\widehat{PAB}$ ڪيو.
- (ii) زه $\overline{AP}$ ڪيو.
- (iii) ٽپڪي A تي $\overline{PA}$ جي مٿان هڪ عمود $\overrightarrow{AX}$ ڪيو جيڪو ڏنل قوس کي ٽپڪي Q تي ڪپي ٿو.
- (iv) $\overline{PQ}$ ڪيو جيڪو قوس جو قطر آهي.
- (v) ٽپڪي P تي، $\overline{PQ}$ جي مٿان هڪ عمود $\overrightarrow{CD}$ ڪيو. هاڻي $\overline{CD}$ گهربل ڇهڻي ليڪ آهي.

صورت 3: جڏهن P قوس کان ٻاهر آهي.

مرڪز جو استعمال ڪرڻ بنا، هڪ ٽپڪي P مان قوس جي ڇهڻي ليڪ ڪيڏ جو طريقو هيٺين مثال سان واضح ڪجي ٿو جڏهن ته ٽپڪو P قوس کان ٻاهر آهي.


مثال: هڪ قوس AB ڪٿو. مرڪز جو استعمال ڪرڻ بنا هڪ ٽپڪي P مان قوس AB جي ڇهڻي ليڪ ڪيو جڏهن ته P قوس کان ٻاهر آهي.



مليل: هڪ ٽپڪو P جيڪو قوس AB کان ٻاهر آهي. مرڪز جو استعمال ڪرڻ بنا ٽپڪي P مان قوس AB جي ڇهڻي ليڪ ڪيڏ.

جوڙجڪ جا ڏاڪا:

- (i) پنهنجي مرضي تي هڪ قوس AB ڪيو.
- (ii) $\widehat{AB}$ کان ٻاهر هڪ ٽپڪو P ڪٿو.
- (iii) $\overline{AP}$ ڪيو جيڪو ڏنل قوس کي ٽپڪي C تي ڪپي ٿو.
- (iv) $\overline{AP}$ جو عمودي اڌ ڪندڙ $\overline{ST}$ ڪيو جيڪو $\overline{AP}$ کي ٽپڪي O تي ڪپي ٿو.
- (v) مرڪز O ۽ رداس $m\overline{AO}$ يا $m\overline{OP}$ جي برابر ڪٽي، هڪ اڌ گول ڪيو.
- (vi) ٽپڪي C تي $\overline{AP}$ جي مٿان هڪ عمود $\overline{CF}$ ڪيو جيڪو اڌ گول کي ٽپڪي D تي ڪپي ٿو.
- (vii) مرڪز P ۽ رداس $m\overline{PD}$ جي برابر ڪٽي هڪ قوس ڪيو جيڪو $\widehat{AB}$ کي ٽپڪي Q تي ڪپي ٿو.
- (viii) $\overline{PQ}$ ڪيو. هاڻي $\overline{PQ}$ گهربل ڇهڻي ليڪ آهي.



29.3 (ii) هڪ ٽپڪي P مان، ڏنل گول جي ڇهڻي ليڪ ڪڍڻ، جڏهن:
 • P گول جي گهيري تي موجود آهي. • P گول کان ٻاهر موجود آهي.

صورت 1: جڏهن ٽپڪو P، گول جي گهيري تي موجود آهي.

هڪ ٽپڪي P مان ڏنل گول جي ڇهڻي ليڪ ڪڍڻ جو طريقو هيٺين مثال جي مدد سان واضح ڪجي ٿو جڏهن ته P گول جي گهيري تي موجود آهي.

مثال: 3.4cm رداس جو هڪ گول ڪيو جنهن جو مرڪز ٽپڪي O تي

آهي. گول جي گهيري جي ٽپڪي P مان گول جي ڇهڻي ليڪ ڪيو.

مليل: هڪ گول جنهن جو مرڪز O ۽ رداس 3.4cm آهي ۽ P ان جي گهيري جو هڪ ٽپڪو آهي.

گهريل: ٽپڪي P تي گول جي ڇهڻي ليڪ ڪيو:

جوڙجڪ جا ڏاڪا:

(i) ٽپڪي O کي مرڪز ڪڍي، 3.4cm رداس جو هڪ گول ڪيو.

(ii) گول جي گهيري تي هڪ ٽپڪو P کڻو

(ii) $\overline{OP}$ ڪيو.

(iii) ٽپڪي P تي، $\overline{OP}$ جي مٿان هڪ عمود $\overline{AB}$ ڪيو

هاڻي $\overline{AB}$ گهريل ڇهڻي ليڪ آهي.

صورت 2: جڏهن ٽپڪو P گول کان ٻاهر آهي.

هڪ ٽپڪي P مان گول جي ڇهڻي ليڪ ڪڍڻ جي طريقي کي هيٺين مثال جي مدد سان

واضح ڪيو ويو آهي جڏهن ته P گول کان ٻاهر موجود آهي.

مثال: مرڪز O سان، 3cm رداس وارو هڪ گول ڪيو. هڪ ٽپڪي P مان گول جي ڇهڻي ليڪ

ڪيو جڏهن ته P گول کان ٻاهر موجود آهي.

مليل: هڪ گول جنهن جو مرڪز O ۽ رداس 3cm آهي ۽ هڪ ٽپڪو P جيڪو گول کان ٻاهر آهي.

گهريل: هڪ ٽپڪي P مان گول جي ڇهڻي ليڪ ڪڍڻ جڏهن ته P گول کان ٻاهر آهي.

جوڙجڪ جا ڏاڪا:

(i) مرڪز O سان، 3cm جو هڪ گول ڪيو.

(ii) گول کان ٻاهر هڪ ٽپڪو P کڻو.

(iii) $\overline{OP}$ کي ڪيو

(iv) $\overline{OP}$ جو عمودي اڌ ڪندڙ $\overline{XY}$ ڪيو جيڪو ان کي ٽپڪي A تي ڪپي ٿو:

(v) مرڪز A ۽ رداس $m\overline{AO}$ جي برابر ڪڍي، هڪ اڌ گول ڪيو

جيڪو مليل گول کي ٽپڪي Q تي ڪپي ٿو.

(vi) $\overline{PQ}$ ڪيو.

هاڻي $\overline{PQ}$ گهريل ڇهڻي ليڪ آهي.

9.3 (iii) **هڪ گول جون ٻه ڇهڻي ليڪون ڪڍڻ جيڪي هڪ ٻئي سان ڏنل ڪنڊ تي ملن ٿيون:**


هڪ گول کڻو جنهن جو مرڪز O آهي $\overline{PS}$ ۽ $\overline{PT}$ گول جون ٻه

ڇهڻي ليڪون آهن جڏهن ته $\angle P$ ٻنهي ڇهڻي ليڪن جي وچ ۾ ڪنڊ آهي.

هتي $(\because \overline{OS} \perp \overline{PS}) m\angle PSO = 90^\circ$

۽ $(\because \overline{OT} \perp \overline{PT}) m\angle PTO = 90^\circ$

هاڻي چوڪنڊي $\angle PSOT$ ۾





$$m\angle P + m\angle PSO + m\angle O + m\angle PTO = 360^\circ$$

$$m\angle P + 90^\circ + m\angle O + 90^\circ = 360^\circ$$

$$\Rightarrow m\angle P + m\angle O = 180^\circ$$

$$\Rightarrow m\angle O = 180^\circ - m\angle P$$


يعني ته

يعني ته ميلاپ واري ٽپڪن کي ملائيندڙ مرڪزي ڪنڊ، ڇهڻي ليڪن جي وچ واري ڪنڊ جي سڀليمنٽ هوندي آهي. ان حقيقت کي استعمال ڪندي اسين گول جون ٻه ڇهڻي ليڪون ڪينداسين جيڪي هڪ ڏنل ڪنڊ تي ملن ٿيون. اهو طريقو هيٺين مثال جي مدد سان واضح ڪيو ويو آهي.

مثال: هڪ گول جون ٻه ڇهڻي ليڪون ڪيو جڏهن ته گول جو رداس 3.6cm ۽ مرڪز ٽپڪي O تي آهي ۽ ڇهڻي ليڪون هڪٻئي سان 60° ماپ واري ڪنڊ ٺاهن ٿيون.

ملي: هڪ گول جنهن جو مرڪز O ۽ رداس 3.6cm آهي جڏهن ته ڇهڻي ليڪن جي وچ واري ڪنڊ 60° آهي.

گهربل: مليل گول جون ٻه ڇهڻي ليڪون ڪيو جيڪي هڪٻئي سان 60° جي ڪنڊ تي ملن ٿيون. **جوڙجڪ جا ڏاڪا:**



(i) مرڪز O سان، 3.6cm رداس جو گول ڪيو

(ii) گول تي هڪ ٽپڪو A کڻو ۽ ان کي O سان ملايو.

(iii) 120° جي $\angle AOC$ ڪيو (يعني ته $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$)

اهڙي طرح جو OC مليل گول کي ٽپڪي B تي ڪڍي ٿو.

(iv) ٽپڪي A تي OA جي مٿان هڪ عمود AD ڪيو.

(v) ٽپڪي B تي، OB جي مٿان هڪ عمود BE ڪيو.

(vi) ٻئي AD ۽ BE هڪٻئي کي ٽپڪي P تي ڪپين ٿا.

اهڙي طرح AP ۽ BP گهربل ڇهڻي ليڪون آهن. اهڙي طرح جو $m\angle P = 60^\circ$.

مشق 29.4

1. هڪ ننڍو قوس PQ کڻو، مرڪز جو استعمال ڪرڻ بنا PQ جي ڇهڻي ليڪ ڪيو

جيڪا ان جي وچين ٽپڪي مان گذري.

2. هڪ وڏو قوس PQR ڪيو. مرڪز جو استعمال ڪرڻ بنا، PQR جي ڇهڻي ليڪ ڪيو

جيڪا ان جي ڇيڙي Q مان گذري.

3. هڪ ننڍو قوس XY کڻو. مرڪز جو استعمال ڪرڻ بنا، XY جي ڇهڻي ليڪ ڪيو جيڪا

ٽپڪي Z مان گذري جيڪو قوس کان ٻاهر آهي.

4. مرڪز C سان، 2.9cm رداس جو گول ڪيو. گول جي ٽپڪي P مان گول جي هڪ ڇهڻي ليڪ ڪيو.

5. مرڪز P سان، 3.2cm رداس جو هڪ گول ڪيو گول جي ڇهڻي ليڪ ڪيو ٽپڪي Q مان

جيڪو P کان 8cm جي فاصلي تي آهي.

6. مرڪز C ۽ 3.3 رداس جي گول جون ٻه ڇهڻي ليڪون ڪيو جيڪي هڪٻئي سان هيٺين

ڪنڊن تي ملن ٿيون. (i) 50° (ii) 63°



29.3 (iv) ٻن برابر گولن جون:

* سڌيءَ طرح گڏيل ڇهڻيون ليڪون يا ٻاهريون ڇهڻيون ليڪون ڪڍڻ

* آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون يا اندريون ڇهڻيون ليڪون ڪڍڻ

(a) ٻن برابر گولن جون سڌيءَ طرح گڏيل ڇهڻيون ليڪون يا ٻاهريون ڇهڻيون ليڪون ڪڍڻ

سڌي طرح گڏيل ڇهڻي ليڪ: (Direct Common Tangent):




هڪ مشترڪ ڇهڻي ليڪ کي ٻن گولن جي سڌي طرح گڏيل ڇهڻي ليڪ يا ٻاهرين ڇهڻي ليڪ چئبو جيڪڏهن اها ڏنل ٻن گولن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر کي نه ڪبي.

شڪل ۾، $\overline{PQ}$ سڌي طرح گڏيل ڇهڻي ليڪ آهي.

انهن ٻن گولن جي، جن جا مرڪز A ۽ B آهن. نوٽ ڪريو ته $\overline{PQ}$ نٿو ڪٽي $\overline{AB}$ کي. ٻن برابر گولن جون سڌي طرح گڏيل ڇهڻيون ليڪون ڪيڏ جو طريقو هيٺين مثال سان واضح ڪجي ٿو.

مثال: ٻن برابر گولن جون سڌي طرح گڏيل ڇهڻيون ليڪون ڪيو جڏهن ته انهن گولن جا مرڪز ٽپڪن A ۽ B تي آهن ۽ انهن مان هر هڪ جو رداس 3cm آهي اهڙي طرح جو $m\overline{AB} = 8cm$.

ملي: ٻه گول جن جا مرڪز ٽپڪن A ۽ B تي آهن ۽ هر هڪ جو رداس 3cm آهي اهڙي طرح جو



گهربل: ڏنل گولن تي ٻه سڌي طرح گڏيل ڇهڻيون ليڪون ڪيو

جوڙجڪ جا ڏاڪا:

- 8cm ڊيگهه جو $\overline{AB}$ ڪيو.
- ٻه برابر گول ٽپڪن A ۽ B تي ڪيو جن مان هر هڪ جو رداس 3cm آهي
- ٽپڪي A تي $\overline{AB}$ جي مٿان عمود $\overline{CD}$ ڪيو جيڪو ان گول کي ٻن ٽپڪن P ۽ S تي ڪٽي ٿو.
- ٽپڪي B تي $\overline{AB}$ جي مٿان عمود $\overline{EF}$ ڪيو جيڪو ان گول کي ٻن ٽپڪن Q ۽ T تي ڪٽي ٿو.
- $\overline{PQ}$ ۽ $\overline{ST}$ ڪيو

هاڻي $\overline{PQ}$ ۽ $\overline{ST}$ ڏنل گولن تي گهربل سڌي طرح گڏيل ڇهڻيون ليڪون آهن.

(b) ٻن برابر گولن جون گڏيل آڏيون ڇهڻيون ليڪون ڪيو:


آڏي گڏيل ڇهڻي ليڪ (Transverse Common Tangent):


هڪ مشترڪ ڇهڻي ليڪ کي ٻن گولن جي آڏي گڏيل ڇهڻي ليڪ يا اندرين ڇهڻي ليڪ چئبو جيڪڏهن اها ڏنل گولن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر کي ڪبي.

شڪل ۾ $\overline{PQ}$ آڏي گڏيل ڇهڻي ليڪ آهي ٻن گولن جي، جن جا مرڪز A ۽ B آهن.

نوٽ ڪريو ته $\overline{PQ}$ ڪٽي ٿو $\overline{AB}$ کي. ٻن برابر گولن جون آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون

ڪيڏ جو طريقو هيٺين مثال جي مدد سان واضح ڪيو ويو آهي.






مثال: ٻن برابر گولن جون ٻه آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون ڪيو جڏهن ته انهن گولن مان هر هڪ جو رداس 2.8cm آهي ۽ انهن جا مرڪز ٽپڪن A ۽ B تي آهن. اهڙي طرح جو $mAB = 7.8cm$.

طريقو- I

مليل: ٻه گول جن مان هر هڪ جو رداس 2.8cm آهي ۽ انهن جا مرڪز A ۽ B تي آهن اهڙي طرح جو $mAB = 7.8cm$

گهريل: مليل گولن جون ٻه آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون ڪيڙ.

جوڙجڪ جا ڏاڪا:



- (i) 7.8cm ڊيگهه جو $\overline{AB}$ ڪيو
- (ii) ٽپڪن A ۽ B تي ٻه گول ڪيو جن مان هر هڪ جو رداس 2.8cm آهي.
- (iii) $\overline{AB}$ جو عمودي اڌ ڪندڙ ڪيو جيڪو ان کي ٽپڪي O تي ڪپي ٿو.
- (iv) $\overline{OB}$ جو عمودي اڌ ڪندڙ ڪيو جيڪو ان کي ٽپڪي P تي ڪپي ٿو.
- (v) مرڪز P ۽ رداس mOP جي برابر ڪٽي هڪ گول ڪيو جيڪو مرڪز B واري گول کي ٽپڪن T ۽ Y تي ڪپي ٿو.
- (vi) $\overline{BT}$ ۽ $\overline{BY}$ ڪيو.
- (vii) گونين (Set squares) جو استعمال ڪندي $\overline{AZ} \parallel \overline{BT}$ ۽ $\overline{AS} \parallel \overline{BT}$ ڪيو.
- (viii) $\overline{ST}$ ۽ $\overline{YZ}$ ڪيو.


$\overline{ST}$ ۽ $\overline{YZ}$ گهريل آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون آهن.

طريقو- 2


مليل: ٻه گول جن مان هر هڪ جو رداس 2.8cm آهي ۽ انهن جا مرڪز A ۽ B آهن اهڙي طرح جو $mAB = 7.8cm$

گهريل: مليل گولن جون ٻه آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون ڪيڙ.

جوڙجڪ جا ڏاڪا:



- (i) 7.8cm ڊيگهه جو $\overline{AB}$ ڪيو.
- (ii) ٽپڪن A ۽ B تي ٻه گول ڪيو جن مان هر هڪ جو رداس 2.8cm آهي.
- (iii) $\overline{AB}$ کي ٽپڪي O تي اڌ ڪيو ۽ مرڪز O سان ۽ رداس mAO جي برابر ڪٽي هڪ گول ڪيو.
- (iv) مرڪز B ۽ (2.8cm جي پيٽ) 5.6cm جي برابر رداس ڪٽي هڪ گول ڪيو جيڪو مرڪز O واري پهرين گول کي ٽپڪن L ۽ M تي ڪپي ٿو.
- (v) $\overline{BM}$ ۽ $\overline{BL}$ ڪيو جيڪي مرڪز B واري ننڍي گول کي ترتيبوار ٽپڪن T ۽ y تي ڪپين ٿا.
- (vi) گونين (Set squares) جو استعمال ڪندي $\overline{AS} \parallel \overline{BT}$ ۽ $\overline{AZ} \parallel \overline{BY}$ ڪيو.



$\overrightarrow{ST}$ ۽ $\overrightarrow{YZ}$ گهريل آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون آهن.

29.3 (v) ٻه غير مساوي گولن جون:

* سڌي طرح گڏيل ڇهڻيون ليڪون يا ٻاهريون ڇهڻيون ليڪون ڪيڏ.

* آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون يا اندريون ڇهڻيون ليڪون ڪيڏ.

(a) ٻن غير مساوي گولن جون سڌي طرح گڏيل ڇهڻيون ليڪون يا ٻاهريون ڇهڻيون ليڪون ڪيڏ:

ٻن غير مساوي گولن جون سڌي طرح ڇهڻيون ليڪون ڪيڏ جي طريقي کي سکڻ لاءِ هيٺيون مثال مناسب آهي.

مثال: ٻن ڏنل گولن جون سڌي طرح گڏيل ڇهڻيون ليڪون ڪيو جن جا رداس 3.4cm ۽ 2.1cm آهن جڏهن ته انهن جي مرڪزن جي وچ وارو فاصلو 7.5cm آهي.

طريقيو- 1

مليل: ٻه گول جن جا مرڪز A ۽ B آهن ۽ انهن جا رداس ترتيبوار 3.4cm ۽ 2.1cm آهن اهڙي طرح جو $mAB = 7.5cm$

گهريل: ڏنل گولن جون سڌي طرح گڏيل ڇهڻيون ليڪون ڪيڏ

جوڙجڪ جا ڏاڪا:

(i) 7.5cm ڊيگهه جو $\overline{AB}$ ڪيو.

(ii) مرڪز A ۽ B سان، ترتيبوار رداس 3.4cm ۽ 2.1cm

ڪٽي ٻه گول ڪيو.

(iii) $\overline{AB}$ کي ٽپڪي O تي اڌ ڪيو ۽ مرڪز O سان هڪ

گول ڪيو جنهن جو رداس mAO جي برابر آهي.

(iv) وڏي گول جي مرڪز A سان، رداس 1.3cm (يعني

$3.4 - 2.1 = 1.3$) ڪٽي هڪ گول ڪيو جيڪو

پهرين گول کي ٽپڪن C ۽ D تي ڪپي ٿو.

(v) $\overline{AC}$ ڪيو ۽ ان کي وڌايو ته جيئن هي ڏنل هر

مرڪز گول کي ٽپڪي Q تي ڪپي.

(vi) $\overline{AD}$ ڪيو ۽ ان کي وڌايو ته جيئن هي ڏنل

هر مرڪز گول کي ٽپڪي T تي

(vii) گونين (Set squares) جو استعمال ڪندي $\overline{BP} \parallel \overline{AQ}$ ۽ $\overline{BS} \parallel \overline{AT}$ ڪيو.

(viii) $\overline{PQ}$ ۽ $\overline{ST}$ ڪيو.

هاڻي $\overline{PQ}$ ۽ $\overline{ST}$ گهريل سڌي طرح گڏيل ڇهڻيون

ليڪون آهن.


طريقيو- 2


مليل: ٻه گول جن جا مرڪز A ۽ B آهن انهن جا ترتيبوار رداس

3.4cm ۽ 2.1cm آهن اهڙي طرح جو $mAB = 7.5cm$

گهريل: ڏنل گولن تي سڌي طرح گڏيل ڇهڻيون

ليڪون ڪيڏ.






جوڙجڪ جا ڏاڪا:

- (i) 7.5cm ڊيگهه جو $\overline{AB}$ ڪڍو
- (ii) ٽپڪن B ۽ A تي ترتيبوار رداس 3.4cm ۽ 2.1cm جا گول ڪڍو.
- (iii) مرڪز A واري گول تي ڪو ٽپڪو C ڪٽو ۽ $\overline{AC}$ ڪڍو.
- (iv) گوئين (Set squares) جو استعمال ڪندي $\overline{BD} \parallel \overline{AC}$ ڪڍو.
- (v) $\overline{CD}$ ڪڍو ۽ ان کي D کان پري وڌايو.
- (vi) $\overline{AB}$ کي وڌايو ته جيئن هو $\overline{CD}$ کي ٽپڪي M تي ڪپي.
- (vii) مرڪز M ۽ رداس $m\overline{MB}$ جي برابر ڪٿي هڪ قوس ڪڍو جيڪو مرڪز B واري گول کي ٽپڪن P ۽ Q تي ڪپي ٿو.
- (viii) $\overline{MP}$ ڪڍو ۽ ان کي وڌايو ته جيئن اهو بيٺي گول سان S تي ملي.
- (ix) $\overline{MQ}$ ڪڍو ۽ ان کي وڌايو ته جيئن اهو بيٺي گول سان ٽپڪي T تي ملي.

(b) ٻن غير مساوي گولن جون آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون يا اندريون ڇهڻيون ليڪون ڪڍڻ:
اسين ٻن غير مساوي گولن جون آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون يا اندريون ڇهڻيون



ليڪون ڪڍڻ جو طريقو هيٺين مثال سان واضح ڪريون ٿا.
مثال: ٻن گولن جون آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون ڪڍو

جڏهن ته گولن جا مرڪز A ۽ B ۽ انهن جا رداس 3.1cm ۽ 1.9cm آهن اهڙي طرح جو انهن جي مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو 7.6cm آهي.

مليل: ٻه گول جن جا مرڪز A ۽ B ۽ انهن جا ترتيبوار

رداس 3.1cm ۽ 1.9cm آهن جڏهن $m\overline{AB} = 7.6cm$
گهربل: ٻن ڏنل گولن جون آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون ڪڍڻ.

جوڙجڪ جا ڏاڪا:

- (i) 7.6cm ڊيگهه جو $\overline{AB}$ ڪڍو.
- (ii) ٽپڪن A ۽ B تي ترتيبوار رداس 3.1cm ۽ 1.9cm جا گول ڪڍو
- (iii) ٽپڪي O تي $\overline{AB}$ کي اڌ ڪريو ۽ مرڪز O ۽ رداس $m\overline{OA}$ جي برابر ڪٿي هڪ گول ڪڍو.
- (iv) مرڪز A (وڏي گول جو مرڪز) ۽ رداس 5cm (يعني $3.1cm + 1.9cm = 5cm$) سان هڪ گول ڪڍو جيڪو پهرين گول کي ٽپڪن P ۽ Q تي ڪپي ٿو.
- (v) $\overline{AP}$ ڪڍو جيڪو ڏنل وڏي گول کي ٽپڪي S تي ڪپي ٿو.
- (vi) $\overline{AQ}$ ڪڍو جيڪو ڏنل وڏي گول کي ٽپڪي L تي ڪپي ٿو.
- (vii) $\overline{BT} \parallel \overline{AP}$ ۽ $\overline{BM} \parallel \overline{AQ}$ ڪڍو.
- (viii) $\overline{LM}$ ۽ $\overline{ST}$ ڪڍو

هاڻي $\overline{LM}$ ۽ $\overline{ST}$ گهربل آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون آهن.




29.3 (vi)

- * ٻن غير مساوي ڇهنڌڙ گولن جي ڇهڻي ليڪ ڪيڏ.
- * ٻن غير مساوي ڪپينڌڙ گولن جي ڇهڻي ليڪ ڪيڏ.
- (a) ٻن غير مساوي ڇهنڌڙ گولن جي ڇهڻي ليڪ ڪيڏ.

هتي ٻه صورتون آهن

صورت 1: جڏهن گول اندريان ڇهن ٿا.



اهو طريقو هيٺين مثال سان واضح ڪجي ٿو.
مثال: ٻن غير مساوي گولن جي ڇهڻي ليڪ ڪيو، ان گولن جا رداس 3cm ۽ 2cm ۽ مرڪز ترتيبوار A ۽ B آهن جڏهن ته ٻئي گول اندريان ڇهن ٿا.

ٻه گول جن جا مرڪز A ۽ B ۽ ترتيبوار رداس 3cm ۽ 2cm آهن. اهي گول اندريان ڇهن ٿا.

گهربل: انهن گولن تي هڪ ڇهڻي ليڪ ڪيڏ جوڙجڪ جا ڏاڪا:


- (i) ٽپڪي A کي مرڪز ڪئي، 3cm رداس جو وڏو گول ڪيو.
- (ii) ان گول تي ڪو ٽپڪو P ڪٽو ۽ $\overline{AP}$ ڪيو
- (iii) ٽپڪي P کان 2cm جي فاصلي تي $\overline{AP}$ تي هڪ ٽپڪو B ڪٽو.
- (iv) مرڪز B ۽ رداس 2cm ڪئي هڪ گول ڪيو جيڪو وڏي گول کي ٽپڪي P تي ڇهي ٿو.
- (v) ميلاپ واري ٽپڪي P تي $\overline{AP}$ جي مٿان هڪ عمود $\overrightarrow{ST}$ ڪيو. هاڻي $\overrightarrow{ST}$ گهربل ڇهڻي ليڪ آهي.

صورت 2: جڏهن گول ٻاهريان ڇهن ٿا.

اهو طريقو هيٺين مثال ۾ واضح ڪيو ويو آهي.


مثال: هڪ ڇهڻي ليڪ ڪيو ٻن غير مساوي گولن تي جن جا مرڪز A ۽ B ۽ انهن جا رداس ترتيبوار 3.5cm ۽ 2.2cm آهن جڏهن ته ٻئي گول هڪٻئي کي ٻاهريان ڇهن ٿا.

مليل: ٻه گول جن جا مرڪز A ۽ B ۽ انهن جا رداس ترتيبوار 3.5cm ۽ 2.2cm جڏهن ته گول هڪٻئي کي ٻاهريان ڇهن ٿا.




گهربل: انهن گولن جي هڪ ڇهڻي ليڪ ڪيڏ جوڙجڪ جا ڏاڪا:

- (i) مرڪز A سان 3.5cm رداس جو هڪ گول ڪيو
- (ii) گول تي هڪ ٽپڪو P ڪٽو.
- (iii) $\overline{AP}$ ڪيو ۽ ان کي ٽپڪي B تائين وڌايو اهڙي طرح جو $m\overline{PB} = 2.2cm$
- (iv) مرڪز P ۽ رداس 2.2cm سان هڪ گول ڪيو جيڪو پهرين گول کي ٽپڪي P تي ڇهي ٿو.
- (v) ميلاپ واري ٽپڪي P تي $\overline{AP}$ جي مٿان هڪ عمود $\overrightarrow{ST}$ ڪيو: هاڻي $\overrightarrow{ST}$ گهربل ڇهڻي ليڪ آهي.



(b) **ٻن غير مساوي ڪپينڊڙ گولن جي هڪ ڇهڻي ليڪ ڪيڻ:**



مثال:

ان جو طريقو هيٺين مثال سان واضح ڪيل آهي.
ٻن غير مساوي ڪپينڊڙ گولن جي هڪ ڇهڻي
ليڪ ڪيو جڏهن ته انهن گولن جا مرڪز A ۽ B ۽
انهن جا ترتيبوار رداس 4cm ۽ 2cm آهن اهڙي طرح
جو $mAB = 5.5cm$

مليل:

ٻه غير مساوي ڪپينڊڙ گول جن جا مرڪز A ۽ B ۽
انهن جا ترتيبوار رداس 4cm ۽ 2cm آهن جڏهن ته
 $mAB = 5.5cm$

گهريل: ٻنهي گولن جي هڪ ڇهڻي ليڪ ڪيڻ
جوڙجڪ جا ڏاڪا:

- (i) 5.5cm ڊيگهه جو $\overline{AB}$ ڪيو.
- (ii) مرڪز A ۽ B سان، ترتيبوار رداس 4cm ۽ 2cm جا گول ڪيو.
- (iii) مرڪز A (وڏي گول جو مرڪز) ۽ 2cm (يعني $4cm - 2cm = 2cm$) رداس جو هڪ گول ڪيو.
- (iv) $\overline{AB}$ کي ٽپڪي O تي اڌ ڪريو. مرڪز O ۽ رداس mAO جي برابر ڪٽي هڪ گول ڪيو جيڪو مرڪز A واري ننڍي گول کي ٽپڪن C ۽ D تي ڪٽي ٿو.
- (v) $\overline{AC}$ ڪيو ۽ ان کي وڌايو ته جيئن اهو مرڪز A واري وڏي هڪ مرڪز گول سان ٽپڪي P تي ملي.
- (vi) گونين (Set squares) جو استعمال ڪندي $\overline{BQ} \parallel \overline{AP}$ ڪيو.
- (vii) $\overline{PQ}$ ڪيو. هاڻي $\overline{PQ}$ گهريل ڇهڻي ليڪ آهي.

(vii) 29.3 **هڪ گول ڪيڻ جيڪو.**

- * ڏنل ڪنڊ جي ٻنهن ٻانهن کي ڇهي.
- * ميلاپ ڏانهن مائل ٿيندڙ ٻن ليڪن کي ڇهي ۽ انهن ليڪن جي وچ ۾ ڪنهن ٽپڪي مان گذري.
- * ميلاپ ڏانهن مائل ٿن ليڪن کي ڇهي

(a) **هڪ گول ڪيڻ جيڪو ڏنل ڪنڊ جي ٻنهي ٻانهن کي ڇهي ٿو.**


اسين، هڪ گول جيڪو ڏنل ڪنڊ جي ٻنهي ٻانهن کي ڇهي ڪيڻ، جو طريقو هيٺين
مثال سان واضح ڪريون ٿا.

مثال: هڪ گول ڪيو جيڪو 30° ماپ واري ڪنڊ ABC جي ٻنهي ٻانهن کي ڇهي ٿو.


مليل: 30° ماپ واري هڪ ڪنڊ ABC.

گهريل: هڪ گول ڪيڻ جيڪو ڏنل ڪنڊ جي ٻنهي ٻانهن کي ڇهي.

جوڙجڪ جا ڏاڪا:




- (i) 30° جي هڪ $\angle ABC$ ڪيو.
- (ii) $\angle ABC$ جو اندريون اڌ ڪندڙ $\overline{BD}$ ڪيو.
- (iii) $\overline{BD}$ تي ڪو ٽپڪو P ڪٽيو.
- (iv) ٽپڪي P مان، $\overline{BA}$ جي مٿان هڪ عمود $\overline{PQ}$ ڪيو جيڪو ان کي ٽپڪي E تي ڪٽي ٿو.
- (v) مرڪز P ۽ رداس mPE جي برابر ڪٽي هڪ گول ڪيو جيڪو $\overline{BA}$ ۽ $\overline{BC}$ کي ڇهي ٿو. اهو گهريل گول آهي.




(b) هڪ گول ڪيڊ جيڪو ميلاپ ڏانهن مائل ٿيندڙ ٻن ليڪن کي چُهِي ۽ انهن ليڪن جي وچ ۾ ڪنهن ٽپڪي مان گذري.

ميلاپ ڏانهن مائل ٿيندڙ ليڪون (Converging Lines):



ٻه يا وڌيڪ ليڪون جيڪي هڪٻئي جي ويجهو ٿينديون وڃن ۽ آخر ڪار ڪنهن ٽپڪي تي وڃي ملن. انهن ليڪن کي ميلاپ ڏانهن مائل ٿيندڙ ليڪون چئبو آهي پر واري شڪل ۾ به ليڪون AB ۽ CD ميلاپ ڏانهن مائل ٿيندڙ ليڪون آهن ۽ اهي آخرڪار هڪ ٽپڪي P تي ملن ٿيون.

مثال:



هڪ گول ڪيو جيڪو ٻن ميلاپ ڏانهن مائل ٿيندڙ ٻن ليڪن $\overline{AB}$ ۽ $\overline{CD}$ جي وچ واري ٽپڪي P مان گذري ۽ انهن ٻنهي ليڪن کي چُهِي ٿو.

مليل:

ٻه ميلاپ ڏانهن مائل ٿيندڙ ليڪون AB ۽ CD ۽ انهن جي وچ وارو هڪ ٽپڪو P

گهريل:

هڪ گول ڪيڊ جيڪو ٽپڪي P مان گذري ٿو ۽ ڏنل ٻنهي ميلاپ ڏانهن مائل ٿيندڙ ليڪن کي چُهِي ٿو.

جوڙجڪ جا ڏاڪا:

- (i) ميلاپ ڏانهن مائل ٿيندڙ ٻه ليڪون AB ۽ CD ڪيو جيڪي ٽپڪي E تي ملن ٿيون.
- (ii) انهن ٻنهي ليڪن جي وچ ۾ هڪ ٽپڪو P ڪٿو.
- (iii) $\angle E$ جو اندريون اڌ ڪندڙ $\overline{EF}$ ڪيو.
- (iv) $\overline{EF}$ تي ڪو ٽپڪو G ڪٿو.
- (v) ٽپڪي G مان، مرڪز $\overline{EC}$ جي مٿان هڪ عمود $\overline{GL}$ ڪيو جيڪو ان سان ٽپڪي M تي ملي ٿو.
- (vi) مرڪز G ۽ رداس $m\overline{GM}$ جي برابر ڪٿي، هڪ گول ڪيو جيڪو ٻنهي ميلاپ ڏانهن مائل ٿيندڙ ليڪن کي چُهِي ٿو.
- (vii) $\overline{EP}$ ڪيو جيڪو ان گول کي ٽپڪي N تي ڪپي ٿو.
- (viii) $\overline{NG}$ ڪيو. $\overline{PQ} \parallel \overline{NG}$ پڻ ڪيو.
- (ix) $\overline{PQ}$ ڪپي ٿو $\overline{EF}$ کي ٽپڪي O تي.
- (x) مرڪز O ۽ رداس $m\overline{OP}$ جي برابر ڪٿي، هڪ گول ڪيو جيڪو ٽپڪي P مان گذري ٿو ۽ ٻنهي ميلاپ ڏانهن مائل ٿيندڙ ليڪن کي چُهِي ٿو.

اهو گهريل گول آهي.

(c) هڪ گول ڪيڊ جيڪو ٽن ميلاپ ڏانهن مائل ٿيندڙ ليڪن کي چُهِي.

ڪنهن مٿاڇري (Plane) ۾ هڪ اهڙو گول ڪيڊ جيڪو ٽن ميلاپ ڏانهن مائل ٿيندڙ ليڪن کي چُهِي اهو ممڪن نه آهي. پر اهو خلا (Space) ۾ ممڪن آهي جيڪو هن ڪتاب جي دائري کان ٻاهر آهي.



مشق 29.5

1. ٻه برابر گول ڪڍو جنهن مان هر هڪ جو رداس 3.3cm ۽ مرڪز ٽپڪن A ۽ B تي آهن.
 اهڙي طرح جو $m\overline{AB} = 7.8\text{cm}$.
 (a) انهن گولن جون سڌيءَ طرح گڏيل ڇهڻيون ليڪون ڪڍو.
 (b) انهن گولن جون آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون ڪڍو.
2. ٻه غير مساوي گول ڪڍو جن جا رداس 3.3cm ۽ 2.1cm آهن ۽ مرڪز ترتيبوار ٽپڪن A ۽ B تي آهن. اهڙي طرح جو $m\overline{AB} = 8\text{cm}$.
 (a) انهن گولن جون سڌي طرح گڏيل ڇهڻيون ليڪون ڪڍو.
 (b) انهن گولن جون آڏيون گڏيل ڇهڻيون ليڪون ڪڍو.
3. ٻن غير مساوي گولن جي هڪ ڇهڻي ليڪ ڪڍو. انهن گولن جا مرڪز A ۽ B ۽ ترتيبوار رداس 3.8cm ۽ 2.2cm آهن. جڏهن ته
 (i) گول اندريان ڇهن ٿا.
 (ii) گول ٻاهريان ڇهن ٿا.
 (iii) گول هڪٻئي کي ڪپين ٿا ۽ $m\overline{AB} = 5.6\text{cm}$.
4. هڪ گول ڪڍو جيڪو ڏنل ڪنڊن جي ٻنهي پاسن کي ڇهي ٿو. (i) 35° (ii) 40°
5. هڪ گول ڪڍو جيڪو هڪ ٽپڪي M مان گذري جيڪو ٻن ميلاپ ڏانهن مائل ليڪن ST ۽ PQ جي وچ ۾ موجود آهي اهڙي طرح جو گول انهن ٻنهي ليڪن کي پڻ ڇهي ٿو.


جائزي واري مشق 29

درست جواب تي نشان لڳايو.

- (i) غير پور وچوت _____ جا عمودي اڌ ڪندڙ گول جي مرڪز تي ڪپين ٿا.
 (a) رداسي ٽڪر (b) زه (c) ڇهڻيون ليڪون (d) ڪوبه نه
- (ii) هڪڙي ٽپڪي مان _____ گول گذري سگهن ٿا.
 (a) هڪ (b) ٻه (c) ٽي (d) لا محدود
- (iii) ٽن غير هم ليڪي ٽپڪن مان _____ گول گذري سگهن ٿا.
 (a) هڪ (b) ٻه (c) ٽي (d) لا محدود
- (iv) پور پاسو گهڻ ڪنڊي جون _____ ڪنڊون ماپ ۾ برابر هونديون آهن.
 (a) اندريون (b) ٻاهريون (c) ٻئي a ۽ b (d) ڪوبه نه
- (v) پور پاسو ڇهه ڪنڊي جي هر هڪ اندرين ڪنڊ _____ جي برابر هوندي آهي.
 (a) 90° (b) 108° (c) 120° (d) 135°
- (vi) هڪ گول جيڪو ٽڪنڊي جي سڀني پاسن کي ڇهي، ان کي _____ چئبو آهي.
 (a) گهيڙيندڙ گول (b) گهيڙيل گول (c) ٻاهريون گول (d) ٽگولو (Tricircle)
- (vii) هڪ گول جيڪو ٽڪنڊي جي هڪ پاسي کي ٻاهريان ۽ ٻن وڌيل پاسن کي اندريان ڇهي ته ان کي _____ چئبو آهي.
 (a) ٻاهريون گول (b) گهيڙيندڙ گول (c) گهيڙيل گول (d) ٽگولو
- (viii) گهيڙيل گول جي مرڪز کي _____ چئبو آهي.
 (a) ٻاهريون مرڪز (b) اندريون مرڪز (c) مڌياني مرڪز (d) عمودي مرڪز



- (ix) ٽڪنڊي جي پاسن جا عمودي اڌ ڪندڙ هڪٻئي کي _____ تي ڪپين ٿا.
 (a) گهيريٽڙ مرڪز (b) مڌياني مرڪز (c) اندريون مرڪز (d) ٻاهريون مرڪز
- (x) ٽڪنڊي جي ڪنڊن جي اندرين اڌ ڪندڙن جي ميلاب واري ٽپڪي کي _____ چئبو آهي.
 (a) عمودي مرڪز (b) مڌياني مرڪز (c) اندريون مرڪز (d) ٻاهريون مرڪز
- (xi) جيڪڏهن هڪ پور پاسو ڇهه ڪنڊو گول ۾ گهيريٽل آهي ته پوءِ ڇهه ڪنڊي جي هر هڪ پاسي جي ڊيگهه گول جي رداس کان:
 $\leq$ (d) $=$ (c) $>$ (b) $<$ (a)
- (xii) ميلاب واري ٽپڪي تي ڇهڻي ليڪ ۽ رداسي ٽڪر جي وچ ۾ ڪنڊ هوندي آهي.
 (a) عڪسي (b) سوڙهي (c) ويڪري (d) گوني
- (xiii) ميلاب واري ٽپڪن کي ملائيندڙ گول جي مرڪزي ڪنڊ، ڇهڻي ليڪن جي ڪنڊ جو _____ هوندي آهي.
 (a) ڪعب (b) چورس (c) سڀليمينٽ (d) ڪامپليمينٽ
- (xiv) _____ ڇهڻيون ليڪون، گولن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر کي نه ڪپنديون آهن.
 (a) عمودي (b) ٻاهريون (c) آڏيون (d) اندريون
- (xv) ٻن برابر گولن جون سڌي طرح گڏيل ڇهڻيون ليڪون _____ هونديون آهن.
 (a) ڪپيندڙ (b) نهڪندڙ (c) برابر (d) پورو چوٽ
- (xvi) ٻن برابر گولن جون _____ گڏيل ڇهڻيون ليڪون گولن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر کي وڇين ٽپڪي تي ڪپين ٿيون.
 (a) سڌي طرح (b) آڏيون (c) ٻاهريون (d) پورو چوٽ
- (xvii) جيڪڏهن 5cm ۽ 2cm رداس وارا ٻه گول هڪٻئي کي ٻاهريان ڇهن ٿا ته پوءِ انهن جي مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو _____ آهي.
 7 cm (d) 3 cm (c) 10 cm (b) 5 cm (a)
- (xviii) جيڪڏهن 5cm ۽ 2cm رداس وارا ٻه گول هڪٻئي کي اندريان ڇهن ٿا ته پوءِ انهن جي مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو _____ آهي.
 7 cm (d) 3 cm (c) 10 cm (b) 5 cm (a)
- (xix) ٻه يا وڌيڪ ميلاب واري ٽپڪي ڏانهن مائل ٿيندڙ ليڪون هميشه هڪٻئي کي _____ تي ڪپين ٿيون.
 (a) هڪ کان وڌيڪ ٽپڪن (b) هڪڙي ٽپڪي (c) ٻن ٽپڪن (d) هڪ کان وڌيڪ ٽپڪن
- (xx) ٽي يا وڌيڪ پاسن واري بند شڪل کي _____ چئبو آهي.
 (a) پنج ڪنڊو (b) ڇهه ڪنڊو (c) ست ڪنڊو (d) گهڻ ڪنڊو



خلاصو

➤ ٻن غير پورو چوٽ زه عمودي اڌ ڪنڊڙ ڪيڏ سان گول جي مرڪز جو هنڌ معلوم ڪري سگهجي ٿو. اهي اڌ ڪنڊڙ هڪٻئي کي گول جي مرڪز تي ڪپين ٿا.

➤ ٽن غير هم ليڪي ٽپڪن مان رڳو هڪ ئي گول ڪڍي سگهجي ٿو.

➤ مرڪز معلوم ڪرڻ بنا، هڪ گول کي پورو ڪري سگهجي ٿو جڏهن هڪ قوس مليل هجي ۽ اهو پور پاسو گهڻ ڪنڊي جي مدد سان ٿيندو.

➤ گهيڙيندڙ گول هميشه گهڻ ڪنڊي جي سڀني چوٽين مان گذرندو آهي.

➤ ڪنهن ٽڪنڊي جو گهيڙيل گول هميشه ٽڪنڊي جي سڀني پاسن کي چُهِي ٿو.

➤ ٽڪنڊي جو ٻاهريون گول ٽڪنڊي جي هڪ پاسي کي ٻاهريان ۽ ٻن وڌيل پاسن کي اندران چُهِي ٿو.

➤ ٽڪنڊي جا ٽي ٻاهريان گول نهي سگهجن ٿا.

➤ چُهِي ليڪ اها ليڪ آهي جيڪا گول کي رڳو هڪ ئي ٽپڪي تي چُهِي ٿي.

➤ ڪپيندڙ ليڪ هميشه گول کي ٻن ٽپڪن تي ڪپيندي آهي.

➤ ميلاب واري ٽپڪي تي گول جي چُهِي ليڪ هميشه رداسي ٽڪر تي عمود هوندي آهي.

➤ گول جي گهيڙي جي هڪ ٽپڪي مان رڳو هڪ ئي چُهِي ليڪ ڪڍي سگهجي ٿي.

➤ گول جي ڪنهن ٻاهرين ٽپڪي کان گول جون رڳو ٻه چُهِيون ليڪون ڪڍي سگهجن ٿيون.

➤ ميلاب واري ٽپڪن کي ملائيندڙ گول جي مرڪزي ڪنڊ، گول جي چُهِي ليڪن جي وچ واري ڪنڊ جو سڀليمنت هوندي آهي.

➤ جيڪڏهن ڪا ليڪ هڪ کان وڌيڪ گولن جي چُهِي ليڪ آهي ته پوءِ ان کي مشترڪ چُهِي ليڪ چئبو آهي.

➤ ٻن مليل گولن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر کي گول جون سڌي طرح گڏيل چُهِيون ليڪون نه ڪپنديون آهن.

➤ مليل گولن جون آڏيون گڏيل چُهِيون ليڪون هميشه انهن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر کي ڪپنديون آهن.

➤ جيڪڏهن ٻه گول هڪٻئي کي ٻاهريان چُهِن ٿا ته پوءِ انهن جي مرڪزن جي وچ وارو فاصلو انهن جي رداسن جي جوڙ آيت جي برابر هوندو آهي.

➤ جيڪڏهن ٻه گول هڪ ٻئي کي اندريان چُهِن ٿا ته پوءِ انهن جي مرڪزن جي وچ وارو فاصلو انهن جي رداسن جي فرق جي برابر هوندو آهي.

➤ ميلاب واري ٽپڪي ڏانهن مائل ٿيندڙ ليڪون هڪٻئي جي ويجهو ٿينديون رهنديون آهن ۽ آخرڪار هڪ ٽپڪي تي ملن ٿيون.



يونٽ


ٽرگناميٽري جو تعارف

INTRODUCTION TO TRIGONOMETRY

شاگردن جي سکيا جا حاصلات

هي يونٽ پڙهڻ کانپوءِ شاگرد ان قابل ٿي ويندا ته:

- ◀ بنياد 60 واري عددي نظام ۾ ڪنڊ جي ماپ ڪري سگهن. (ڊگريون، منٽ ۽ سيڪنڊ).
- ◀ ڊگري، منٽ ۽ سيڪنڊ ($D^{\circ} M' S''$) ۾ ڏنل ڪنڊ کي ڏهائي صورت (ڏهائي جي پن درجن تائين) ۾ مٽائي سگهن ۽ ان جو ابتڙ ڪن.
- ◀ ريڊيان (Radian) کي بيان ڪن (گولائي واري نظام ۾ ڪنڊ جي ماپ) ۽ ريڊيان ۽ ڊگري ماپن جي وچ ۾ تعلق کي ثابت ڪن.
- ◀ $l=r\theta$ وارو اصول قائم ڪن جڏهن ته گول جو رداس r ، قوس جي ڊيگهه l ، ۽ ريڊيان ۾ ماپيل مرڪزي ڪنڊ θ آهي.
- ◀ ثابت ڪريو ته گول جي سيڪٽر جي ايراضي θ يا $\frac{1}{2}lr$ آهي.
- ◀ بيان ۽ سڃاڻپ ڪن.
- a. عام ڪنڊون (هر انتهائي ڪنڊون) (conterminal angles)
- b. معياري بيهڪ ۾ ڪنڊ
- ◀ چوٿاين ۽ چوٿائي ڪنڊن جي سڃاڻپ ڪن
- ◀ ٽرگناميٽري نسبتن ۽ انهن جي اُبتڙن کي ايڪي واري گول جي مدد سان بيان ڪن
- ◀ 30° ، 45° ۽ 60° جي ٽرگناميٽري نسبتن جي قيمتن جو دؤر ڪن
- ◀ مختلف چوٿن ۾ ٽرگناميٽري نسبتن جي نشانين جي سڃاڻپ ڪن.
- ◀ باقي رهيل ٽرگناميٽري نسبتن جون قيمتون لهن جيڪڏهن ڪا هڪ ٽرگناميٽري نسبت مليل هجي.
- ◀ 0° ، 90° ، 180° ۽ 270° جي ٽرگناميٽري نسبتن جون قيمتون لهن.
- ◀ ٽرگناميٽري واريون آئيڊنٽيٽين يا بنيادي فارمولن کي ثابت ڪن ۽ مختلف ٽرگناميٽري وارا تعلق ظاهر ڪن.
- ◀ اُوچائي ۽ هيٺاهين واريون ڪنڊون لهن
- ◀ اُوچائي ۽ هيٺاهين وارن ڪنڊن تي مشتمل عام زندگي جا مسئلا حل ڪن.





تعارف:

لفظ ٽرگناميٽري يوناني لفظن ”tri“ (ٽي) ”gono“ (ڪنڊون) ۽ ”Metron“ (ماپ) مان ٺهيل آهي. ٽرگناميٽري جي لغوي معنيٰ آهي: ٽڪنڊي جي ماپ. رياضي جي اها شاخ يونانين 330 ق. م ۾ متعارف ڪرائي ان جو واسطو ٽڪنڊي جي حل سان آهي. ان جو گهڻو استعمال طبيعيات، جهاز راني، فلڪيات، نقشي سازي وغيره ۾ ٿيندو آهي.

30.1 هڪ ڪنڊ جي ماپ (Measurement of an Angle):


ڪنڊ اهڙن ٻن شعاعن جو ميلاپ آهي جن جو منڍ (چوٽي) ساڳيو هجي. شعاعن مان هڪ کي شروعاتي پاسو (initial side) چئبو آهي. ۽ ٻئي کي ”انتهائي پاسو“ (terminal side) چئبو آهي. ڪنڊ جي ماپ شروعاتي پاسي کان انتهائي پاسي ڏانهن ڦيري جي رخ تي منحصر ڪندي آهي. گهڙي جي اُبتي ڦيڙي واري رخ ۾ ماپيل ڪنڊ کي ”مثبت ڪنڊ“ ڪٽبو آهي جيئن شڪل (a) ۾ ڏيکاريل آهي ۽ گهڙي جي سبتي ڦيڙي واري رخ ۾ ماپيل ڪنڊ کي منفي ڪنڊ ڪٽبو آهي جيئن شڪل (b) ۾ ڏيکاريل آهي. نوٽ: شعاعن کي ڪنڊ جون ٻانهون پڻ چئبو آهي ۽ انهن جي مشترڪ منڍ کي ڪنڊ جي چوٽي چئبو آهي.



هڪ ڪنڊ معياري بيهڪ (Standard position) ۾ چورائبي جيڪڏهن ان جو شروعاتي حصو واڌو x -axis ۽ ان جي چوٽي اصل ٽپڪي (origin) تي هجي.

30.1 (i) بنياد 60 واري عددي نظام ۾ ڪنڊ جي ماپ ڪرڻ (ڊگريون، منٽ ۽ سيڪنڊ):

جيڪڏهن شروعاتي پاسو (ٻانهن) $\overrightarrow{OA}$ گهڙي جي اُبتي رستي واري رخ ۾ هڪ ڦيرو مڪمل ڪري ٿو ته پوءِ ٺهيل ڪنڊ 360 ڊگريون يا 360° واري ڪنڊ ڪوٺبي يعني ته گول جو گهيرو 360 برابر قوسن ۾ ورهائجي ٿو. گول جي مرڪز تي اهڙي قوس سان ٺهيل ڪنڊ هڪ ڊگري ڪوٺبي آهي ان کي 1° سان ظاهر ڪبو آهي. هر هڪ ڊگري 60 برابر حصن ۾ ورهائجي ٿي ۽ هر هڪ حصي کي هڪ منٽ چئبو آهي ۽ ان کي $1'$ سان ظاهر ڪبو آهي. ساڳي ريت هڪ منٽ به 60 برابر حصن ۾ ورهائجي ٿو ۽ هر هڪ حصي کي 1 سيڪنڊ چئبو آهي ۽ ان کي $1''$ سان ظاهر ڪبو آهي اهڙي طرح 1 منٽ، هڪ ڊگري جو سٺ هون (60^{th}) حصو آهي ۽ هڪ سيڪنڊ، هڪ ڊگري جو 3600 هون (3600^{th}) حصو آهي. اهو نظام جنهن ۾ ڪنڊ کي ڊگريون، منٽن ۽ سيڪنڊن ۾ ماپيو وڃي، ان کي بنياد 60 وارو عددي نظام چئبو آهي. اهڙي طرح هڪ ڊگري مڪمل ڦيري جو 360 هون حصو آهي. (يعني $\frac{1}{360}$ هون حصو) ۽ ان کي 1° سان ظاهر ڪبو آهي. ان جي وڌيڪ ورهاست هيٺين ريت آهي.



$$1^\circ = 60' = 60''$$

$$1' = 60''$$

مثال طور 30 ڊگري، 20 منٽ ۽ 10 سيڪنڊ نشانين ۾ هن ريت لکبا: $30^\circ 20' 10''$

30.1 (ii) ڊگري، منٽ ۽ سيڪنڊ ($D^\circ M' S''$) ۾ ڏنل ڪنڊ کي ڏهائي صورت (ڏهائي جي ٻن درجن تائين) ۾ مٽائڻ ۽ ان جو ابتڙ ڪرڻ:

ان سيڪشن ۾، اسين منٽن ۽ سيڪنڊن کي ڊگرين ۾ مٽائينداسين. اهو ڪرڻ لاءِ منٽن کي 60 ۽ سيڪنڊن کي 3600 سان ونڊ ڪبو آهي. سادو ڪرڻ کانپوءِ اسين گهربل ڏهائي صورت حاصل ڪنداسين

مثال 1:

30° 30' 10'' کي ڊگرين ۾ مٽايو ۽ ڏهائي صورت ۾ لکو.

حل:

$$\begin{aligned} 1' &= \left(\frac{1}{60}\right)^\circ && \text{جيئن ته} \\ \therefore 30' &= \left(\frac{30}{60}\right)^\circ = \left(\frac{1}{2}\right)^\circ && \text{تنهنڪري} \\ \text{۽} \quad 1'' &= \left(\frac{1}{3600}\right)^\circ \\ 10'' &= \left(\frac{10}{3600}\right)^\circ = \left(\frac{1}{360}\right)^\circ \\ \therefore 30^\circ 30' 10'' &= \left(30 + \frac{1}{2} + \frac{1}{360}\right)^\circ \\ &= [30 + 0.5 + 0.003]^\circ \\ &= 30.503^\circ \\ &= 30.50^\circ && (\text{ڏهائي جي ٻن درجن تائين}) \end{aligned}$$

مثال 2:

12.51° کي $D^\circ M' S''$ واري صورت ۾ مٽايو

حل:


$$\begin{aligned} 12.51^\circ &= 12^\circ + (0.51)^\circ \\ &= 12^\circ + (0.51 \times 60)' && (1^\circ = 60') \\ &= 12^\circ + (30.6)' \\ &= 12^\circ + 30' + (0.6)' \\ &= 12^\circ 30' + (0.6 \times 60)'' && (\because 1' = 60'') \\ &= 12^\circ 30' 36'' \end{aligned}$$

30.1 (iii) ريڊيان (Radian) کي بيان ڪرڻ (گولائي واري نظام ۾ ڪنڊ جي ماپ) ۽ ريڊيان ۽ ڊگري ماپن


جي وچ ۾ تعلق کي ثابت ڪرڻ:

ريڊيان ڪنڊ کي ماپڻ جو هڪ ٻيو ايڪو آهي جيڪو قوس جي ڊيگهه ۽ گول جي رداس جي نسبت جي برابر آهي.

يعني ته $\theta = \frac{l}{r}$ جڏهن ته θ مرڪزي ڪنڊ جي ريڊيان ۾ ماپ، l قوس جي ڊيگهه آهي ۽ r



گول جي رداس آهي. اهو نظام جنهن ۾ ڪنڊ کي ريڊيان ۾ ماپيو وڃي. ان کي گولائي وارو نظام چئبو آهي. اهڙي طرح گولائي نظام ۾ ڪا ڪنڊ 1 ريڊيان جي ڪوٺي جيڪڏهن اها ڪنڊ رداس جي برابر قوس سان مرڪز تي ٺهيل ڪنڊ آهي. (جيئن ته شڪل 30.1 ۾ ڏيکاريو ويو آهي).



شڪل 30.1

$$\theta = \frac{l}{r},$$

اسان وٽ

$$l = r$$

جڏهن ته

$$\theta = \frac{l}{r}$$

ته پوءِ

$$\boxed{\theta = 1 \text{ ريڊيان}}$$

هڪ مڪمل ڦيري لاءِ، قوس جي ڊيگهه گول جي گهيري جي برابر

هوندي آهي يعني ته. $l = 2\pi r$

$$\theta = \frac{l}{r}$$

هاڻي،

$$\theta = \frac{2\pi r}{r}$$

$$\boxed{\theta = 2\pi \text{ ريڊيان}}$$

انهيءَ ڪري هڪ مڪمل ڦيري لاءِ، ريڊيان ۾ ماپيل ڪنڊ 2π هوندي آهي.

ڊگري ۽ ريڊيان جي وچ ۾ تعلق:

اسان کي خبر آهي ته، هڪ مڪمل ڦيري لاءِ ڊگري ۾ ماپيل ڪنڊ 360° هوندي آهي ۽ ريڊيان ۾ ماپيل ڪنڊ 2π هوندي آهي.

انهي ڪري

$$360^\circ = 2\pi \text{ ريڊيان}$$

$$\Rightarrow 180^\circ = \pi \text{ ريڊيان}$$

$$\Rightarrow 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ ريڊيان} \approx 0.01745 \text{ ريڊيان}$$

$$\text{يا، } 1 \text{ ريڊيان} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ \approx 57.3^\circ$$

ڊگري ۽ ريڊيان ۾ ڪجهه معياري ڪنڊون هيٺين ريت آهن.


360°	270°	180°	90°	60°	45°	30°	ڊگري
2π	$\frac{3\pi}{2}$	π	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	ريڊيان

مثال 1: هيٺين کي ريڊيان واري ماپ ۾ مٽايو:

$$120^\circ \text{ (a)} \quad 10^\circ 30' \text{ (b)} \quad 24^\circ 32' 30'' \text{ (c)}$$

حل (a)

اسان کي خبر آهي ته



$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ ريڊيان} \quad \therefore$$

$$120^\circ = 120 \times \frac{\pi}{180} \text{ ريڊيان} \quad \therefore$$

$$\Rightarrow 120^\circ = \frac{2\pi}{3} \text{ ريڊيان}$$

اسان کي خبر آهي ته

$$1' = \left(\frac{1}{60}\right)^\circ \quad \therefore$$

$$\Rightarrow 30' = \left(\frac{30}{60}\right)^\circ = \left(\frac{1}{2}\right)^\circ \quad \therefore$$

$$10^\circ 30' = \left(10 + \frac{30}{60}\right)^\circ = \left(10 + \frac{1}{2}\right)^\circ = \left(\frac{21}{2}\right)^\circ \quad \text{هاڻي}$$

$$= \frac{21}{2} \times \frac{\pi}{180} \text{ ريڊيان} \quad (\because 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ ريڊيان}) \quad \therefore$$

$$= \frac{7\pi}{120} \text{ ريڊيان} \quad \Leftarrow$$

$$24^\circ 32' 30'' \quad \text{حل (c):}$$

$$= 24^\circ + \left(\frac{32}{60}\right)^\circ + \left(\frac{30}{3600}\right)^\circ \quad 1'' = \left(\frac{1}{3600}\right)^\circ \quad \& \quad 1' = \left(\frac{1}{60}\right)^\circ$$

$$= \left(24 + \frac{8}{15} = \frac{1}{120}\right)^\circ$$

$$= \left(24 + \frac{32}{60} = \frac{30}{3600}\right)^\circ$$

$$= \left(\frac{24 \times 120 + 64 + 1}{120}\right)^\circ$$


$$= \left(\frac{2945}{120}\right)^\circ \quad \left(\because 1^\circ \cong \frac{\pi}{180} \text{ ريڊيان}\right)$$

$$\left(\frac{2945}{120}\right)^\circ = \frac{2945}{120} \times \frac{\pi}{180} \text{ ريڊيان}$$

$$= \frac{589}{4320} \pi \text{ ريڊيان} \quad \therefore$$

$$24^\circ 32' 30'' = \frac{589}{4320} \pi \text{ ريڊيان}$$

انهي ڪري



مشق 30.1

1. هيٺين کي ڊگري ۾ مٽايو ۽ ڏهائي واري صورت ۾ لکو.

8° 15' 30" (iii)	10° 30' (ii)	32° 15' (i)
18° 6' 21" (vi)	25° 30' (v)	45° 21' 36" (iv)
2. هيٺين ڪنڊن کي D° M' S" واري صورت ۾ مٽايو.

57.325° (iii)	47.36° (ii)	32.25° (i)
225.60° (vi)	22.5° (v)	67.58° (iv)
3. هيٺين ڪنڊن کي ڊگري ماپن ۾ ظاهر ڪريو.


$-\frac{3\pi}{4}$ ريڊيان (iii)	$\frac{\pi}{3}$ ريڊيان (ii)	$\frac{\pi}{4}$ ريڊيان (i)
4.5 ريڊيان (iv)	$\frac{3}{\pi}$ ريڊيان (v)	3 ريڊيان (iv)
4. هيٺين ڪنڊن کي ريڊيان ماپن ۾ بدلايو.

60° (iii)	45° (ii)	30° (i)
60° 35' 48" (vi)	-225° (v)	$\left(22\frac{1}{2}\right)^\circ$ (iv)


30.2 گول جو سيڪٽر:

وصفون:

- (i) گول جي گهيري جي ڪنهن حصي کي قوس چئبو آهي.
 - (ii) گول ايراضي جو اهو حصو جيڪو ٻن رداسي ٽڪرن ۽ هڪ قوس سان گهيريل هجي، ان کي گول جو سيڪٽر چئبو آهي.
- مٿي بيان ڪيل وصفن کي سمجهڻ لاءِ هيٺيون شڪليون مدد ڪنديون.



شکل 30.2 (ii)



شکل 30.2 (i)

شکل 30.2 (i) ۾ PQ هڪ قوس آهي ۽ شکل 30.2 (ii) ۾ POQ هڪ سيڪٽر آهي.

30.2 (i) $l = r\theta$ ، وارو اصول قائم ڪرڻ جڏهن ته گول جو رداس r ، قوس جي ڊيگهه l ۽ ريڊيانن ۾ ماپيل مرڪزي ڪنڊ θ آهي: رداس r واري گول ۾ قوس جي ڊيگهه l سڌو تناسب رکي ٿي ريڊيانن ۾ ماپيل مرڪزي ڪنڊ θ سان.

$$l \propto \theta \quad \text{يعني}$$

$$\Rightarrow l = c\theta \quad \dots (i)$$





Fig: 30.3

هڪ مڪمل ڦيري لاءِ،

$$l = 2\pi r$$

$$\theta = 2\pi$$

مساوات (i) جو استعمال ڪندي، اسان وٽ آهي،

$$2\pi r = c(2\pi)$$

$$\Rightarrow c = r$$

انهي ڪري، مساوات (i) ٿيندي $l = r\theta$

نوٽ: (i) l ۽ r ساڳن ايڪن ۾ ماپيا وڃن ٿا

(ii) θ کي ريڊيان ۾ ماپيو آهي.

مثال 1: 5cm رداس واري گول جي ان قوس جي ڊيگهه لھو جيڪو مرڪز تي $\frac{2\pi}{5}$ ريڊيان جي ڪنڊ ٺاهي ٿو.

حل: مليل آهي ته

$$r = 5\text{cm} \quad \theta = \frac{2\pi}{5} \quad l = ?$$

$$l = r\theta \quad \text{جيئن ته}$$

$$l = 5 \times \frac{2\pi}{5} \quad \therefore$$

$$\Rightarrow l = 2\pi \approx 2\left(\frac{22}{7}\right) \approx 6.28\text{cm}.$$

مثال 2: هڪ چوڪرو سائیکل ۾ 10 ڦيرن ۾ ڪيترو پري تائين ويندو جيڪڏهن هن جي سائیکل جي هر هڪ ڦيٽي جو قطر 56cm جي برابر آهي.

حل:

اسان کي خبر آهي ته

ريڊيان 2π = هڪ ڦيرو

$\therefore$ ريڊيان $20\pi = 10$ ڦيرا.

يعني ته ريڊيان $\theta = 20\pi$

۽ ڦيٽي جو قطر: $d = 56\text{cm}$

($\because 1\text{m} = 100\text{cm}$)

$$r = \frac{d}{2} = \frac{56}{2}\text{cm} = \frac{56}{2 \times 100}\text{m}$$


$$\therefore l = r\theta$$

$$\therefore l = \frac{56}{2 \times 100} \times 20\pi$$

$$\Rightarrow l \approx \frac{56}{2 \times 100} \times 20 \times \frac{22}{7} \quad (\because \pi \approx \frac{22}{7})$$

$$\Rightarrow l \approx 17.6\text{m}.$$

اهڙي طرح چوڪرو 10 ڦيرن ۾ 17.6m جو فاصلو طئي ڪندو.



مثال 3:

r لھو، جيڪڏھن $l = 4\text{cm}$ ۽ ريڊيان $\theta = \frac{1}{4}$

حل: مليل آھي ته

$$l = 4\text{cm}$$

$$\theta = \frac{1}{4} \text{ ريڊيان}$$

$$r = ?$$

$$\therefore l = r\theta$$


$$\therefore r = \frac{l}{\theta}$$

$$\Rightarrow r = \left(4 \div \frac{1}{4}\right) = 4 \times \frac{4}{1} = 16\text{cm}.$$

30.2 (ii) ثابت ڪريو ته گول جي سيڪٽر جي ايراضي $\frac{1}{2}r^2\theta$ يا $\frac{1}{2}lr$ آھي.

ثابتي:

ھڪ گول ڪٿو جنھن جو رادس r ۽ مرڪز O آھي، AB ھڪ قوس آھي جيڪو مرڪز تي θ ريڊيان جي ڪنڊ ٺاھي ٿو جيئن شڪل 30.4 ۾ ڏيکاريل آھي.



شڪل 30.4

اسانکي خبر آھي ته

$$\text{گول جي ايراضي} = \pi r^2$$

ھڪ ڦيري جي ڪنڊ 2π ريڊيان

سيڪٽر جي ڪنڊ θ ريڊيان

بنيادي جاميٽري مان، تناسب جي قانون جو استعمال ڪندي

$$\frac{\text{سيڪٽر AOB جي ايراضي}}{\text{گول جي ايراضي}} = \frac{\text{سيڪٽر جي ڪنڊ}}{\text{گول جي ڪنڊ}}$$

$$\therefore \frac{\theta}{2\pi} = \frac{\text{سيڪٽر AOB جي ايراضي}}{\pi r^2}$$


$$\Rightarrow \frac{\pi r^2 \times \theta}{2\pi} = \text{سيڪٽر AOB جي ايراضي}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}r^2\theta = \text{سيڪٽر AOB جي ايراضي}$$

$$\text{يا سيڪٽر AOB جي ايراضي} = \frac{1}{2}r\theta \times r$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}rl = \text{سيڪٽر AOB جي ايراضي} \quad (\because r\theta = l)$$

اھڙي طرح ثابت ٿيو.



مثال 1: هڪ گول جي سيڪٽر جي ايراضي لھو جنھن جو رداس 5cm ۽ مرڪزي ڪنڊ 60° آھي.

حل: مليل آھي تہ

$$r = 5\text{cm}$$

$$\theta = 60^\circ = 60 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3} \text{ ريڊيان}$$

۽ سيڪٽر جي ايراضي = ؟

$$\therefore \frac{1}{2} r^2 \theta = \text{سيڪٽر جي ايراضي}$$

$$\therefore \frac{1}{2} (5)^2 \times \frac{\pi}{3} = \text{سيڪٽر جي ايراضي}$$

$$\left(\pi \approx \frac{22}{7} \right) \therefore \frac{1}{2} \times 25 \times \frac{22}{7 \times 3} \approx \text{سيڪٽر جي ايراضي}$$

$$\text{يا سيڪٽر جي ايراضي} = 13.09\text{cm}^2$$

مثال 2: هڪ گول جي سيڪٽر جي ايراضي لھو جنھن جو رداس 4cm آھي ۽ مرڪزي ڪنڊ 12 ريڊيان جي آھي.

حل: مليل آھي تہ

$$4\text{cm} = r$$

$$12 = \theta \text{ ريڊيان}$$

۽ سيڪٽر جي ايراضي = ؟

$$\therefore \frac{1}{2} r^2 \theta = \text{سيڪٽر جي ايراضي}$$

$$\therefore \frac{1}{2} (4)^2 \times 12 = \text{سيڪٽر جي ايراضي}$$

$$\text{يا سيڪٽر جي ايراضي} = 96\text{cm}^2 = 16 \times 6$$

مشق 30.2

1. θ جي قيمت لھو جيڪڏھن

$$l = 30.2\text{cm} \text{ ۽ } r = 2\text{cm} \quad \text{(ii)} \quad l = 20\text{cm} \text{ ۽ } r = 5\text{cm} \quad \text{(i)}$$

$$l = 4.5\text{cm} \text{ ۽ } r = 2.5\text{cm} \quad \text{(iv)} \quad l = 6\text{cm} \text{ ۽ } r = 2.87\text{cm} \quad \text{(iii)}$$

2. l جي قيمت لھو جيڪڏھن

$$\theta = 2.1 \text{ ريڊيان} \text{ ۽ } r = 1.01\text{cm} \quad \text{(i)}$$

$$\theta = 2 \text{ ريڊيان} \text{ ۽ } r = 5.1\text{cm} \quad \text{(ii)}$$


$$\theta = 30^\circ \text{ ۽ } r = 6\text{cm} \quad \text{(iii)}$$

$$\theta = 60^\circ 30' \text{ ۽ } r = 15\text{cm} \quad \text{(iv)}$$

3. r جي قيمت لھو جيڪڏھن

$$l = 2\text{m} \text{ ۽ } \theta = 60^\circ \quad \text{(i)} \quad l = \frac{7}{4}\text{m} \text{ ۽ } \theta = 3.5 \text{ ريڊيان} \quad \text{(ii)}$$

$$l = 4\text{cm} \text{ ۽ } \theta = \frac{1}{4} \text{ ريڊيان} \quad \text{(iii)} \quad l = 15.4\text{cm} \text{ ۽ } \theta = 180^\circ \quad \text{(iv)}$$



4. ايڪي واري گول (unit circle) جي قوس جي ڊيگهه لھو جنھن جي مطابقت رکندڙ مرڪزي ڪنڊ ھيٺ ڏنل آھي.
- 30° (i) 45° (ii) 60° (iii) 90° (iv)
5. ھڪ گول جو قوس مرڪز تي $\frac{\pi}{6}$ جي ڪنڊ ناھي ٿو. گول جو رداس 5cm آھي تہ معلوم ڪريو.
- (i) قوس جي ڊيگھ (ii) گول جي سيڪٽر جي ايراضي
6. 10cm ردس واري گول تي ھڪ ٽپڪو حرڪت ڪري رھيو آھي جيڪڏھن اھو 3.5 ڦيرا ھڻي ٿو تہ ٽپڪي جو طئي ڪيل فاصلو لھو.
7. ھڪ سيڪٽر جي ايراضي لھو جڏھن تہ مرڪزي ڪنڊ $\frac{\pi}{4}$ ريڊيان ۽ گول جو رداس 4cm آھي.
8. جيڪڏھن 21cm جي قطر واري اڏام جي ڦيٽي جي ڪناري تي ھڪ ٽپڪو 5040 ميٽر فاصلو ڦي منٽ طئي ڪري ٿو ھڪ سيڪنڊ ۾ اھو ڦيٽو ڪيترن ريڊيانن تائين ڦرندو؟
9. ھڪ گاڏي گولائي واري رستي تي ھلي رھي آھي. ان گول جو رداس قوس کان ٻيڻو آھي جيڪو گاڏي ناھي ٿي گولائي واري رستي تي قوس جي ٺھيل مرڪزي ڪنڊ معلوم ڪريو.
10. 12cm رداس جي ھڪ گول ۾ ھڪ قوس 84° جي مرڪزي ڪنڊ ناھي ٿو. ان جي قوس جي ڊيگھ ۽ سيڪٽر جي ايراضي لھو


30.3 ٽرگنوميٽري نسبتون (Trigonometric ratios)

30.3 (i) بيان ڪرڻ ۽ سڃاڻپ ڪرڻ


(a) عام ڪنڊون (هم انتهائي ڪنڊون) (Co-terminal Angles)

(b) معياري بيهڪ ۾ ڪنڊ


30.3.1 (a) اهي ڪنڊون جن جا شروعاتي ۽ انتهائي پاسا ساڳيا هجن ته انهن کي هم انتهائي ڪنڊون چئبو آهي ۽ انهن جو فرق 2π ريڊيان جي ضرب آيت هوندي آهي انهن کي عام ڪنڊون (General angles) پڻ چئبو آهي



شکل 30.5 (iii)



شکل 30.5 (ii)



شکل 30.5 (i)

ريڊيان $m\angle POQ = \theta$ جڏهن ته $0 \leq \theta < 2\pi$



(i) θ ريڊيان (ٻڙي ڦيرو)

(ii) $(2\pi + \theta)$ ريڊيان (هڪ ڦيري کانپوءِ)


(iii) $(4\pi + \theta)$ ريڊيان (ٻن ڦيرن کانپوءِ)

انهي ڪري θ , $2\pi + \theta$ ۽ $4\pi + \theta$ هم انتهائي ڪنڊون آهن. (جيئن شڪل 30.5 ۾ ڏيکاريل آهي.


جيڪڏهن ڦيرا گهڙي جي سڌي رستي جي رخ ۾ نهن جيئن هيٺ ڏنل شڪل ۾ ڏيکاريل آهي.



شکل 30.5 (iii)



شکل 30.5 (ii)



شکل 30.5 (i)

- (i) $2\pi - \theta$ ريڊيان (ڪوبه ڦيرو نه آهي)
 (ii) $4\pi - \theta$ ريڊيان (گهڙي جي سڌي رستي وارو هڪ ڦيرو کان پوءِ)
 (iii) $6\pi - \theta$ ريڊيان (گهڙي جي اُبتي رستي واري ٻن ڦيرن کانپوءِ)

هتي θ ، گهڙي جي اُبتي رستي واري ڪنڊ آهي انهي ڪري $2\pi - \theta$ ۽ $4\pi - \theta$ هم انتهائي ڪنڊون آهن.
مثال: هيٺين مان ڪهڙيون ڪنڊون 120° سان هم انتهائي ڪنڊون آهن.

$$-240^\circ, 480^\circ, \frac{14\pi}{3}, -\frac{14\pi}{3}$$

حل:

$$120^\circ - (-240^\circ) = 120^\circ + 240^\circ = 360^\circ$$

ها -240° هم انتهائي ڪنڊ آهي 120° جي

$$480^\circ - 120^\circ = 360^\circ$$

ها 480° هم انتهائي ڪنڊ آهي 120° جي


$$\frac{14\pi}{3} - 120^\circ = \frac{14\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} = \frac{12\pi}{3} = 4\pi$$

ها $\frac{14\pi}{3}$ هم انتهائي ڪنڊ آهي 120° جي

$$2\pi, 120^\circ - \left(\frac{14\pi}{3}\right) = \frac{2\pi}{3} + \frac{14\pi}{3} = \frac{16\pi}{3}$$

انهي ڪري $-\frac{14\pi}{3}$ هم انتهائي ڪنڊ 120° جي نه آهي.


30.3 (i) (b) هڪ ڪنڊ کي معياري بيهڪ ۾ ڪوٺيو جيڪڏهن ان جي چوٽي اصل ٽپڪي تي ۽ شروعاتي پاسو واڌو x -axis تي هجي




شکل 30.7 (iv)




شکل 30.7 (iii)



شکل 30.7 (ii)




شکل 30.7 (i)



30.3

30.3 (ii) (a) چوٿاين ۽ چوٿائي ڪنڊن کي سڃاڻڻ: هڪ مستطيلي ڪوآرڊينيٽ نظام ۾ ٻه محور هڪٻئي کي گوني ڪنڊ تي ڪپين ٿا ۽ متاڪرو چار برابر حصن ۾ ورهائجي ٿو ۽ هر هڪ حصي کي چوٿون يا چوٿائي حصو چئبو آهي. مشترڪ ٽپڪو (يا ميلاپ وارو ٽپڪو) اصل ٽپڪو (origin) ڪوٺبو آهي ۽ ان کي 0 سان ظاهر ڪبو آهي. 0° ۽ 90° جي وچ واريون ڪنڊون پهريون چوٿائي حصو آهن.



شڪل 30.8

يعني پهرين چوٿائي حصي ۾ $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ آهن.

90° ۽ 180° جي وچ واريون ڪنڊون ٻيون چوٿائي حصو آهن.

يعني ٻئي چوٿائي حصي ۾ $90^\circ < \theta < 180^\circ$ آهن.

180° ۽ 270° جي وچ واريون ڪنڊون ٽيون چوٿائي حصو آهن.

يعني ٽئين چوٿائي حصي ۾ $180^\circ < \theta < 270^\circ$ آهن.


270° ۽ 360° جي وچ واريون ڪنڊون چوٿون چوٿائي حصو آهن.

يعني ته چوٿين يا چوٿائي حصي ۾ $270^\circ < \theta < 360^\circ$ آهن.

هڪ معياري بيهڪ واري ڪنڊ ڪنهن چوٿائي حصي ۾ تڏهن هوندي جڏهن ان جو انتهائي پاسو ان چوٿائي حصي ۾ هجي.

30.3 (ii) (b) چوٿائي ڪنڊ (Quadrantal Angle)

جيڪڏهن ڪنهن معياري ڪنڊ جو انتهائي پاسو x -axis يا y -axis سان ٺهڪندڙ هجي ته پوءِ ان ڪنڊ کي چوٿائي ڪنڊ چئبو آهي. مثال طور: 90° , 180° , 270° ۽ 360° چوٿائي ڪنڊون آهن جيڪي هيٺين شڪل ۾ ڏيکاريل آهن.



شڪل 30.9 (iv)


شڪل 30.9 (iii)

شڪل 30.9 (ii)

شڪل 30.9 (i)

30.3 (iii) ٽرگنوميٽري نسبت ۽ انهن جي اُبتڙن کي ايڪي واري گول جي مدد سان بيان ڪرڻ:

اسين گذريل ڪلاس ۾، هڪ گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ABC ۾ سوڙهي ڪنڊ θ لاءِ ٽرگنوميٽري نسبتون اڳيئي سڃاڻي چڪا آهيون جيڪي هيٺين ريت آهن.




شڪل 30.10

$$\sin \theta = \frac{c}{a} = \frac{\text{سامهون واري پاسي جي ماپ}}{\text{هيپاٽينيوڙ جي ماپ}} \quad .1$$

$$\cos \theta = \frac{b}{c} = \frac{\text{پرواري پاسي جي ماپ}}{\text{هيپاٽينيوڙ جي ماپ}} \quad .2$$

$$\tan \theta = \frac{a}{b} = \frac{\text{سامهون واري پاسي جي ماپ}}{\text{پرواري پاسي جي ماپ}} \quad .3$$

۽ انهن جا ترتيبوار اُبتڙ هيٺين ريت آهن




$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{a}{c} = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{\text{هپاٽينيوڙ جي ماپ}}{\text{سامهون واري پاسي جي ماپ}} \quad .4$$

$$\sec \theta = \frac{c}{b} = \frac{1}{\cos \theta} = \frac{\text{هپاٽينيوڙ جي ماپ}}{\text{پرواري پاسي جي ماپ}} \quad .5$$

$$\cot \theta = \frac{b}{a} = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\text{پرواري پاسي جي ماپ}}{\text{سامهون واري پاسي جي ماپ}} \quad .6$$

گول جي هر هڪ ٽپڪي لاءِ هميشه هڪ مطابقت رکندڙ ڪنڊ وجود رکندي آهي. فرض ڪريو ته $P(x, y)$ ايڪي واري گول جو هڪ ٽپڪو آهي جيڪو پهرين چوٽائي حصي ۾ آهي ۽ مطابقت رکندڙ ڪنڊ θ آهي جڏهن ته θ ريڊيان ۾ ماپ ڪيل آهي جيئن شڪل 30.11 ۾ ڏيکاريل آهي اسين ٽرگنوميٽري نسبتن کي هيٺين ريت بيان ڪريون ٿا



شڪل: 30.11

$$y = \frac{y}{1} = \frac{|\overline{BP}|}{|\overline{OP}|} = \sin \theta$$

$$x = \frac{x}{1} = \frac{|\overline{OB}|}{|\overline{OP}|} = \cos \theta$$

$$\text{هاڻي، } \frac{y}{x} = \frac{|\overline{BP}|}{|\overline{OB}|} = \tan \theta \quad (\text{بشرطيڪ } x \neq 0)$$

ساڳي ريت

$$\frac{x}{y} = \cot \theta \quad (\text{بشرطيڪ } y \neq 0)$$

$$\frac{1}{x} = \sec \theta \quad (\text{بشرطيڪ } x \neq 0)$$

$$\frac{1}{y} = \operatorname{cosec} \theta \quad (\text{بشرطيڪ } y \neq 0)$$

اُبتڙ نسبتون هيٺيون آهن

$$\frac{1}{\sin \theta} = \operatorname{cosec} \theta \quad \text{يا} \quad \frac{1}{\operatorname{cosec} \theta} = \sin \theta$$


$$\frac{1}{\cos \theta} = \sec \theta \quad \text{يا} \quad \frac{1}{\sec \theta} = \cos \theta$$

$$\frac{1}{\tan \theta} = \cot \theta \quad \text{يا} \quad \frac{1}{\cot \theta} = \tan \theta$$

نوٽ:

x ۽ y جي صورت ۾ انهن سڀني ٽرگنوميٽري نسبتن کي ٽرگنوميٽري عمل (Trigonometric functions) چئبو آهي.

$\sin \theta$ ۽ $\cos \theta$ کي گولائي وارا عمل (Circular functions) پڻ چئبو آهي.



مثال: ڪنڊ θ تي، ترگناميٽري نسبتن جون قيمتون معلوم ڪريو جيڪڏهن θ جي انتهائي پاسي تي ٽپڪو $P(6,8)$ آهي.

حل:

هتي $P(x, y) = (6, 8)$

$$\Rightarrow y=8 \text{ ۽ } x=6$$

فيثاغورث سڌيان جو استعمال ڪندي

$$\because r^2 = x^2 + y^2$$

$$\because r^2 = (6)^2 + (8)^2$$

$$\Rightarrow r^2 = 36 + 64 = 100$$


$$\Rightarrow r = \sqrt{100} = 10, \text{ جڏهن ته } |\overline{OP}| = 10,$$

سڀني ترگناميٽري نسبتن جون قيمتون آهن:

$$\frac{5}{4} = \operatorname{cosec} \theta, \quad \frac{4}{5} = \frac{8}{10} = \frac{y}{r} = \sin \theta$$

$$\frac{5}{3} = \sec \theta, \quad \frac{3}{5} = \frac{6}{10} = \frac{x}{r} = \cos \theta$$

$$\frac{3}{4} = \cot \theta, \quad \frac{4}{3} = \frac{8}{6} = \frac{y}{x} = \tan \theta$$



شڪل: 30.12

30.3 (iv). $30^\circ, 45^\circ$ ۽ 60° جي ترگناميٽري نسبتن جي قيمتن جو ذور ڪرڻ


اسان اڳيئي سڳي چڪا آهيون ته $30^\circ, 45^\circ$ ۽ 60° جي ترگناميٽري نسبتن جون قيمتون هيٺين ريت آهن.

60°	45°	30°	θ
$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	$\sin$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\cos$
$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\tan$

هاڻي اسين مٿين جدول جو استعمال ڪندي ترگناميٽري جي نسبتن جي اُبتڙن جي قيمت لهنداسين

$$\operatorname{cosec} 30^\circ = \frac{1}{\sin 30^\circ} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$$\sec 30^\circ = \frac{1}{\cos 30^\circ} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$



$$\cot 30^\circ = \frac{1}{\tan 30^\circ} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3}$$

$$\operatorname{cosec} 45^\circ = \frac{1}{\sin 45^\circ} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2}$$

$$\sec 45^\circ = \frac{1}{\cos 45^\circ} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2}$$

$$\cot 45^\circ = \frac{1}{\tan 45^\circ} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\operatorname{cosec} 60^\circ = \frac{1}{\sin 60^\circ} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\sec 60^\circ = \frac{1}{\cos 60^\circ} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$$\cot 60^\circ = \frac{1}{\tan 60^\circ} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

30.3 (v) مختلف چوٽن ۾ ترگناميٽري نسبتن جي نشانين جي سڃاڻپ ڪرڻ.

جيڪڏهن θ هڪ چوٽائي ڪنڊ نه آهي ته پوءِ ترگناميٽري نسبتن جون نشانينون انتهائي پاسي جي ٽپڪي $P(x, y)$ جي مطابق معلوم ڪري سگهجن ٿيون.

1. جيڪڏهن θ پهرين چوٽائي حصي ۾ آهي ته پوءِ ان جي انتهائي پاسي جي ٽپڪي (x, y) ۾ x ۽ y واڌو هوندا. يعني ته $x > 0$ ۽ $y > 0$.

پهرين چوٽائي حصي ۾ سڀ ترگناميٽري عمل / نسبتون واڌو هونديون آهن.

2. ٻيئي چوٽائي حصي ۾ $x < 0$ ۽ $y > 0$. تنهنڪري ٻيئي چوٽائي حصي ۾ $\sin \theta$ ۽ $\operatorname{cosec} \theta$ واڌو هوندا آهن ۽ باقي رهيل ڪاٺو هوندا آهن.

3. ٽئين چوٽائي حصي ۾ $x < 0$ ۽ $y < 0$. تنهنڪري ٽئين چوٽائي حصي ۾ $\tan \theta$ ۽ $\cot \theta$ واڌو هوندا آهن ۽ باقي رهيل ڪاٺو هوندا آهن.

4. چوٿين چوٽائي حصي ۾ $x > 0$ ۽ $y < 0$. تنهنڪري چوٿين چوٽائي حصي ۾ $\cos \theta$ ۽ $\sec \theta$ واڌو هوندا آهن ۽ باقي رهيل ڪاٺو هوندا آهن.

مثال 1: هيٺين ترگناميٽري عملن / نسبتن جون نشانينون معلوم ڪريو.

$$\operatorname{cosec}\left(-\frac{\pi}{3}\right) \quad (v) \quad \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) \quad (iv) \quad \tan 229^\circ \quad (iii) \quad \sin 1030^\circ \quad (ii) \quad \cos 120^\circ \quad (i)$$

حل:

$$\cos 120^\circ \quad (i)$$


$\therefore 120^\circ$ ٻيئي چوٽائي حصي ۾ موجود آهي

$\therefore \cos 120^\circ$ ڪاٺو آهي.

$$\sin(720^\circ + 310^\circ) = \sin 1030^\circ \quad (ii)$$

$\therefore$ جيئن ته 310° چوٽائي حصي ۾ iv ۾ موجود آهي ۽ چوٽائي حصي iv ۾ $\sin \theta$ ڪاٺو هوندو آهي

$\therefore$ تنهنڪري $\sin 1030^\circ$ ڪاٺو آهي.



(iii) $\tan 229^\circ$ جيئن ته 229° چوٿائي حصي III ۾ موجود آهي ۽ چوٿائي حصي III ۾ $\tan \theta$ واڌو هوندو آهي
 $\therefore$ تنهنڪري $\tan 229^\circ$ واڌو آهي.

$$\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) \quad (iv)$$

جيئن ته $-\frac{\pi}{4}$ چوٿائي حصي ۾ موجود آهي ۽ چوٿائي حصي iv ۾ $\tan \theta$ کاتو هوندو آهي

ان ڪري $\tan \frac{-\pi}{4}$ کاتو آهي.

$$\operatorname{cosec}\left(-\frac{\pi}{3}\right) \quad (v)$$

$\therefore$ جيئن ته $-\frac{\pi}{3}$ چوٿائي حصي ۾ موجود آهي ۽ چوٿائي حصي iv ۾ $\operatorname{cosec} \theta$ کاتو هوندو آهي

$\therefore$ ان ڪري $\operatorname{cosec} \frac{-\pi}{3}$ کاتو آهي

30.3 (vi) باقي رهيل ٽرگناميٽري نسبتن جون قيمتون ڳولڻ جيڪڏهن ڪا هڪ ٽرگناميٽري نسبت مليل هجي.

ان جو طريقو هيٺين مثالن سان واضح ڪجي ٿو.

مثال 1: جيڪڏهن $\sin \theta = \frac{3}{5}$ ته پوءِ باقي رهيل ٽرگناميٽري عمل/نسبتن جون قيمتون ڳول.

حل: مليل آهي ته

$$\sin \theta = \frac{y}{r}$$

پرواري شڪل 30.13 استعمال ڪندي

$$\frac{3}{5} = \frac{y}{r}$$

$$\Rightarrow r = 5 \text{ ۽ } y = 3$$

$$x^2 + y^2 = r^2 \text{ جيئن ته}$$

$$x^2 + (3)^2 = (5)^2$$

$$x^2 + 9 = 25$$

$$x^2 = 25 - 9$$


$$\Rightarrow x^2 = 16$$

$$\Rightarrow x = 4$$

هاڻي

$$\cos \theta = \frac{x}{r}$$

$$\cos \theta = \frac{4}{5}$$




شڪل 30.13

$$\sec \theta = \frac{r}{x} = \frac{5}{4}$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{r}{y} = \frac{5}{3}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{3}{4}$$


$$\cot \theta = \frac{x}{y} = \frac{4}{3}$$



مثال 2: جيڪڏهن $\tan \theta = 1$ ۽ θ ٽيئن چوٽائي حصي ۾ آهي. باقي رهيل ٽرگناميٽري عملن جون قيمتون لھو.

حل: مليل آهي ته

شڪل 30.14 استعمال ڪندي



شڪل 30.14

$$\therefore \tan \theta = 1$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{y}{x} = 1$$

$$\Rightarrow y = x$$

$$x^2 + y^2 = 1 \quad \therefore$$

$$y = x \quad \therefore \quad x^2 + x^2 = 1 \quad \therefore$$

$$\Rightarrow 2x^2 = 1$$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

هتي اسين ڪاٿو قيمت ڪٽنداسين ڇو جو θ ٽيئن چوٽائي حصي ۾ آهي

$$y = \sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{۽} \quad x = \cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

انهيءَ ڪري باقي رهيل ٽرگناميٽري عمل آهن:

$$\cot \theta = 1$$

$$\sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta} = -\sqrt{2}$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = -\sqrt{2} \quad \text{۽}$$

مثال 3: باقي رهيل ٽرگناميٽري عمل / نسبتون لھو جيڪڏهن


$$\cos \theta = \frac{2}{3} \quad \text{۽} \quad \theta \text{ پھرين چوٽائي حصي ۾ آهي} \quad (i)$$

$$\sin \theta = 0.6 \quad \text{۽} \quad \tan \theta \text{ ڪاٿو آهي.} \quad (ii)$$

حل 1: مليل آهي ته

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = \frac{3}{2} \quad \therefore \quad \cos \theta = x = \frac{2}{3}$$

جيئن ته θ پھرين چوٽائي حصي ۾ آهي. $\therefore$ يعني ته $(x, y) \in Q_1$



$$x^2 + y^2 = 1 \text{ (مليل)}$$

$$y = \sin \theta \text{ ۽ } x = \cos \theta \text{ هتي}$$

$$\therefore \left(\frac{2}{3}\right)^2 + y^2 = 1$$

$$\Rightarrow y^2 = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

$$\Rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$$

هتي اسين +ve قيمت کٽنداسين ڇاڪاڻ جو θ پهرين چوٽائي حصي ۾ موجود آهي.

$$\therefore y = \frac{\sqrt{5}}{3} = \sin \theta ; \quad \therefore \operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{3}{\sqrt{5}},$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\frac{\sqrt{5}}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{5}}{2}; \quad \therefore \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{2}{\sqrt{5}}, \text{ ۽}$$

انهي ڪري گهربل باقي رهيل ٽرگناميٽري نسبتون آهن

$$\begin{array}{lll} 1. \sec \theta = \frac{3}{2} & 2. \sin \theta = \frac{\sqrt{5}}{3} & 3. \operatorname{cosec} \theta = \frac{3}{\sqrt{5}} \\ 4. \tan \theta = \frac{\sqrt{5}}{2} & \text{۽} & = \frac{2}{\sqrt{5}} \end{array}$$

حل 2 : مليل آهي ته

$$\sin y = 0.6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}, \quad \therefore \operatorname{cosec} \theta = \frac{5}{3} = 1.6,$$

$$\text{مليل آهي ته } \sin \theta > 0 \text{ ۽ } \tan \theta < 0$$

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$\therefore x^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1$$

$$\Rightarrow x^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$


$$\Rightarrow x^2 = \pm \frac{4}{5}$$

هتي اسين کاتو مله کٽنداسين ڇاڪاڻ جو θ ٻيئي چوٽائي حصي ۾ آهي.

$$\therefore x = \cos \theta = -\frac{4}{5} = -0.8 \text{ ۽ } \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = -\frac{5}{4} = -1.25$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} = -\frac{3}{4} = -0.75 \text{ ۽ } \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = -\frac{4}{3} = -1.3$$

هاڻي،



انهي ڪري گهربل باقي رهيل ٽرگناميٽري نسبتون آهن.

1. $\operatorname{cosec} \theta = 1.6$

2. $\cos \theta = -0.8$

3. $\sec \theta = -1.25$


4. $\tan \theta = -0.75$

5. $\cot \theta = -1.3$

30.3 (vii) $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ ۽ 360° جي ٽرگناميٽري نسبتون ڏيکاري

سيڪشن 30.3(ii)(b) ۾ اسان اڳيئي چوڻائي ڪنڊن تي بحث ڪري چڪا آهيون هتي اسين چوڻائي ڪنڊن جون ٽرگناميٽري نسبتون لهنداسين

جڏهن $\theta = 0^\circ$



ايڪي واري گول ۾ ڪنڊ $\theta = 0^\circ$ جي انتهائي پاسي تي ٽپڪو $P(1, 0)$ موجود آهي

هتي $x = 1, y = 0$ ۽ $r = 1$ جڏهن ته ايڪي واري گول جو رداس r آهي.

شڪل 30.15: $\therefore \sin 0^\circ = \frac{y}{r} = \frac{0}{1} = 0$; $\therefore \operatorname{cosec} 0^\circ = \frac{r}{y} = \frac{1}{0}$ (اڻ بيان ڪيل)

$\therefore \cos 0^\circ = \frac{x}{r} = \frac{1}{1} = 1$; $\therefore \sec 0^\circ = \frac{r}{x} = \frac{1}{1} = 1$

$\therefore \tan 0^\circ = \frac{y}{x} = \frac{0}{1} = 0$; $\therefore \cot 0^\circ = \frac{x}{y} = \frac{1}{0}$ (اڻ بيان ڪيل)

جڏهن $\theta = 90^\circ$

ايڪي واري گول ۾ 90° ڪنڊ جي انتهائي پاسي تي ٽپڪو $P(0, 1)$ ۽ انتهائي پاسو $(+ve)y$ -axis سان ٺهڪندڙ آهي.

$r = 1$ ۽ $x = 0, y = 1$

هتي $\therefore$

$\therefore \sin 90^\circ = \frac{y}{r} = \frac{1}{1} = 1$;

$\operatorname{cosec} 90^\circ = \frac{r}{y} = \frac{1}{1} = 1$


$\cos 90^\circ = \frac{x}{r} = \frac{0}{1} = 0$;

$\sec 90^\circ = \frac{r}{x} = \frac{1}{0}$ (اڻ بيان ڪيل)


$\tan 90^\circ = \frac{y}{x} = \frac{1}{0}$ (اڻ بيان ڪيل)

$\cot 90^\circ = \frac{x}{y} = \frac{0}{1} = 0$ ۽

جڏهن $\theta = 180^\circ$



شڪل 30.16:



ايڪي واري گول ۾، ڪنڊ 180° جي انتهائي پاسي تي ٽپڪو $P(-1,0)$ موجود آهي ۽ انتهائي پاسو -ve x-axis سان ٺهڪندڙ آهي. ان صورت ۾

$$r = 1 \text{ ۽ } P(-1,0) \Rightarrow x = -1, y = 0$$

$$\sin 180^\circ = \frac{y}{r} = \frac{0}{1} = 0;$$

$$\operatorname{cosec} 180^\circ = \frac{r}{y} = \frac{1}{0} \text{ (اڻ بيان ڪيل) } \therefore$$

$$\cos 180^\circ = \frac{x}{r} = \frac{-1}{1} = -1;$$

$$\sec 180^\circ = \frac{r}{x} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$\tan 180^\circ = \frac{y}{x} = \frac{0}{-1} = 0;$$

$$\cot 180^\circ = \frac{x}{y} = \frac{1}{0} \text{ (اڻ بيان ڪيل) } \therefore$$

جڏهن $\theta = 270^\circ$

ايڪي واري گول ۾، ڪنڊ 270° جي انتهائي پاسي تي ٽپڪو $P(0,-1)$ موجود آهي ۽ انتهائي پاسو -ve y-axis سان ٺهڪندڙ آهي. ان صورت ۾

$$r = 1 \text{ ۽ } P(0,-1) \Rightarrow x = 0, y = -1 \therefore$$

$$\sin 270^\circ = \frac{y}{r} = \frac{-1}{1} = -1; \therefore$$

$$\operatorname{cosec} 270^\circ = \frac{r}{y} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$\cos 270^\circ = \frac{x}{r} = \frac{0}{1} = 0;$$

$$\sec 270^\circ = \frac{r}{x} = \frac{1}{0} \text{ (اڻ بيان ڪيل) } \therefore$$


$$\tan 270^\circ = \frac{y}{x} = \frac{-1}{0} \text{ (اڻ بيان ڪيل) } \therefore$$

$$\cot 270^\circ = \frac{x}{y} = \frac{0}{-1} = 0 \text{ ۽}$$


جڏهن $\theta = 360^\circ$

يونٽ واري گول ۾، ڪنڊ 360° جي انتهائي پاسي تي ٽپڪو $P(1,0)$ موجود آهي ۽ انتهائي پاسو +ve x-axis سان ٺهڪندڙ آهي. ان صورت ۾



$$r = 1 \text{ ۽ } P(1,0) \Rightarrow x = 1, y = 0$$



شکل 30.17



شکل 30.18



شکل 30.19

$$\therefore \sin 360^\circ = \frac{y}{r} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\operatorname{cosec} 360^\circ = \frac{1}{\sin 360^\circ} = \frac{1}{0} \text{ (اڻ بيان ڪيل)}$$

$$\cos 360^\circ = \frac{x}{r} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\sec 360^\circ = \frac{1}{\cos 360^\circ} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\tan 360^\circ = \frac{y}{x} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\cot 360^\circ = \frac{1}{\tan 360^\circ} = \frac{1}{0} \text{ (اڻ بيان ڪيل)}$$

سڀني نتيجن جو خلاصو ڪندي، اسان وٽ هڪ جدول آهي.

360°	270°	180°	90°	60°	45°	30°	0°	θ
0	-1	0	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	sin
1	0	-1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	cos
0	$-\infty$	0	∞	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	tan
∞	-1	∞	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	∞	cosec
1	∞	-1	∞	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1	sec
∞	0	∞	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞	cot


مشق 30.3

1. هيٺين ڪنڊن جون هر انتهائي پاسي واريون ڪنڊون معلوم ڪريو

$$55^\circ \text{ (i)} \quad \frac{\pi}{6} \text{ (ii)} \quad -45^\circ \text{ (iii)} \quad -\frac{3\pi}{4} \text{ (iv)}$$

2. هيٺين ڪنڊن جي چوٽائي حصن جي شناخت ڪريو.

$$75^\circ \text{ (ii)} \quad -818^\circ \text{ (iii)} \quad 1090^\circ \text{ (iv)} \quad \frac{7\pi}{6} \text{ (v)} \quad -\frac{5\pi}{4} \text{ (vi)} \quad \frac{8\pi}{5} \text{ (i)}$$



3. هيٺين جون نشانيون معلوم ڪريو .

$$\begin{array}{llll} \sec 200^\circ & \text{(iii)} & \sin 340^\circ & \text{(ii)} & \cos 120^\circ & \text{(i)} \\ \cot\left(-\frac{2}{3}\pi\right) & \text{(vi)} & \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) & \text{(v)} & \operatorname{cosec} 198^\circ & \text{(iv)} \end{array}$$

4. θ ، ڪهڙي چوٽائي حصي ۾ آهي جيڪڏهن

$$\begin{array}{llll} \tan \theta > 0 & \& \cos \theta < 0 & \text{(ii)} & \cos \theta < 0 & \& \sin \theta > 0 & \text{(i)} \\ \cot \theta > 0 & \& \sec \theta < 0 & \text{(iv)} & \sin \theta < 0 & \& \sec \theta < 0 & \text{(iii)} \\ 0 < \cot \theta < 1 & \text{(vi)} & \cos \theta < 0 & \& \tan \theta < 0 & \text{(v)} \end{array}$$

5. جيڪڏهن $\cos \theta = \frac{3}{5}$ ، $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ ، ته پوءِ هيٺين باقي رهيل ٽرگناميٽري نسبتن جون قيمتون لھو.

6. باقي رهيل ٽرگناميٽري عمل / نسبتون لھو جيڪڏهن :

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ \& \theta بيٺي چوٽائي حصي آهي } \text{(i)}$$

$$\cos \theta = \frac{2}{3} \text{ \& \theta چوٿين چوٽائي حصي ۾ آهي } \text{(ii)}$$

$$\tan \theta = -\frac{1}{2} \text{ \& \theta بيٺي چوٽائي حصي ۾ آهي } \text{(iii)}$$

$$\sec \theta = \operatorname{cosec} \theta = \sqrt{2} \text{ \& \theta پھرين چوٽائي حصي ۾ آهي } \text{(iv)}$$

$$\tan \theta \text{ \& \cos \theta = } \frac{1}{2} \text{ \& \theta واڌو آهي. } \text{(v)}$$

7. هيٺين جا ملھ لھو.

$$\frac{\sin 45^\circ}{\sin 45^\circ + \cot 45^\circ} \text{ (iii)} \quad \frac{\tan 60^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 60^\circ \tan 30^\circ} \text{ (ii)} \quad \tan 30^\circ \tan 60^\circ + \tan 45^\circ \cot 45^\circ \text{ (i)}$$

$$\frac{\tan 45^\circ + \cot 45^\circ}{\sin 60^\circ \cos 30^\circ - \cos 60^\circ \sin 30^\circ} \text{ (vi)} \quad \frac{\tan \frac{\pi}{4} - \tan \frac{\pi}{6}}{1 + \tan \frac{\pi}{4} \cdot \tan \frac{\pi}{6}} \text{ (v)} \quad \cos \frac{\pi}{6} \cdot \cos \frac{\pi}{3} + \sin \frac{\pi}{6} \cdot \cos \frac{\pi}{3} \text{ (iv)}$$

30.4 ٽرگناميٽري جا بنيادي فارمولا (آئيڊنٽيٽيون). (Trigonometric Identities):

آئيڊنٽيٽي هڪ مساوات هوندي آهي جيڪا بدلجندڙ جي سڀني قيمتن تي درست هوندي آهي (سواءِ ان تي جتي قيمت اڻ بيان ڪيل اچي).


30.4.1 ٽرگناميٽري وارين آئيڊنٽيٽين يا بنيادي فارمولن کي ثابت ڪرڻ ۽ مختلف ٽرگناميٽري وارا

تعلق ظاهر ڪرڻ لاءِ انهن جو استعمال ڪرڻ:

ايڪي واري گول جي گوني ٽڪنڊي سان واسطو رکندڙ ڪنهن به حقيقي عدد θ لاءِ، اسان وٽ هيٺيان

بنيادي فارمولا آهن:

$$\operatorname{cosec}^2 \theta = 1 + \cot^2 \theta \text{ (iii)} \quad \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta \text{ (ii)} \quad \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ (i)}$$




(i) ثابتي:

ايڪي واري گول ۾، هڪ گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ΔOAP ، تي غور ڪريو جنهن ۾ ريڊيان $m\angle AOP = \theta$ جيڪا معياري بيهڪ ۾ آهي. فرض ڪريو ته ڪنڊ جي انتهائي پاسي تي ٽيڪو $P(x, y)$ آهي.

فيثاغورث سڌيان جي مطابق اسان وٽ آهي. $x^2 + y^2 = 1$

$$\Rightarrow \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \quad [\square \quad x = \cos \theta \quad \text{۽} \quad y = \sin \theta]$$

اهڙي طرح ثابت ٿيو.



شڪل: 30.20

(ii) ثابتي: فيثاغورث سڌيان جي مطابق.

$$1 = x^2 + y^2$$

ٻنهي پاسن کي x^2 سان ونڊ ڪندي، اسان کي مليو،

$$\Rightarrow \frac{1}{x^2} = 1 + \frac{y^2}{x^2} \quad \text{يا} \quad \frac{1}{x^2} = 1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta,$$

$$\Rightarrow \boxed{\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta} \quad (\text{بشرطيڪ } x = \cos \theta \neq 0)$$

اهڙي طرح ثابت ٿيو.

(iii) ثابتي: فيثاغورث سڌيان جي مطابق.

$$1 = x^2 + y^2$$

ٻنهي پاسن کي y^2 سان ونڊ ڪندي اسان کي مليو

$$\frac{1}{y^2} = \frac{x^2}{y^2} + 1, \quad \text{يا} \quad \left(\frac{1}{y}\right)^2 = \left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1$$

$$(\text{بشرطيڪ } \sin \theta \neq 0) \quad \left(\frac{1}{\sin \theta}\right)^2 = (\cot \theta)^2 + 1, \quad \Leftarrow$$

$$\left(\because \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \cot \theta\right) \quad \boxed{\operatorname{cosec}^2 \theta = 1 + \cot^2 \theta} \quad \Leftarrow$$

اهڙي طرح ثابت ٿيو.

مثال 1: ثابت ڪريو ته: $(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta$


ثابتي:

$$\text{L.H.S} = (\sin \theta + \cos \theta)^2$$

$$= \sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$= 1 + 2 \sin \theta \cos \theta \quad [\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1]$$

$$= \text{R.H.S}$$



$$= \frac{\sin \theta + \tan \theta}{\sin \theta - \tan \theta}$$

$$= \text{R.H.S}$$

$$\text{L.H.S} = \text{R.H.S} \quad \therefore$$

$$\frac{1 + \sec \theta}{1 - \sec \theta} = \frac{\sin \theta + \tan \theta}{\sin \theta - \tan \theta} \quad \therefore$$

انهي ڪري ثابت ٿيو

مثال 4: ثابت ڪريو ته $\sin \theta = \tan \theta \cdot \cos \theta$

ثابتي:

$$\text{L.H.S} = \sin \theta,$$

$$= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cdot \cos \theta, \quad (\text{بشرطيڪ } \cos \theta \neq 0)$$

$$= \tan \theta \cdot \cos \theta,$$

$$= \text{R.H.S}$$

$$\text{L.H.S} = \text{R.H.S}$$

$$\sin \theta = \tan \theta \cdot \cos \theta \quad \therefore$$

انهي ڪري ثابت ٿيو

مشق 30.4

1- هيٺين کي ثابت ڪريو

$$(\cos \theta \neq 0) \quad \sin^2 \theta = (\sec^2 \theta - 1) \cos^2 \theta \quad (i)$$

$$(\cos \theta \neq 0) \quad \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta + \sec \theta \quad (ii)$$

$$(\cos \theta \neq 0) \quad \tan \theta = \sin \theta \sqrt{1 + \tan^2 \theta} \quad (iii)$$


$$\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \quad (iv)$$

$$\sin^3 \theta = \sin \theta - \sin \theta \cos^2 \theta \quad (v)$$

$$(\cos \theta \neq 1) \quad \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta}} = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} \quad (vi)$$

$$(\tan \theta \neq 0) \quad \sqrt{\frac{\sec \theta + 1}{\sec \theta - 1}} = \frac{\sec \theta + 1}{\tan \theta} \quad (vii)$$

$$(\tan \theta \neq 0) \quad \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} + \cos \theta = \sec \theta \quad (viii)$$



$$L.H.S = R.H.S \quad \therefore$$

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta \quad \therefore$$

اهڙي طرح ثابت ٿيو

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \quad \text{مثال 2: ثابت ڪريو ته}$$

ثابتي:

$$L.H.S = \sin \theta$$

$$= \sqrt{(\sin \theta)^2}$$

$$= \sqrt{\sin^2 \theta},$$

$$= \sqrt{1 - \cos^2 \theta}, \quad [\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1]$$

$$R.H.S =$$

$$\therefore R.H.S = L.H.S$$

$$\therefore \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$$

انهي ڪري ثابت ٿيو

مثال 3:

$$(\cos \theta \neq 0 \text{ بشرطيڪ}) \quad , \quad \frac{1 + \sec \theta}{1 - \sec \theta} = \frac{\sin \theta + \tan \theta}{\sin \theta - \tan \theta}$$

ثابت ڪريو ته

ثابتي:

$$L.H.S = \frac{1 + \sec \theta}{1 - \sec \theta},$$

$$= \frac{1 + \frac{1}{\cos \theta}}{1 - \frac{1}{\cos \theta}},$$

$$\frac{\cos \theta + 1}{\cos \theta - 1}$$

$$= \frac{\sin \theta (\cos \theta + 1)}{\sin \theta (\cos \theta - 1)} \quad (\sin \theta \neq 0 \text{ بشرطيڪ})$$

$$= \frac{\sin \theta \cos \theta + \sin \theta}{\sin \theta \cos \theta - \sin \theta}$$

$$= \frac{\frac{\sin \theta \cos \theta}{\cos \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta}}{\frac{\sin \theta \cos \theta}{\cos \theta} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta}}$$

$$= \frac{\sin \theta + \sin \theta}{\sin \theta - \sin \theta} \quad (\text{انس ۽ چيد ڪي } \cos \theta \text{ سان ونڊيندي})$$



$$(\sin \theta \neq 0 \text{ يا } \cos \theta \neq 0), \sec \theta - \cos \theta = (\cot \theta + \cos \theta)(\tan \theta - \sin \theta) \quad (\text{ix})$$

$$(\sin \theta \neq 0), \frac{\cot \theta + \operatorname{cosec} \theta}{\sin \theta + \tan \theta} = \operatorname{cosec} \theta \cot \theta \quad (\text{x})$$

$$(\cos \theta \neq 0) \quad \sin^2 \theta = \frac{\tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta}, \quad (\text{xi})$$

$$(\sin \theta \neq 0) \quad \cos^2 \theta = \frac{\cot^2 \theta}{1 + \cot^2 \theta}, \quad (\text{xii})$$

$$(\sin \theta \neq 0 \text{ يا } \cos \theta \neq 0), \sin \theta \cos \theta \tan \theta + \sin \theta \cos \theta \cot \theta = 1 \quad (\text{xiii})$$


2. پهرين اظهار کي ٻيئي ۾ مٽايو

$$\nearrow \tan^2 \theta \text{ کي } (\sec \theta + 1)(\sec \theta - 1) \quad (\text{i})$$


$$\nearrow \tan \theta \text{ کي } \frac{\cos \theta}{\sin \theta} - \frac{\operatorname{cosec} \theta}{\cos \theta} \quad (\text{ii})$$

$$\nearrow \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} \text{ کي } \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta \quad (\text{iii})$$

30.5 اُچائي ۽ هيٺاهين واريون ڪنڊون (Angles of Elevation and Depression)
(i) 30.5. اُچائي ۽ هيٺاهين واريون ڪنڊون لهڻ



شکل (i): 30.21



شکل (ii): 30.21


جيڪڏهن ڪا شي مشاهد جي اک جي سطح کان مٿي آهي ته پوءِ ان جي ڪنڊ کي اُچائي واري ڪنڊ چئبو آهي. جيڪڏهن ڪا شي اک جي سطح کان هيٺ آهي ته پوءِ افقي ليڪ کان ان شي جي ڪنڊ کي هيٺاهين، واري ڪنڊ چئبو آهي.

عام زندگي ۾، اهي ان شي جو فاصلو يا ڪنڊ يا انهن جي تعلق کي معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ٿينديون آهن جيڪي شيون مشاهد جي هنڌ کان مٿي يا هيٺ هجن ۽ ان کان ڊگهي فاصلي تي هجن.


30.5 (ii) اُچائي ۽ هيٺاهين وارن ڪنڊن تي مشتمل عام زندگي جا مسئلا حل ڪرڻ

مثال 1: بجلي جي ٽنڀي جي چوٽي جي زمين تي هڪ ٽپڪي کان اُچائي واري ڪنڊ 30° آهي جڏهن ته اهو ٽپڪو ٽنڀي جي پايي کان 18 ميٽر جي فاصلي تي آهي. بجلي جي ٽنڀي جي اُچائي لھو.

حل: ٽنڀي جي حصي جي ٽپڪي P کان اُچائي واري ڪنڊ 30° آهي ۽ فرض ڪريو ته ٽنڀي جي اُچائي h آهي. جڏهن ته اهو ٽپڪي P کان 18 ميٽر پري آهي. ΔPAB ۾ اسان وٽ $\theta = 30^\circ$ ۽ $PA = 18$ ميٽر آهي



$$\begin{aligned}\therefore \tan 30^\circ &= \frac{h}{|PA|} = \frac{h}{18} \\ \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} &= \frac{h}{18} \\ \Rightarrow h &= \frac{18}{\sqrt{3}} \\ \Rightarrow h &= \frac{18\sqrt{3}}{3} = 6\sqrt{3} \text{ ميٽر}\end{aligned}$$



شکل: 30.22

اهڙي طرح بجلي جي ٽنڀي جي اوچائي $6\sqrt{3}$ ميٽر آهي.

مثال 2: هڪ شي جي اوچائي لھو جيڪڏھن سج جي اوچائي واري ڪنڊ 19° ۽ ان شي جي پاڇي جي ڊيگھ 1.7 ميٽر آهي.

حل: مليل آهي ته شي جي اوچائي واري ڪنڊ 19° آهي يعني $\theta = 19^\circ$ ۽ پاڇي جي ڊيگھ $a = 1.7\text{m}$ آهي جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي.

ان کانپوءِ

$$\begin{aligned}\tan 19^\circ &= \frac{h}{a} = \frac{h}{1.7} \\ \Rightarrow h &= (1.7) \cdot \tan 19^\circ \\ \Rightarrow h &= (1.7) \cdot (0.3443) = 0.585\text{m}\end{aligned}$$

انهي ڪري گھربل اوچائي تقريبا 0.585 ميٽر آهي.




شکل: 30.23

مثال 3: هڪ ٽاور جي چوٽي کان، ويجهي واري بندر گاه جي هڪ جهاز جي هيٺاهين واري ڪنڊ 40° آهي ان جي آبي ليڪ سان جيڪڏھن ٽاور جي اوچائي 35 ميٽر آهي ته جهاز ۽ ٽاور جي پايي جي وچ وارو فاصلو لھو.

حل: فرض ڪريو ته 'x' فاصلو آهي جهاز (ٽپڪي B تي) ۽ ٽاور جي پايي (ٽپڪي A تي) جي وچ ۾ جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي ۽ ٽاور جي اوچائي 'h' آهي.

هتي
(جهاز جي اوچائي) $h = 35$ ميٽر
(هيٺاهين واري ڪنڊ) $\theta = 40^\circ$
 $x = ?$ ۽

$$\begin{aligned}\text{۾ } \triangle ABC \\ \tan 40^\circ &= \frac{h}{x} = \frac{35}{x} \\ \Rightarrow x &= \frac{35}{\tan 40^\circ} = \frac{35}{0.8391} = 41.71\text{m (اندازاً)}\end{aligned}$$



شکل: 30.24

اهڙي طرح جهاز ۽ ٽاور جي پايي جي وچ وارو فاصلو 41.71 ميٽر (اندازاً) آهي.




مشق 30.5

1. 102 ميٽر اوچائي واري روشني جي مينار جي چوٽي کان، هڪ جهاز جي هيٺاهين واري ڪنڊ $30'18''$ آهي. جهاز روشني جي مينار کان ڪيترو پري آهي.
2. هڪ ڏاڪڻ، زمين سان 60° جي ڪنڊ ٺاهي ٿي ۽ پٽ تي $6m$ جي اوچائي تائين پهچي ٿي. ڏاڪڻ جي ڊيگهه لھو.
3. اوچائي واري ڪنڊ لھو جيڪڏهن $6m$ اوچائي وارو بانس $2\sqrt{3}m$ جي ڊيگهه وارو پاڇو ٺاهي ٿو.
4. اُپي ٽڪر جي چوٽي جي اوچائي واري ڪنڊ 30° آهي. هڪ ٽپڪي کان اُپي ٽڪر ڏانهن 210 ميٽر جو پنڌ ڪندي، اوچائي واري ڪنڊ 45° آهي. اُپي ٽڪر جي اوچائي لھو.
5. هڪ مشاهدو ڪندڙ ڦوڪڻو زمين کان $4280m$ مٿي ۽ فارم گهر کان $9613m$ پري آهي. ڦوڪڻي کان فارم گهر جي هيٺاهين واري ڪنڊ لھو.

جائزي واري مشق 30

1. درست جواب تي نشان ✓ لڳايو

- i. اهو ماپ جو نظام جنهن ۾ ڪنڊ کي ريڊيان ۾ ماپجي، ان کي _____ چئبو آهي.
 (a) CGS نظام (b) بنياد 60 وارو نظام
 (c) MKS نظام (d) گولائي وارو نظام
- ii. ٻن غير هم ليڪي شعاعن جو مشترڪ چوٽي تي، ميلاپ _____ ڪوٺبو آهي.
 (a) هڪ ڪنڊ (b) هڪ/ڊگري
 (c) هڪ منٽ (d) ريڊيان
- iii. _____ = 10°
 (a) $600''$ (b) $3600''$ (c) $600'$ (d) 600
- iv. _____ = $5 \frac{\pi}{4}$ ريڊيان
 (a) 115° (b) 225° (c) 135° (d) 45°
- v. _____ = $\frac{1}{2} \sec 45^\circ$
 (a) $\sqrt{2}$ (b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (c) $\frac{2}{\sqrt{2}}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- vi. _____ = $\operatorname{cosec} \theta \cdot \sin \theta$
 (a) 1 (b) 0 (c) -1 (d) 0.5
- vii. _____ = $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta$
 (a) 0 (b) 1 (c) -1 (d) $\cos^2 \theta$



.viii

هڪ ايڪي واري گول ۾ ٽپڪي (x,y) لاءِ $\sin \theta = \frac{y}{r}$ ۽ $\cos \theta = \frac{x}{r}$ ۾ $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ۽ $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ جيڪڏهن θ ٽئين چوٽائي ۾ موجود آهي ته $\tan \theta = \frac{y}{x}$ جيڪڏهن θ ٽئين چوٽائي ۾ موجود آهي ته $\tan \theta = \frac{y}{x}$

.ix

جيڪڏهن $\theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ ۽ $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ۽ $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ جيڪڏهن θ ٽئين چوٽائي ۾ موجود آهي ته $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$

.x

جيڪڏهن ڪا شي، مشاهد جي سطح کان مٿي آهي ته پوءِ افقي شعاع ۽ نظر جي افقي ليڪ جي وچ واري ڪنڊ کي چئبو آهي. (a) هيٺاهين واري ڪنڊ (b) اوچائي واري ڪنڊ (c) هڪ ويڪري ڪنڊ (d) ڪوبه نه

.2

ڪنڊ ۽ معياري بيهڪ واري ڪنڊ کي بيان ڪريو

.3

70° 30' 90" کي ريڊيانن ۾ بدلايو

.4

(7200) ۾ ڪيتريون ڊگريون موجود آهن

.5

ريڊيان واري ماپ کي ڊگري ۾ بدلايو

.6

ريڊيان کي D°M'S" جي صورت ۾ لکو:

.7

θ جي قيمت لھو. جڏهن ته $l = 7\text{cm}$ ۽ $\theta = \frac{\pi}{4}$ ريڊيان

.8

θ جي قيمت لھو جيڪڏهن هڪ قوس جي ڊيگهه ۽ گول جو رداس پاڻ ۾ برابر هجن.

.9

ثابت ڪريو ته $(1 - \cos^2 \theta)(1 + \cot^2 \theta) = 1$

.10

گول جي سيڪٽر جي ايراضي لھو جڏهن ته $r = 2\text{cm}$ ۽ ريڊيان $\theta = 3$

خلاصو


جيڪڏهن ڪنهن گول جي گھيري کي 360 برابر حصن ۾ ورهائجي ته پوءِ ان هر هڪ حصي جي مرڪز تي ٺهيل ڪنڊ 1 ڊگري ڪوٺي آهي ۽ ان کي 1° سان ظاهر ڪبو آهي. گول جي مرڪز تي ٺهيل ڪنڊ اهڙي طرح جو گول جو رداس ۽ قوس جي ڊيگهه برابر هجن ته پوءِ اها ڪنڊ هڪ ريڊيان جي آهي. ريڊيان/ڊگري جي ذيلي ورڇ

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ ريڊيان} \approx 0.01745 \text{ ريڊيان}$$

$$1 \text{ ريڊيان} = \left(\frac{180^\circ}{\pi} \right) \approx 57.3^\circ$$

گول جي قوس جي ڊيگهه لھڻ جو فارمولو $l = r\theta$

گول جي سيڪٽر جي ايراضي لھڻ جو فارمولو $\frac{1}{2} l r = \frac{1}{2} r^2 \theta$ يا



➤ آهي ڪنڊون جن جا شروعاتي ۽ انتهائي پاسا ساڳيا هجن. انهن کي هم انتهائي ڪنڊون چئبو آهي ۽ اهي 2π ريڊيانن جي ضرب اُپت جو فرق رکن ٿيون انهن کي عام ڪنڊون به چئبو آهي.

➤ هڪ ڪنڊ کي معياري بيهڪ واري ڪنڊ چئبو جيڪڏهن ان جي چوٽي اصل ٽپڪي (Origin) تي هجي ۽ ان جو شروعاتي پاسو واڌو x -axis تي هجي.

➤ هڪ مستطيلي ڪوآرڊينينٽ نظام ۾ ٻه محور متاچري کي چار برابر حصن ۾ ورهائڻ ٿا ۽ هر هڪ حصي کي چوٿون يا چوٿائي حصو چئبو آهي انهي ڪري چار چوٿائي حصا آهن ٿا.

0° ۽ 90° جي وچ واريون ڪنڊون پهرين چوٿائي حصي ۾ آهن

90° ۽ 180° جي وچ واريون ڪنڊون ٻيئي چوٿائي حصي ۾ آهن

180° ۽ 270° جي وچ واريون ڪنڊون ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهن

270° ۽ 360° جي وچ واريون ڪنڊون چوٿين چوٿائي حصي ۾ آهن

➤ جيڪڏهن ڪنهن معياري ڪنڊ جو انتهائي پاسو x -axis يا y -axis سان ٽهڪندڙ هجي ته پوءِ ان کي چوٿائي ڪنڊ چئبو آهي.

➤ ڪنڊ θ لاءِ ڇهه بنيادي ٽرگناميٽري نسبتون آهن. انهي آهن $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$, $\csc \theta$, $\sec \theta$ ۽ $\cot \theta$

➤ ايتڙ ٽرگناميٽري نسبتون هيٺ ڏنل آهن.

$$\sin \theta = \frac{1}{\csc \theta} \quad \text{يا} \quad \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sec \theta} \quad \text{يا} \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{1}{\cot \theta} \quad \text{يا} \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

➤ آئيڊنٽيٽي (Identity) هڪ مساوات هوندي آهي جيڪا بدلجندڙ جي سڀني قيمتن تي درست هوندي آهي سواءِ ان تي جتي قيمت اڻ بيان ڪيل اچي.

➤ ٽرگناميٽري جون بنيادي آئيڊنٽيٽيز (Identities) ٽي آهن

$$(i) \quad \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad (ii) \quad \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$$


$$(iii) \quad \csc^2 \theta = 1 + \cot^2 \theta$$

➤ جيڪڏهن ڪا شئي مشاهدي جي اک جي سطح کان مٿي آهي ته پوءِ افقي ليڪ کان نظر واري ليڪ ڏانهن گهڙي جي اُپتي رستي واري ڪنڊ کي اوچائي واري ڪنڊ چئبو آهي.

➤ جيڪڏهن ڪا شئي مشاهد جي اک جي سطح کان هيٺ آهي ته پوءِ افقي ليڪ کان نظر واري ليڪ ڏانهن گهڙي جي سڌي رستي واري ڪنڊ کي هيٺاهين واري ڪنڊ چئبو آهي.

جواب






مشق 17.1

1. (i) $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ (ii) $B = \{4, 6, 8, 9, 10\}$
 (iii) $C = \{7, 11, 13\}$ (iv) $D = \{9, 11, 13, 15\}$
 (v) $E = \{-11, 11\}$ (vi) $F = \{ \}$ يا $\emptyset$
2. (i) $A = \{x | x \in \mathbb{Q} \wedge 5 < x < 6\}$ (ii) $B = \{x | x \text{ واڌو ونڊيتڙ آهي 12 جو}\}$
 (iii) $C = \{x | x \in \mathbb{Z} \wedge -40 \leq x \leq 40\}$ (iv) $D = \{x | x \in \mathbb{E} \wedge -4 \leq x \leq 4\}$
 (v) $E = \{x | x \text{ چورس آهي پهرين پنجن قدرتي انگن جو}\}$
 (vi) $F = \{x | x \text{ هڪ ڪاٿو اڪي سڄو عدد آهي}\}$
3. (i) $A = \{x | x \in \mathbb{W} \wedge x < 0\}$ (ii) $A = \text{چوڪرين جي ڪاليج ۾ چوڪرن جو سيٽ}$
 (iii) $A = \{x | x \in \mathbb{N} \wedge 2x + 1 = 2\}$ (iv) $A = \{x | x \in \mathbb{R} \wedge x^2 = -1\}$
 (v) $A = \text{پاڪستان جي عورت صدرن جو سيٽ}$
4. i. محدود ii. محدود iii. لامحدود iv. محدود v. لامحدود
5. (i) $\{i, o\}$ ۽ $\{a, i\}, \{e, u\}$ تي واجب ما تحت سيٽ آهن: Improper subset is $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ غير واجب ما تحت سيٽ آهي:
 (ii) $\{0, +2\}$ ۽ $\{-1, 0\}, \{+1, +2\}$ تي واجب ما تحت سيٽ آهن: غير واجب ما تحت سيٽ آهي: $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$
6. $\{x | x \in \mathbb{Z} \wedge -1 < x < 1\}$ ۽ $\{x | x \in \mathbb{N} \wedge x^2 = 16\}$
7. (i) $P(A) = \{\emptyset, \{5\}, \{10\}, \{15\}, \{5, 10\}, \{5, 15\}, \{10, 15\}, \{5, 10, 15\}\}$
 (ii) $P(B) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{0, 3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{0, 1, 2\}, \{0, 2, 3\}, \{0, 1, 3\}, \{1, 2, 3\}, \{0, 1, 2, 3\}\}$
8. i. ممڪن نه آهي ii. واحد سيٽ iii. خالي سيٽ

مشق 17.2

1. i. منفرد سيٽ ii. لاڳاپيل سيٽ iii. جزا
 iv. مڪمل سيٽ v. جزا
2. i. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$ ii. $A \cap B = \{2, 4, 6\}$ iii. $A - B = \{1, 3, 5\}$
 iv. $B - A = \{8, 10\}$ v. $A \Delta B = \{1, 3, 5, 8, 10\}$



3.





- i. $A' = \{6, 7, 8, 9, 10\}$
- ii. $B' = \{2, 4, 6, 8, 10\}$
- iii. $A' \cup B' = \{2, 4, 6, 7, 8, 9, 10\}$
- iv. $A' \cap B' = \{6, 8, 10\}$
- v. $(A \cup B)' = \{6, 8, 10\}$
- vi. $(A \cap B)' = \{2, 4, 6, 7, 8, 9, 10\}$
- vii. $A' \Delta B' = \{2, 4, 7, 9\}$
- viii. $(A \Delta B)' = \{1, 3, 5, 6, 8, 10\}$
- ix. $A - B' = \{1, 3, 5\}$
- x. $A' - B = \{6, 8, 10\}$

5.





- i. $A \cap B = \{6n | n \in \mathbb{N}\}$
- ii. $A \cup C = \{2n | n \in \mathbb{N}\}$
- iii. $B \cap C = \{12n | n \in \mathbb{N}\}$


مشق 17.4

(i)




(ii)






(iii)

$A \cup B$




$A \cap B$



$A \Delta B$



$A - B$




17.5 مشق

1. i. $y = 17$ و $x = 16$ ii. $y = 2$ و $x = 1$ iii. $y = 1$ و $x = 3$

2. $n(P \times Q) = 150$, $n(Q \times P) = 150$, $n(P \times P) = 100$

3. (i) $A \times B = \{(1,2), (1,3), (2,2), (2,3)\}$
(ii) $B \times C = \{(2,1), (2,3), (2,5), (3,1), (3,3), (3,5)\}$
(iii) $A \times (B \cup C) = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,5), (2,1), (2,2), (2,3), (2,5)\}$
(iv) $B \times (A \cup C) = \{(2,1), (2,2), (2,3), (2,5), (3,1), (3,2), (3,3), (3,5)\}$
(v) $(A \cap B) \times (B \cap C) = \{(2,3)\}$

4. (i) $R_1 = \{(5,2), (5,3)\}$, $R_2 = \{(5,1), (3,3)\}$, $R_3 = \{(6,2)\}$
(ii) $R_1 = \{(2,5)\}$, $R_2 = \{(3,5)\}$, $R_3 = \{(2,5), (8,5)\}$, $R_4 = \{(3,5), (1,5), (3,6)\}$
(iii) $R_1 = \emptyset$, $R_2 = \{(1,1), (1,2)\}$, $R_3 = \{(2,1), (2,3)\}$, $R_4 = \{(1,2), (2,2), (3,3)\}$,
 $R_5 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$
 $R_1 = \emptyset$, $R_2 = \{(5,5)\}$, $R_3 = \{(5,6)\}$, $R_4 = \{(6,5)\}$, $R_5 = \{(6,6)\}$,
 $R_6 = \{(5,5), (5,6)\}$, $R_7 = \{(5,5), (6,5)\}$, $R_8 = \{(5,5), (6,6)\}$,
 $R_9 = \{(5,6), (6,5)\}$, $R_{10} = \{(5,6), (6,6)\}$, $R_{11} = \{(6,5), (6,6)\}$,
(iv) $R_{12} = \{(5,5), (5,6), (6,5)\}$, $R_{13} = \{(5,5), (6,5), (6,6)\}$,
 $R_{14} = \{(5,5), (5,6), (6,6)\}$, $R_{15} = \{(5,6), (6,5), (6,6)\}$,
 $R_{16} = \{(5,5), (5,6), (6,5), (6,6)\}$,



5. جوڙي واري تعلقن جو تعداد آهي: 2^{12}

6. (i) $R_1 = \{(0,2), (0,4), (1,2), (1,4), (2,2), (2,4), (3,2), (3,4)\}$

(ii) $R_2 = \{(1,8), (3,6)\}$

(iii) $R_3 = \{(3,2)\}$

7. i. رينج $= \{1, 3, 5, 7, 9\}$

ii. ڊومين $= \{3, 4, 5, 6\}$

8. i. ڊومين $= \{0, 1, 2, 3\}$
رينج $= \{2, 5, 8, 11\}$

ii. ڊومين $= \{6, 7, 8, 9, \dots\}$
رينج $= \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

9. $f = \{1, 2, 3, 4\}$ ڊومين
 $f = \{5, 6, 7, 8\}$ رينج
قدرتي عددن جو سيٽ ڪوڊومين آهي
 $f(2) = 6, f(4) = 8$

10. i. عمل نه آهي

ii. عمل نه آهي

iii. اٽنو عمل

iv. اٽنو عمل

v. ٻئي ون - ون ۽ اٽنو

11. i. ون - ون عمل

ii. ون - ون مطابقت

iii. نه ون - ون عمل ۽ نه ئي ون - ون مطابقت

12. i. $f_1 = \{(a,x), (b,y), (c,y)\}$

ii. $f_2 = \{(p,a), (q,b), (r,c), (s,a)\}$

iii. $f_3 = \{(a,q), (b,r), (c,s)\}$

iv. $f_3 = \{(x,a), (y,c), (z,b)\}$


جائزي واري مشق 17

1. گھڻ چونڊاڻا سوال (MCQs)





- | | | | | |
|--------|---------|----------|--------|-------|
| i. d | ii. b | iii. c | iv. c | v. b |
| vi. c | vii. b | viii. c | ix. a | x. b |
| xi. a | xii. a | xiii. d | xiv. c | xv. c |
| xvi. b | xvii. c | xviii. d | xix. c | xx. b |

2. (a) $A \cup B = \{1, 2, 4, 5, 6\}$ (b) $A \cap B = \{2\}$ (c) $A \Delta B = \{1, 4, 5, 6\}$

(d) $A - B = \{1, 5\}$ (e) $A' = \{3, 4, 6\}$ (f) $B' = \{1, 3, 5\}$



5.



6. (a) $f_1 = \{(1,6), (2,8), (5,6)\}$ (b) $f_2 = \{(1,6), (2,6), (5,6)\}$

7. (a) $R_1 = \{(a,a), (a,c)\}, R_2 = \{(c,a), (c,c)\}$

(b) $R_1 = \{(b,b), (b,d)\}, R_2 = \{(d,b), (d,d)\}$

(c) $R_1 = \{(a,b)\}, R_2 = \{(a,d), (c,b)\}, R_3 = \{(c,b), (c,d)\}$

(d) $R_1 = \{(a,c), (b,d)\}, R_2 = \{(c,c), (d,c)\}$

18.1 مشق

1. i. 5:2 ii. 3:5 iii. 2:9 iv. 1:10 v. 3:8 vi. 35:52

2. i. 5:3 ii. 3:5 iii. 3:8 iv. 5:8

3. 6:17 4. $a = 8$ 5. گهريل عدد 6 آهي.


6. $\frac{47}{81}$

7. i. $x = 45$ ii. $x = \frac{21}{26}$ iii. $x = 38$ iv. $x = a^2 - b^2$ v. $x = 4$

18.2 مشق

1. (i) $y = \frac{10}{3}x$ (ii) $y = 20$ (iii) $x = \frac{9}{2}$

2. (i) $V = \frac{5}{8}T$ (ii) $V = \frac{75}{4}$ (iii) $T = 16$ 3. $V = 216$ جڏهن $U = 6$
 $U = 5$ جڏهن $V = 125$



4. $F = 375$ 5. $x = 10$ جڏهن $y = 3$ 6. $V = 4$ جڏهن $P = 81$

7. i. $r = 5$ جڏهن $F = \frac{32}{25}$ ii. $F = 24$ جڏهن $r = \frac{2}{\sqrt{3}}$

8. $x = \frac{1}{8}$ 9. $d = \frac{1}{2}$ 10. $y = \frac{18}{5}$

18.3 مشق

1. (i) 18 (ii) $(a-b)^2$ (iii) $\frac{(x+y)^2}{x^2-xy+y^2}$ (iv) $a+b$
 2. (i) 1 (ii) $(a-b)$ (iii) $2a^2$ (iv) a^2+ab+b^2
 3. (i) 12 (ii) $10a^2b^2$ (iii) a^2-b^2 (iv) $a-b$
 4. (i) 15 (ii) 12 (iii) 8 (iv) 31

18.4 مشق

3. (i) $\{3, 9\}$ = حل سيٽ (ii) $x = \frac{5}{4}$ (iii) $\frac{101}{4}$ (iv) 3

18.5 مشق

1. $y = \frac{x^2z}{24}$ 2. $y = \frac{6xu^2}{5vt}$ 3. $w = 360$
 $y = 32$
 4. 3.21 سيڪنڊ 5. 177.8 ڪعبي يونٽ

18.7 مشق

1. 3.068 ايڪسپيٽر 2. 0.01125 فوٽ ڪينڊلز 3. 900 پاؤنڊ 4. 360000 رُپيا
 5. 5600 رُپيا


جائزي واري مشق 18

1. (MCQs) گهڻ چونڊائڻا سوال

i. d ii. b iii. a iv. b v. b
 vi. c vii. c viii. b ix. a x. c
 xi. a xii. c xiii. a xiv. a xv. c

2. (i) $20m : 1m$ (ii) $500g : 3g$
 3. (i) $x = 4$ (ii) $x = 14$ 4. $y = 48$ 5. $y = \frac{25}{2}$

7. $x = \frac{7 \pm i\sqrt{15}}{2}$ 8. $x = 10$ 9. 3.33 ايڪسپيٽر




19.1 مشق

1. (i) چورس قالب (ii) کالمي قالب
(iii) قطاري قالب (iv) غير طرفي قالب
(v) اريبي قالب
2. i. 3×3 ii. 3×2 iii. 2×3 iv. 3×1 v. 1×1
3. (i) هم شكلي قالب (ii) اُبتو هم شكلي قالب
(iii) هم شكلي قالب (iv) هم شكلي قالب
4. (i) $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ (ii) ممکن نه آهي (iii) ممکن نه آهي (iv) $\begin{bmatrix} 7 & -5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$
(v) $\begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$ (vi) $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (vii) $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ (viii) $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$
5. (i) $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \\ 6 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} -5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} 5 & 4 & 9 \\ 2 & 11 & 2 \\ 15 & 10 & -1 \end{bmatrix}$
(iv) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 6 & 8 & 7 \\ 5 & 12 & 9 \end{bmatrix}$ (v) $\begin{bmatrix} 9 & 8 & 1 \\ 13 & 5 & -3 \\ -4 & 4 & 2 \end{bmatrix}$ (vi) $\begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$
8. $\begin{bmatrix} -8 & 3 \\ 51 & -36 \end{bmatrix}$ 9. $d=1$ ۽ $c=-1, b=1, a=-2$
10. $z=2$ ۽ $y=3, x=3, d=2, c=3, b=2, a=-1$
11. $AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 7 & 3 & -1 \end{bmatrix}, BC = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ 12. $\begin{bmatrix} 11 & 8 & 0 \\ 11 & 11 & 2 \\ 8 & 13 & 6 \end{bmatrix}$

19.2 مشق

1. i. 29 ii. 9 iii. 7 iv. 8 v. -59 vi. -105
vii. -84 viii. 184 ix. -42 x. 0 xi. $2x$
2. i. 1 ii. 3 iii. 3 iv. -1 v. 3 vi. -3



3. (i) $x = 3$ 4. (i) نادر قالب (ii) غير نادر قالب

5. (i) $\begin{pmatrix} 7 & -6 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$ (ii) $\begin{pmatrix} -8 & 18 & -4 \\ -5 & 12 & -1 \\ 4 & -6 & 2 \end{pmatrix}$ (iii) $\begin{pmatrix} 12 & 12 & 12 \\ -18 & 0 & 0 \\ 6 & 6 & 12 \end{pmatrix}$

7. (i) $\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ (ii) وجود نثو ركي (iii) $\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -4 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(iv) $\begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -2 & -5 & -3 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ (v) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1.2 & 1.4 & 0.8 \\ -0.4 & 0.8 & 0.6 \end{pmatrix}$

8. (i) $y = 8$ ۽ $x = 5$ (ii) $y = \frac{9}{4}$ ۽ $x = -\frac{3}{2}$

جائزي واري مشق 19

1. (MCQs) گھڻ چونڊائڻا سوال

- i. c ii. c iii. d iv. b v. d
vi. a vii. c viii. b ix. a x. b


3. (i) 1×3 (ii) 2×3 (iii) 3×2

4. (i) $\begin{bmatrix} 3 & 13 & 17 \\ 3 & 4 & 4 \\ 5 & 3 & 11 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & -4 \\ -9 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} 73 & 47 & 76 \\ 5 & 13 & 20 \\ 46 & 9 & 16 \end{bmatrix}$

(iv) $\begin{bmatrix} -4 & 29 & 74 \\ -1 & 15 & 37 \\ 3 & 62 & 91 \end{bmatrix}$ (v) $\begin{bmatrix} 5 & 40 & 45 \\ 10 & 5 & 0 \\ -10 & 5 & 35 \end{bmatrix}$ (vi) $\begin{bmatrix} 14 & 35 & 56 \\ 7 & 21 & 28 \\ 49 & 14 & 28 \end{bmatrix}$

(vii) $\begin{bmatrix} -10 & 19 & 0 \\ 7 & -19 & -36 \\ -79 & -10 & 20 \end{bmatrix}$ 5. 175 7. $\begin{bmatrix} -9 & 8 & 18 \\ 47 & 47 & 47 \\ 21 & -3 & 5 \\ 94 & 94 & 94 \\ 7 & -1 & -14 \\ 47 & 47 & 47 \end{bmatrix}$

8. $x = 41, y = 5$



مشق 20.1


1. (i) اصل، حقيقي، ناطق ۽ غير مساوي آهي
(ii) اصل، حقيقي، ناطق ۽ غير مساوي آهي
(iii) اصل، منجهيل/خيالي آهن
(iv) اصل، حقيقي ۽ برابر آهن
(v) اصل، منجهيل/خيالي آهن
(vi) اصل، منجهيل/خيالي آهن
(vii) اصل، منجهيل/خيالي آهن
(viii) اصل، منجهيل/خيالي آهن
2. (i) (b) $k < \frac{9}{4}$ ۽ (a) $k = \frac{9}{4}$ (ii) (b) $k < 4$ ۽ (a) $k = 4$
(iii) (a) $k = \pm 2\sqrt{2}$ (b) $k < -2\sqrt{2}$ ۽ $k \geq 2\sqrt{2}$ (iv) (b) $k < 3$ ۽ (a) $k = 3$
(v) (a) $k = \pm 4$ (b) $k < -4$ ۽ $k > 4$
(vi) (a) $k = \pm 24$ (b) $k < -24$ ۽ $k > 24$
(vii) (a) $k = 0$ (b) $k < 0$ ۽ $k > 0$
(viii) (a) $k = \pm 2$ (b) $k < -2$ ۽ $k > 2$
3. (i) $m = 3, -2$ (ii) $m = \pm 24$
6. $q = \frac{-5}{3}$ ۽ $p = -2$

مشق 20.2

1. (i) $4\omega^2$ ۽ $4\omega, 4$ (ii) $-5\omega^2$ ۽ $-5\omega, -5$ (iii) $6\omega^2$ ۽ $6\omega, 6$
2. (i) ω (ii) 4 (iii) 729 (iv) -16

مشق 20.3

1. (i) اصلن جي جوڙ اُپت $1 =$ ۽ اصلن جي ضرب اُپت $-1 =$
(ii) اصلن جي جوڙ اُپت $\frac{3}{2} =$ ۽ اصلن جي ضرب اُپت $-2 =$
(iii) اصلن جي جوڙ اُپت $\frac{a}{a} =$ ۽ اصلن جي ضرب اُپت $\frac{-3a^2}{4} =$
(iv) اصلن جي جوڙ اُپت $\frac{5k}{7} =$ ۽ اصلن جي ضرب اُپت $k =$
2. (i) $m = \frac{2}{3}$ (ii) $m = \frac{1}{8}$
3. (i) $p = \pm 5$ (ii) $p = 0, 1$
4. (i) $m = 3$ (ii) $m = 13$



5. (i) $k = -4$ (ii) $k = -\frac{10}{7}$

6. (i) $p = \frac{3}{2}$ (ii) $p = \frac{7}{12}$

مشق 20.4


1. (i) $(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$ (ii) $(\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$
 (iii) $\frac{(\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)}{\alpha\beta}$ (iv) $\alpha\beta[(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta]$
 (v) $\frac{(\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)}{(\alpha\beta)^3}$ (vi) $\frac{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta}{(\alpha\beta)^2}$
2. (i) $\frac{9}{49}$ (ii) $-\frac{99}{98}$ (iii) $\frac{3a+4}{7a^2+3a+2}$ 3. $-\sqrt{\frac{q}{p}}$
4. $\alpha + \beta$ هڪ ليڪ کي ظاهر ڪري ٿو ۽ $\alpha\beta$ هڪ هائيپرېبولا کي ظاهر ڪري ٿو.

مشق 20.5

1. (i) $x^2 + 5x + 6 = 0$ (ii) $x^2 + x + 1 = 0$
 (iii) $x^2 - 4x + 5 = 0$ (iv) $x^2 + 8 = 0$
2. (i) $3x^2 - 9x + 8 = 0$ (ii) $36x^2 - 33x + 1 = 0$
 (iii) $x^2 - 3x + 6 = 0$ (iv) $2x^2 - x + 1 = 0$
 (v) $2x^2 - 7x + 3 = 0$
3. $rx^2 - qx + p = 0$ 4. $x^2 - 2px + 4q = 0$ 5. $px^2 - (4p - q)x + (4p - 2q + r) = 0$
6. (i) $3b^2 = 16ac$ (ii) $b^3 + ac(a + c) = 3abc$
 (iii) $b = 0$ (iv) $a = c$

مشق 20.6

1. (i) باقي رهيل ٻه اصل -1 ۽ $\frac{1}{2}$ آهن. (ii) باقي رهيل ٻه اصل -1 ۽ 2 آهن.
 (iii) باقي رهيل ٻه اصل 6 ۽ -4 آهن.
2. (i) باقي رهيل ٻه اصل $\frac{1}{3}$ ۽ $\frac{1}{2}$ آهن. (ii) باقي رهيل ٻه اصل $\sqrt{5}i$ ۽ $-\sqrt{5}i$ آهن.
 (iii) باقي رهيل ٻه اصل -1 ۽ 2 آهن.



3. $m = \frac{7}{3}$ ۽ باقي رهيل ٻه اصل $\frac{3}{2}$ ۽ -1 آهن.
 4. $a = 2$ ۽ باقي رهيل ٻه اصل 6 ۽ -1 آهن.
 5. $a = 49$ ۽ $b = 36$ ۽ باقي رهيل ٻه اصل 7 ۽ -3 آهن.

مشق 20.7

1. $\left\{(1, -1), \left(\frac{7}{5}, -\frac{1}{5}\right)\right\}$
2. $\left\{(2, 0), \left(\frac{8}{5}, \frac{4}{5}\right)\right\}$
3. $\left\{(4, 3), \left(\frac{25}{8}, -\frac{25}{6}\right)\right\}$
4. $\{(-3, 0), (1, 2)\}$
5. $\{(\pm 3, \pm 4), (0, 5), (-5, 0)\}$
6. $\left\{(\pm 2\sqrt{2}, \pm 2\sqrt{2}), \left(\frac{\pm 4\sqrt{5}}{5}, \frac{\pm 8\sqrt{5}}{5}\right)\right\}$
7. $\{(1, 2), (2, 1), (-1, -2), (-2, -1)\}$
8. $\left\{\left(2, \frac{1}{2}\right), \left(-2, -\frac{1}{2}\right)\right\}$
9. $\left\{\left(\frac{4}{5}, 20\right), \left(\frac{1}{5}, 5\right)\right\}$
10. 7 ۽ 5 يا 5 ۽ 7
11. ڊيگه $9 =$ ميٽر ۽ ويڪر $4 =$ ميٽر
12. 8 ۽ 6
13. 9cm ۽ 12cm جڏهن هيپاٽينيوز 15cm آهي.
14. 10cm ۽ 13cm , 13cm
15. 25 ۽ 30


جائزي واري مشق 20

گهڻ چونڊائڻا سوال (MCQs)

- i. d ii. c iii. b iv. c v. c
- vi. b vii. a viii. b ix. c x. c
2. (i) اصل ناطق (ii) حقيقي ۽ برابر (iii) اصل خيالي
- (iv) حقيقي ۽ غير مساوي
3. $9, 9\omega, 9\omega^2$
4. (i) S.O.R = 7 and P.O.R = 29 (ii) S.O.R = p and P.O.R = q
- (iii) S.O.R = $\frac{7}{5}$ and P.O.R = $\frac{8}{5}$ (iv) S.O.R = $\frac{11}{9}$ and P.O.R = $-\frac{28}{9}$
6. $x^2 - 2x - 1 = 0$
7. $16x^2 - 10x + 1 = 0$
8. (i) $x = 2, y = 3$ (ii) $x = 1$ and $y = 6$

مشق 21.1

1. $\frac{2}{x-3} - \frac{2}{x+3}$
2. $\frac{5}{x+1} - \frac{1}{x-3}$
3. $\frac{3}{x} + \frac{2}{x-2} - \frac{4}{x-1}$
4. $\frac{7}{x+4} - \frac{3}{x+1} - \frac{2}{2x-1}$
5. $1 + \frac{2}{x+3} + \frac{6}{x-2}$
6. $1 - \frac{2}{x-3} + \frac{3}{x+1}$
7. $3x - 2 + \frac{1}{x-2} - \frac{5}{x+2}$



مشق 21.2

1. $\frac{4}{x+1} - \frac{7}{(x+1)^2}$
2. $\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} - \frac{1}{x+3}$
3. $\frac{5}{x-2} - \frac{10}{(x-2)^2} + \frac{4}{(x-2)^3}$
4. $\frac{2}{x-5} - \frac{3}{x+2} + \frac{4}{(x+2)^2}$
5. $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{3}{(x-1)^3}$

مشق 21.3

1. $\frac{2x+3}{x^2+7} - \frac{1}{x-2}$
2. $\frac{x+5}{x^2+10} - \frac{1}{x+1}$
3. $\frac{1}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{2-5x}{x^2+5}$
4. $\frac{1}{x+1} + \frac{2x-2}{x^2-x+3}$
5. $\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x^2+3}$

مشق 21.4

1. $\frac{1}{4(1-x)} - \frac{(x+1)}{4(x^2+1)} + \frac{(x-1)}{2(x^2+1)^2}$
2. $\frac{1}{9x} + \frac{2}{9x^2} - \frac{(x+2)}{9(x^2+3)} - \frac{(x-1)}{3(x^2+3)^2}$
3. $\frac{1}{4(1+x)} + \frac{(1-x)}{4(x^2+1)} + \frac{x-1}{2(x^2+1)^2}$
4. $\frac{7}{9x+1} + \frac{7(1-x)}{9(x^2+2)} + \frac{7(1-x)}{(x^2+2)^2}$
5. $\frac{1}{x-2} - \frac{x+2}{3+x^2} - 7 \frac{(x+2)}{8(3+x^2)^2}$


جائزي واري مشق 21

1. گھڻ چونڊائڻا سوال (MCQs)

- i. d ii. b iii. d iv. b v. a
3. (i) $\frac{13}{3(x-1)} + \frac{2}{3(x+2)}$ (ii) $\frac{-7}{10x} + \frac{33}{14(x+2)} + \frac{257}{35(x-5)}$
- (iii) $\frac{11}{5(x-2)} - \frac{6x+2}{x^2+1}$ (iv) $1 + \frac{16}{x+1} - \frac{10x+8}{x^2+x+1}$

مشق 22.3

1. (a). A.M. = 11.889, H.M. = 11.194, مڌياني سراسري = 12, ڪترتي سراسري = 12.
 (b). A.M. = 0, G.M. = 0, مڌياني سراسري = 0, غيرڪترتي
 (c). A.M. = 13.044, G.M. = 12.837, H.M. = 11.727, مڌياني سراسري = 12.3.
 (d). A.M. = 56.5, G.M. = 56.339, H.M. = 56.180, مڌياني سراسري = 56, ڪترتي سراسري = 52.
 (e). ڪترتي سراسري = AB^+ . (f). غيرڪترتي
 (g). A.M. = B^+ , مڌياني سراسري = B^+ , ڪترتي سراسري = B^+ .
2. A.M. = 172.1, G.M. = 169.551, H.M. = 166.615, مڌياني سراسري = 184.5, ڪترتي سراسري = 190.
3. A.M. = ڪتا پسند ڪن ٿا = مڌياني سراسري, ڪتا پسند ڪن ٿا = ڪترتي سراسري
4. COVID.



5. $A.M.=7.149$, $G.M.=7.106$, $H.M.=7.061$, $=7$ مڌياني سراسري, $Q_1=6.5$, $Q_3=7.5$, $=7$ ڪٽرتي سراسري
6. $A.M.=32.5$, $G.M.=32.303$, $H.M.=32.102$, $=32$ مڌياني سراسري, $Q_1=30$, $Q_3=34$, $=32$ ڪٽرتي سراسري. 7. $A.M.=9640$ رڀيا.
8. $A.M.=36.464$, $G.M.=36.087$, $H.M.=35.700$, $=36.643$ مڌياني سراسري, $=36.929$ ڪٽرتي سراسري
9. $A.M.=11.9179$, $G.M.=11.9039$, $H.M.=11.8897$, $=11.9708$ مڌياني سراسري, $=12.117$ ڪٽرتي سراسري

مشق 22.4

1. (c). -6 , (d). 458.125 . 2. X غير همشڪلي آهي، Y همشڪلي آهي.
3. $(A.M.)_w = 330$, $(G.M.)_w = 310.902$, $(H.M.)_w = 295.806$.
4. $(A.M.)_w = 23.852$ ڪلوگرام، $(G.M.)_w = 23.850$ ڪلوگرام، $(H.M.)_w = 23.848$ ڪلوگرام

مشق 22.5

1. $=7$ وسعت, $Var. = 4.490$, $S.D. = 2.119$, $M.D. = 1.673$.
2. A -راندڀگر: $=185$ نسبتي, $M.D. = 45.111$, $Var. = 3699.222$, $S.D. = 60.821$.
 B -راندڀگر: $=72$ نسبتي, $M.D. = 21.111$, $Var. = 601.555$, $S.D. = 24.527$
راندڀگر- A جي پيٽ ۾ راندڀگر- B جي اسڪور ۾ وڌيڪ تسلسل آهي.
3. $S.D. (خرج) = 0.4945$, $S.D. (آمدني) = 0.488$ نسبتي.
4. A -ٽيم: $S.D. = 1.012$ نسبتي, $M.D. = 0.528$ (تقريباً).
 B -ٽيم: $S.D. = 0.866$ نسبتي, $M.D. = 0.5$ (تقريباً).
ٽيم- A جي پيٽ ۾ ٽيم- B جي ڪارڪردگي ۾ وڌيڪ تسلسل آهي.
5. $=2.1$ نسبتي, $Var. = 0.196$, $S.D. = 0.443$, $M.D. = 0.343$ (تقريباً).

جائزي واري مشق 22

1. (MCQs) گهڻ چونڊائڻا سوال
i. (c), ii. (c), iii. (b), iv. (a), v. (a), vi. (a), vii. (b), viii. (c), ix. (c), x. (d).

مشق 23.1

2. (i) $x = 25$ (ii) $x = 12$ (iii) $x = 2$ (iv) $x = 15$ 3. $\sqrt{34}$
4. 12 5. 10 6. 6 7. $a = 2\sqrt{5}$, $b = 2\sqrt{21}$, $h = \sqrt{35}$ 8. 58.31
9. $4\sqrt{3}$ 10. 12 11. 30 12. $5 =$ ويڪر ۽ $12 =$ ڊيگهه

جائزي واري مشق 23


1. (MCQs) گهڻ چونڊائڻا سوال
i. ii. (a) iii. (b) iv. (b) v. (a) vi. (d) vii. (c)
2. 24 3. $2\sqrt{119}m$ 4. (i) $\sqrt{13}$ (ii) $\sqrt{51}$ (iii) $\sqrt{63}$

مشق 24.1

1. $m\overline{CE} = 10cm$ 2. $x = 1$

مشق 24.2

1. $x = 1$; ٽپور پاسو ٽڪندو 2. $y = 4$ ۽ $x = 2$ 3. $A_2 = 7cm^2$ 4. $x = 11cm$




جائزي واري مشق 24

گهڻ چونڊائتا سوال (MCQs) 1.

- i. d ii. d iii. c iv. b v. a vi. b
vii. c viii. c ix. d x. b xi. a xii. b

مشق 25.1

1. نه، ڇاڪاڻ جو هم ليڪي ٽيڪن جي سيني چوڙن جا عمودي اڌڪنڌر ڪڏهن به ساڳئي ٽيڪي تي ڪپندا آهن.
2. ها اهو رڳو تڏهن ممڪن آهي جڏهن چئني ٽيڪن کي ملائڻ سان ٺهندڙ چوڪنڊو، مدار چوڪنڊو هجي. يعني ته چوڪنڊي جي سامهون وارن ڪنڊن جي جوڙ اُٺ 180° آهي. پر عام طرح سان، ڪن به چار غير هم ليڪي ٽيڪن لاءِ انهن مان گذرندڙ گول ڪيڏ ممڪن نه آهي.
3. اشارو: مثال 1-2 ڏسو. 4. اشارو: مثال 1-2 ڏسو.
5. گهريل مسجد جي بيهڪ ڳوٺن A، B ۽ C کي ملائيندڙ گول جي مرڪز تي آهي جئين شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. ڳوٺائن کي مسجد تائين پهچڻ لاءِ برابر فاصلو 5 ڪلوميٽر آهي.



مشق 25.2

1. اشارو: مرڪز مان گذرندڙ زه، قطر هوندا آهن. 25.2-25.3 سڌيان ڏسو.
2. $C = 10\pi \text{ cm}$ and $A = 25\pi \text{ cm}$. سڌيان 25.2 ۽ 25.3 کي ڏسو.
3. (a). 6cm . (b). $6\sqrt{3}\text{cm}$. شڪل ۽ تفصيل لاءِ مثال 2-1 ڏسو.
4. شڪل ۽ تفصيل لاءِ مثال 2-1 ڏسو. $r = \sqrt{34}\text{cm}$.

مشق 25.3

1. سڌيان 25.4 ۽ 25.5 کي ڏسو.
2. سڌيان 25.4 ۽ 25.5 کي ڏسو.
3. (a). $\sqrt{95}\text{cm}$ (b). $\sqrt{39}\text{cm}$ (c). $2\sqrt{15}\text{cm}$ (d). $2\sqrt{77}\text{cm}$
4. (a). 7cm (b). 27.594cm 5. (a). $2\sqrt{5}$ (b). 6 (c). 5 (d). 10.8 (e). $2\sqrt{51}$ (f). 6


جائزي واري مشق 25

گهڻ چونڊائتا سوال (MCQs) 1.

- i. (b) ii. (c) iii. (c) iv. (b) v. (b) vi. (a) vii. (a) viii. (b) ix. (a)

مشق 26.1

1. مثال 1 ۾ ثابتي کي ڏسو.
2. مثال 1 ۾ ثابتي کي ڏسو.
3. $5\sqrt{3}\text{cm}$ ۽ $\frac{5\sqrt{3}}{2}\text{cm}$. $d = 6\text{cm}$, $A = 28.2743\text{cm}^2$ ۽ $C = 18.8495\text{cm}$ (تقريباً).
4. 24cm . 5. $\sqrt{109}\text{cm}$.



مشق 26.2

- اشارو: سڌيان 26.3 ۽ شامل نتيجن کي ڏسو.
- اشارو: ثابت ڪندڙ بيان سڌيان جو عڪس آهي ۽ مثال 1 جي ثابتي.
- سڌيان 26.3 کي ڏسو.
- (a). 6, (b). $2\sqrt{66}$, (c). 7, (d). 11, (e). $\frac{55}{7}$, (f). 14.22 (تقريباً), (g). 4.3, (h). 18.8714 (تقريباً).
- (a). 6, (b). 4, (c). 6, (d). 1.1547 (تقريباً), (e). 5, (f). 13.

مشق 26.3

- اشارو: ثابت ڪندڙ بيان سڌيان 26.4 صورت (A) جو عڪس آهي.
- اشارو: ثابت ڪندڙ بيان سڌيان جو عڪس آهي مثال 1 ۾.
- 37.7cm ۽ 6cm (تقريباً).
- اشارو: ثابت ڪندڙ بيان سڌيان 26.4 صورت (A) کي ڏسو. (a). 70^0 (b). 50^0 5.
- 4cm 7. 8.5cm

جائزي واري مشق 26

1. گهڻ چونڊائتا سوال (MCQs)

- i. (b) ii. (c) iii. (b) iv. (c) v. (b) vi. (b) vii. (a) viii. (d) ix. (a) x. (b) xi. (d)

مشق 27.1

3. $x = 20$ and $y = 10$ 4. 114° and 92° 5. 30° and 65° 6. 120°

جائزي واري مشق 27

1. گهڻ چونڊائتا سوال (MCQs)

- i. b ii. c iii. c iv. b v. b vi. c vii. a viii. d ix. a

مشق 28.1

1. 18° 2. $x < 46^\circ$ 3. $x > 13^\circ$

مشق 28.2

1. 60° 2. 70° 3. 120°

جائزي واري مشق 28

1. گهڻ چونڊائتا سوال (MCQs)

- i. (a) ii. (b) iii. (d) iv. (d) v. (b)
vi. (a) vii. (b) viii. (c) ix. (b) x. (c)


جائزي واري مشق 29

1. گهڻ چونڊائتا سوال (MCQs)

- i. (b) ii. (d) iii. (a) iv. (c) v. (c) vi. (b) vii. (a)
viii. (b) ix. (d) x. (d) xi. (c) xii. (a) xiii. (b) xiv. (c)
xv. (d) xvi. (b) xvii. (d) xviii. (c) xix. (a) xx. (d)

مشق 30.1

1. (i) 32.25° (ii) 10.5° (iii) 8.25°
(iv) 45.36° (v) 25.5° (vi) 18.11°
2. (i) $32^\circ 15'$ (ii) $47^\circ 21' 36''$ (iii) $57^\circ 19' 38''$
(iv) $-(67^\circ 34' 48'')$ (v) $22^\circ 30'$ (vi) $225^\circ 36'$




3. (i) 45° (ii) 60° (iii) -135°
 (iv) 171.82° (v) 54.67° (vi) 257.73°
4. (i) ريڊيان $\frac{\pi}{6}$ (ii) ريڊيان $\frac{\pi}{4}$ (iii) ريڊيان $\frac{\pi}{3}$
 (iv) ريڊيان $\frac{\pi}{8}$ (v) ريڊيان $\frac{-5\pi}{4}$ (vi) ريڊيان 1.06

مشق 30.2

1. (i) ريڊيان 4 (ii) ريڊيان 15.1 (iii) ريڊيان 2.09 (iv) ريڊيان 1.8
2. (i) $l = 2.12 \text{ cm}$ (ii) $l = 10.2 \text{ cm}$ (iii) $l = 3.14 \text{ cm}$ (iv) $l = 15.84 \text{ cm}$
3. (i) $r = 1.91 \text{ m}$ (ii) $r = 0.5 \text{ m}$ (iii) $r = 16 \text{ cm}$ (iv) $r = 4.9 \text{ cm}$
4. (i) $l = 0.52$ يونٽ (ii) $l = 0.79$ يونٽ (iii) $l = 1.05$ يونٽ (iv) $l = 1.57$ يونٽ
5. (i) $l = 2.62 \text{ cm}$ (ii) $6.55 \text{ cm}^2 =$ گول جي سيڪٽر جي ايراضي
6. $l = 2.2 \text{ m}$ ٽپڪي جي طئي ڪيل فاصلو:
7. $6.28 \text{ cm}^2 =$ گول جي سيڪٽر جي ايراضي
8. $\theta = 800$ ريڊيان 9. $\theta = 0.5$ ريڊيان
10. $105.6 \text{ cm}^2 =$ سيڪٽر جي ايراضي ۽ $l = 17.6 \text{ cm}$

مشق 30.3

1. (i) -305° ۽ 415° (ii) $-\frac{11\pi}{6}$ ۽ $\frac{13\pi}{6}$
 (iii) -405° ۽ 315° (iv) $\frac{5\pi}{4}$ ۽ $-\frac{11\pi}{4}$
2. (i) Q_4 (ii) Q_1 (iii) Q_3
 (iv) Q_1 (v) Q_3 (vi) Q_2
3. (i), (ii), (iii), (iv), (v) ڪاٿو نشاني وارا آهن. (vi) واڌو نشاني وارا
4. (i) Q_2 ۾ موجود آهي. (ii) Q_3 ۾ موجود آهي. (iii) Q_3 ۾ موجود آهي.
 (iv) Q_3 ۾ موجود آهي. (v) Q_2 ۾ موجود آهي. (vi) Q_1 ۾ موجود آهي.
5. (i) $\cot \theta = -\frac{3}{4}$ ۽ $\tan \theta = -\frac{4}{3}$, $\operatorname{cosec} \theta = \frac{5}{4}$, $\sin \theta = \frac{4}{5}$, $\sec \theta = -\frac{5}{3}$



6. (i) $\cot \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\tan \theta = -\sqrt{3}$, $\sec \theta = -2$, $\cos \theta = -\frac{1}{2}$, $\operatorname{cosec} \theta = \frac{2}{\sqrt{3}}$
(ii) $\cot \theta = \frac{-2}{\sqrt{5}}$, $\tan \theta = \frac{-\sqrt{5}}{2}$, $\operatorname{cosec} \theta = -\frac{3}{\sqrt{5}}$, $\sin \theta = \frac{-\sqrt{5}}{3}$, $\sec \theta = \frac{3}{2}$
(iii) $\cot \theta = \frac{-2}{\sqrt{5}}$, $\tan \theta = \frac{-\sqrt{5}}{2}$, $\operatorname{cosec} \theta = \sqrt{5}$, $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\cot \theta = 2$
(iv) $\tan \theta = \cot \theta = 1$, $\sin \theta = \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$
(v) $\cot \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\tan \theta = \sqrt{3}$, $\operatorname{cosec} \theta = \frac{2}{\sqrt{3}}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sec \theta = 2$
7. (i) 2 (ii) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (iii) $\sqrt{2}-1$
(iv) $\frac{\sqrt{3}+2}{2}$ (v) $2-\sqrt{3}$ (vi) 4

مشق 30.5

1. $x = 304.5m$ 2. $L = 4\sqrt{3} \approx 6.93m$ 3. $\theta = 60^\circ$
4. $x = 288.75 m$ 5. $\theta = 24^\circ$

جائزي واري مشق 30

گھڻ چونڊائڻا سوال (MCQs)

- | | | | | |
|-------|--------|---------|-------|------|
| i. b | ii. a | iii. c | iv. b | v. b |
| vi. b | vii. b | viii. c | ix. b | x. b |
3. $\frac{2821\pi}{7200}$ 4. 120 درجو 5. 120 درجو
6. 1 منٽ 7. $\frac{28}{\pi} cm$ 8. 1 ريڊيان
10. $6 cm^2$